

کیمیای عضوی

صنف دوازدهم



کیمیا صنف دوازدهم





سرود ملی

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| دا وطن افغانستان دی | دا عزت د هر افغان دی |
| کور د سولې کور د تورې | هر بچی یې قهرمان دی |
| دا وطن د ټولو کور دی | د بلوڅو د ازبکو |
| د پښتون او هزاره وو | د ترکمنو د تاجکو |
| ورسره عرب، گوجر دي | پامیریان، نورستانیان |
| براهوي دي، قزلباش دي | هم ایماق، هم پشه پان |
| دا هېواد به تل ځلېږي | لکه لمر پر شنه آسمان |
| په سینه کې د آسیا به | لکه زړه وي جاویدان |
| نوم د حق مودی رهبر | وایو الله اکبر وایو الله اکبر |


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



کیمیا

صنف دوازدہم

سال چاپ: ۱۳۹۹ هـ. ش.



مشخصات کتاب

مضمون: کیمیا

مؤلفان: گروه مؤلفان کتاب‌های درسی دیپارتمنت کیمیا، نصاب تعلیمی

ویراستاران: اعضای دیپارتمنت ویراستاری و ایدیت زبان دری

صنف: دوازدهم

زبان متن: دری

انکشاف دهنده: ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب درسی

ناشر: ریاست ارتباط و آگاهی عامه وزارت معارف

سال چاپ: ۱۳۹۹ هجری شمسی

ایمیل آدرس: curriculum@moe.gov.af

حق طبع، توزیع و فروش کتاب‌های درسی برای وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان محفوظ است. خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.



پیام وزیر معارف

اقراً باسم ربك

سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و نوشتن برخوردار ساخت، و درود بی پایان بر رسول خاتم - حضرت محمد مصطفی ﷺ که نخستین پیام الهی بر ایشان «خواندن» است.

چنانچه بر همه گان هویدا است، سال ۱۳۹۷ خورشیدی، به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ نظام تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحولات و تغییرات بنیادینی در عرصه های مختلف خواهد بود؛ معلم، متعلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراها و والدین، از عناصر شش گانه و اساسی نظام معارف افغانستان به شمار می روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی را ایفا می نمایند. در چنین برهه سرنوشت ساز، رهبری و خانواده بزرگ معارف افغانستان، متعهد به ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می باشد.

از همین رو، اصلاح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویتهای مهم وزارت معارف پنداشته می شود. در همین راستا، توجه به کیفیت، محتوا و فرایند توزیع کتابهای درسی در مکاتب، مدارس و سایر نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامه های وزارت معارف قرار دارد. ما باور داریم، بدون داشتن کتاب درسی با کیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.

برای دستیابی به اهداف ذکر شده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد، از آموزگاران و مدرسان دلسوز و مدیران فرهیخته به عنوان تربیت کننده گان نسل آینده، در سراسر کشور احترامانه تقاضا می گردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هیچ نوع تلاشی دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش های دینی، ملی و تفکر انتقادی بکوشند. هر روز علاوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری، با این نیت تدریس را آغاز کنند، که در آینده نزدیک شاگردان عزیز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته و شکوفا خواهند شد.

همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه های فردای کشور می خواهیم تا از فرصت ها غافل نبوده و در کمال ادب، احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان گرامی استفاده بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.

در پایان، از تمام کارشناسان آموزشی، دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تلاش نمودند، ابراز قدردانی کرده و از بارگاه الهی برای آن ها در این راه مقدس و انسان ساز موفقیت استدعا دارم. با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته، و نیل به یک افغانستان آباد و مرفعی دارای شهروندان آزاد، آگاه و مرفه.

دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف



فهرست عناوین

صفحه

عنوان

۱ مقدمه

فصل اول

۲ تشکیل روابط کیمیاوی در مرکبات عضوی

۳ ۱-۱: ساختمان الکترونیکی و سئوهای انرژی کاربن

۴ ۲-۱: ولانس کاربن و تشکیل رابطه

۸ ۳-۱: هایبریدیزیشن

۱۵ خلاصه فصل اول

۱۶ سؤالات فصل اول

فصل دوم

۱۸ ساختمان مالیکولی

۱۹ ۱-۲: فورمول مالیکولی

۲۲ ۲-۲: فورمولهای ساختمانی

۲۳ ۳-۲: طرز نوشتن فورمولهای ساختمانی

۳۲ ۴-۲: ایزومرها (Isomers)

۳۴ خلاصه فصل دوم

۳۴ سؤالات فصل دوم

فصل سوم

۳۶ طبقه بندی مرکبات عضوی

۳۷ ۱-۳: معلومات عمومی

۳۸ ۲-۳: صنف بندی هایدروکاربنها

۳۹ ۳-۳: گروپهای وظیفه‌ی در هایدروکاربنها

۴۰ ۴-۳: سلسله هومولوگ الکانها

۴۱ ۵-۳: مرکبات عضوی و گروپهای وظیفه‌ی (مشتقات هایدروکاربنها)

۴۲ ۶-۳: مرکبات عضوی با گروپهای وظیفه‌ی

۴۸ خلاصه فصل سوم

۴۸ سؤالات و تمرین فصل سوم

فصل چهارم

۵۰ الکانها و سایکلو الکانها

۵۱ ۱-۴: الکانها (Alkanes)

۶۲ ۲-۴: مرکبات حلقوی (سایکلو الکانها)

۶۸ خلاصه فصل چهارم

۶۸ سؤالات فصل چهارم

فصل پنجم

۷۰ الکینها و الکاینها

۷۱ ۱-۵: الکینها



فهرست عناوین

صفحه

عنوان

| | |
|----|--------------------------|
| ۸۰ | ۲-۵: الکاین ها (Alkynes) |
| ۸۶ | ۳-۵: استیلین |
| ۸۹ | خلاصه فصل پنجم |
| ۹۰ | سؤالات فصل پنجم |

فصل ششم

| | |
|-----|---------------------------------------|
| ۹۲ | مرکبات اروماتیک (Arenes) |
| ۹۳ | ۱-۶: ساختمان بنزین |
| ۹۶ | ۲-۶: نامگذاری مرکبات اروماتیک |
| ۹۶ | ۳-۶: تعاملات هایدروکاربن های اروماتیک |
| ۱۰۳ | خلاصه فصل ششم |
| ۱۰۴ | سؤالات فصل ششم |

فصل هفتم

| | |
|-----|-------------------------|
| ۱۰۶ | الکایل هالایدها |
| ۱۰۷ | ۱-۷: الکایل هالایدها |
| ۱۱۶ | خلاصه فصل هفتم |
| ۱۱۶ | سؤالات و تمرین فصل هفتم |

فصل هشتم

| | |
|-----|--------------------------|
| ۱۱۹ | الکول ها و ایترها |
| ۱۲۰ | ۱-۸: الکول ها (Alcohols) |
| ۱۳۴ | ۲-۸: ایترها (Ethers) |
| ۱۳۸ | خلاصه فصل هشتم |
| ۱۳۹ | سؤالات فصل هشتم |

فصل نهم

| | |
|-----|---|
| ۱۴۲ | الدیهالایدها و کیتون ها |
| ۱۴۳ | ۱-۹: الدیهالید و کیتون (مرکبات گروپ کاربونیل) |
| ۱۴۳ | ۱-۹: الدیهالایدها |
| ۱۵۵ | ۲-۹: کیتون ها (Ketones) |
| ۱۶۰ | خلاصه فصل نهم |
| ۱۶۱ | سؤالات فصل نهم |

فصل دهم

| | |
|-----|---------------------------------------|
| ۱۶۳ | تیزاب های عضوی (کاربوکسیلیک اسیدها) |
| ۱۶۴ | ۱-۱۰: تیزاب های عضوی |
| ۱۷۲ | ۲-۱۰: بعضی از کاربوکسیلیک اسیدهای مهم |
| ۱۷۷ | خلاصه فصل دهم |
| ۱۷۸ | سؤالات فصل دهم |



فهرست عناوین

صفحه

عنوان

فصل یازدهم

| | |
|-----|--|
| ۱۸۱ | آمین ها (Amines) |
| ۱۸۲ | ۱-۱۱: ساختمان و صنف بندی آمین ها |
| ۱۹۲ | ۲-۱۱: امایدها (Amides) |
| ۱۹۴ | خلاصه فصل یازدهم |
| ۱۹۵ | سؤالات فصل یازدهم |

فصل دوازدهم

| | |
|-----|---|
| ۱۹۷ | پلی میرهای طبیعی |
| ۱۹۸ | صنف بندی پولیمیرهای طبیعی |
| ۱۹۸ | ۱-۱۲: قندها |
| ۲۱۴ | ۲-۱۲: پروتین ها |
| ۲۲۱ | ۳-۱۲: دی اکسی رایبوز نوکلئیک اسید (D.N.A) و رایبوز نوکلئیک اسید (R.N.A) |
| ۲۲۴ | خلاصه فصل دوازدهم |
| ۲۲۵ | سؤالات فصل دوازدهم |

فصل سیزدهم

| | |
|-----|---|
| ۲۲۷ | پلی میرهای مصنوعی |
| ۲۲۸ | ۱-۱۳: پلی میرهای جمعی مصنوعی |
| ۲۳۴ | ۲-۱۳: پلی میرهای متراکم شده |
| ۲۳۵ | ۳-۱۳: ساینس، تکنالوجی و اجتماع |
| ۲۳۷ | ۴-۱۳: آلوده گی محیط زیست در اثر استعمال پلی میرهای مصنوعی |
| ۲۴۰ | خلاصه فصل سیزدهم |
| ۲۴۰ | سؤالات فصل سیزدهم |
| ۲۴۴ | مآخذ |



مقدمه

عنصر کاربن دارای خواص مربوط به خود بوده که مرکبات مختلف را در طبیعت به وجود آورده است، مرکبات آن در طبیعت به اندازه زیاد است که یک بخش خاصی را در کیمیا به خود اختصاص داده است و آن عبارت از کیمیای عضوی می باشد. کیمیای عضوی بخشی از کیمیا است که از هایدروکاربن ها و مشتقات آن بحث می کند. هایدروکاربن ها و مشتقات آن ها در صنعت امروزی رول اساسی را دارا بوده، ادویه ها، رنگ ها و دیگر سامان آلات عصری کنونی از مرکبات عضوی تشکیل گردیده اند. کیمیای صنف دوازدهم بخشی از کیمیای عضوی بوده و مرکباتی را تحت مطالعه قرار میدهد که به طور عمده از عنصر کاربن و هایدروجن تشکیل گردیده اند؛ یعنی هایدروکاربن ها و مشتقات آن ها می باشد.

کیمیای صنف دوازدهم متشکل از سیزده فصل بوده که فصل اول آن تشکیل روابط کیمیای را در مرکبات عضوی توضیح می دهد. فصل دوم ساختمان مالیکولی و فورمول ها را ارائه می دارد. فصل سوم در مورد طبقه بندی مرکبات عضوی بحث نموده و فصل چهارم الکان ها و سایکلو الکان ها را تشریح می کند. فصل پنجم الکین ها و الکاین ها، فصل ششم مرکبات اروماتیک، فصل هفتم الکیل هالیدها، فصل هشتم الکل ها و ایترها، فصل نهم در مورد الدیها و کتون ها معلومات ارائه می دارد؛ به همین ترتیب فصل دهم تیزاب های عضوی، فصل یازدهم آمین ها، فصل دوازدهم پولی میرهای طبیعی و فصل سیزدهم پولی میرهای مصنوعی را توضیح می کند. مطالب هر فصل جنبه های حیاتی داشته و اهداف اساسی تدریس هر فصل این است تا سطح یادگیری شاگردان بلند رفته از مطالب آموزشی آن در عرصه های مختلف حیات خویش استفاده نمایند و هم در مسایل صنعتی دسترسی داشته باشند.

در آغاز هر فصل اهداف آموزشی به شکل سؤال ها طرح و در پایان هر فصل خلاصه فصل تحریر گردیده تا شاگردان را از مفاهیم و روش های آموزشی خوب بهره مند سازند؛ به همین ترتیب بعد از خلاصه هر فصل تمرین و سؤالات حل نشده طرح شده است تا شاگردان خود آن ها را حل نمایند و در آموزش مطالب فصل مربوط به آن ها کمک نمایند. هر فصل به کلمات ساده و عام فهم تحریر گردیده، در بین متن هر فصل فعالیت های عملی و نظری ارائه شده تا شاگردان خود به اجرای آن به طور گروهی و یا انفرادی به کمک معلم پرداخته و این فعالیت ها در آموزش هر چه بیشتر و خوبتر شاگردان را کمک می نمایند.



فصل اول

تشکیل روابط کیمیاوی در مرکبات عضوی




تعداد مرکبات کاربن به اندازه زیاد است که بخش مهم علم کیمیا را به این عنصر اختصاص داده اند و علمی که مرکبات کاربن، هایدروجن و مشتقات آنها را می توانیم تحت آن مطالعه نمائیم، به نام « کیمیای عضوی » یاد می شود.

سالانه مقدار قابل ملاحظه‌یی از تجارت دنیا را مرکبات عضوی و محصولات ساخته شده از آن تشکیل می دهد که نقش اساسی در رشد اقتصادی کشورهای جهان دارد، به این اساس شناخت بهتر خواص، نامگذاری و مورد استعمال مرکبات عضوی از اهمیت زیاد برخوردار است. برای شناخت مرکبات عضوی روابط بین مرکبات عضوی آن را مورد مطالعه قرار دهیم. بنابراین باید دانسته شود که رابطه چیست؟ رابطه چه طور برقرار می گردد؟ عوامل برقراری روابط چیست؟ انواع روابط کدام ها اند؟ با مطالعه این فصل راجع به روابط کیمیاوی معلومات حاصل خواهید کرد.

۱-۱: ساختمان الکترونی و سویه‌های انرژی‌کی کربن

کربن دارای ساختمان الکترونی $1s^2 2s^2 2p^2$ بوده، تعداد مرکبات آن زیاد و با اهمیت می‌باشد و بخش مهم کیمیاوی عضوی را تشکیل داده است. در سال 1880 به تعداد 1200 مرکب عضوی و تا سال 1998 اضافه از بیست میلیون مرکب عضوی کشف گردیده است. در همین مرکبات کشف شده به ارقام فوق الذکر اتم کربن به شکل آیون C^{4+} موجود نبوده، بلکه به صورت عموم می‌توان گفت که در تمام این مرکبات اتم کربن به حالت تحریک قرار داشته و ساختمان الکترونی $1s^2 2s^1 2p^3$ را دارا است.

دیاگرام سویه انرژی الکترون‌های ولانسی اتم کربن را در شکل (۱-۱) نشان می‌دهد:




شکل (۱-۱) دیاگرام سویه‌های انرژی‌کی اتم کربن


در بعضی از مرکبات غیرعضوی کربن را می‌توان به شکل C^{4-} ملاحظه کرد؛ به طور مثال: $Al_4C_3^{+3}$ ، Be_2C و غیره.

به صورت عموم اتم‌های کربن رابطه کوولانسی را برقرار نموده که اکثراً زنجیرهای طویل و یا حلقه‌های کوچک و بزرگ را تشکیل می‌دهند؛ در این زنجیرها و یا حلقه‌های بین اتم‌های کربن رابطه یگانه، دوگانه و یا سه گانه به ملاحظه می‌رسد؛ حتی رابطه 1.5 گانه نیز مشاهده شده که آن را می‌توان در بنزین به حالت ریزونانس ملاحظه کرد. انرژی رابطه کربن - کربن $E_{(C-C)} = 360 \text{ KJoul/mol}$ است.

کربن طبیعی دارای دو ایزوتوپ $^{12}_6C$ و $^{13}_6C$ بوده که فیصدی انتشارشان در طبیعت به ترتیب 98.93% و 1.07% است؛ لکن در طبیعت ایزوتوپ $^{14}_6C$ نیز موجود است که در طبقات بلند اتموسفیر در نتیجه تعامل هستوی ذیل تشکیل می‌گردد:



نصف طول عمر $^{14}_6C$ 5730 سال است و در نتیجه تشعشع β^- به نایترجن مبدل می‌گردد:




در مرکبات عضوی موجودات حیه ایزوتوپ $^{14}_6C$ و $^{12}_6C$ در حالت تعادل بوده و نسبت تعادل آن



$\frac{^{14}_6\text{C}}{^{12}_6\text{C}} = 10^{-12}$ و ثابت است؛ اما اگر موجودات حیه اعم از نباتات و حیوانات با طبیعت قطع رابطه نمایند، نسبت تعادلی فوق برهم خورده، تجزیه و کاهش $^{14}_6\text{C}$ صورت گرفته حیوانات و نباتات به مرگ مواجه شده و مقدار آن از بین می‌رود؛ از این خاصیت آن، برای تعیین نصف طول عمر اشیای چوبی، اجساد انسانها یا حیوانات که از 15 تا حد اعظمی 30 هزار سال قبل الی اکنون زنده گی داشته اند، بادقت 10% می‌توان استفاده کرد.

ولانس کاربن و تشکیل رابطه

قوة اتحاد اتم‌های عناصر کیمیای را در تعاملات و تعداد رابطه‌های که یک اتم تشکیل داده می‌تواند به نام ولانس یاد می‌گردد؛ پس ولانس کاربن چند است؟ شما می‌توانید بطور ساده به سوال فوق به اساس ساختمان و سمبول لیویس (Lewis) جواب بدهید؛ طوریکه در آن الکترون‌های ولانسی به نقاط نشان داده می‌شود، چون کاربن دارای چهار الکترون ولانسی است، سمبول لیویس آن قرار ذیل تحریر می‌گردد:



شکل (1 - 2) ساختمان لیویس و ساختمان فضایی کاربن

برای پوره کردن حالت هشت الکترونی قشر الکترون‌های ولانسی (octate)، اتم کاربن باید چهار الکترون ولانسی خود را با دیگر اتم‌ها به شمول اتم‌های کاربن شریک سازد، در نتیجه ولانس کاربن چهار است.

در تمام مرکبات عضوی هر اتم کاربن، چهار رابطه اشتراکی را با دیگر اتم‌های کاربن یا اتم‌های عناصر دیگر؛ از قبیل هایدروجن، آکسیجن، نایتروجن و هلوجن‌ها تشکیل می‌دهد. با استفاده از جدول دوره‌یی عناصر، ولانس آکسیجن، نایتروجن و هلوجن‌ها در یافت می‌گردد.

جدول ذیل موقف کاربن را در بین عناصر دیگر نشان می‌دهد:
جدول (1 - 1) دوره عناصر


کاربن می‌تواند رابطه‌های یگانه، دو گانه و سه گانه را دارا باشد که در ذیل توضیح می‌گردد:
چون کاربن در قشر ولانسی خود دارای چهار الکترون ولانسی است؛ بنابراین برای تکمیل اکتیت خود به چهار الکترون دیگر ضرورت دارد، در مالیکول ایتان (C_2H_6) هر اتم کاربن بایک اتم دیگر کاربن و با سه اتم هایدروجن رابطه دارد، بین هر اتم کاربن و هر اتم هایدروجن یک رابطه برقرار بوده که یک، یک جوهره الکترون مشترک بین آن‌ها موجود می‌باشد، علمای نجوم باور دارند که سطح زحل را ایتان مایع تشکیل داده است:



شکل (1 - 3) نشان دهنده ایتان مایع در سطح زحل

علاوه بر این کاربن و عناصر دیگر از جمله نایتروجن، آکسیجن و سلفر می‌توانند با اتم‌های دیگر با رعایت قاعده اکتیت بیش از یک جوهره الکترون، دو جوهره الکترون (چهار الکترون) را مشترک قرار دهند که رابطه دو گانه را تشکیل می‌دهند. مالیکول ایتلین دارای دو اتم کاربن و چهار اتم هایدروجن بوده که رابطه بین اتم‌های کاربن - کاربن آن دو گانه می‌باشد. ایتلین به شکل هارمون در اکثر نباتات به طور مشخص بادنجان رومی موجود است که در موقع پخته شدن آن را آزاد می‌سازد و باعث پختن

بادنجان‌های رومی دیگر می‌گردد؛ بنابراین در زراعت در عرصهٔ پختن بادنجان رومی از ایتلین استفاده می‌نمایند:



شکل (1 - 4) بادنجان رومی منبع ایتلین

همچنان دو اتم کربن می‌توانند رابطهٔ سه گانه را باهم برقرار ساخته سه جوره الکترون را باهم مشترک قرار دهند؛ به طور مثال: در مالیکول استلین دو اتم کربن بین هم رابطهٔ سه گانه را برقرار نموده، در مالیکول این مرکب دو اتم کربن و دو اتم هایدروجن شامل است. در چراغ‌های معدن شناسی از سنگ کلسیم کار باید استفاده نموده، طوریکه بالای کلسیم کار باید آب را علاوه نموده و در نتیجهٔ هایدرولیز آن استلین حاصل می‌شود.




شکل (1 - 5) استعمال گاز استلین در چراغ‌های اکسی استلین معادن شناسان

یکی از خصوصیات مهم اتم‌های کربن عبارت از تشکیل مالیکول‌های هایدروکربن‌های زنجیری و زنجیر بسته (حلقوی) است که کربن با کربن در آن‌ها با هم رابطه دارند. فورمول‌های ذیل اسکلیت کربنی مرکبات زنجیری و حلقوی عضوی را نشان می‌دهند:

برخلاف دیگر اتم‌ها مانند: نایتروجن و آکسیجن، روابط متعدد اتم‌های کاربن قوت رابطه‌های کاربن - کاربن را کم نمی‌سازد.

در زنجیرها و حلقه‌ها اتم‌های کاربن نیز می‌توانند رابطه دو گانه و سه گانه را با دیگر اتم‌های کاربن و عناصر دیگر برقرار نمایند؛ به طور مثال:




طریقه‌های مختلف تشکیل رابطه اتم‌های کاربن باعث موجودیت تعداد و انواع زیاد مرکب کاربن می‌گردد.

مثال: ساختمان لیویس مرکب فارم الدیهاید (CH_2O) را تحریر دارید.


حل: ابتدا تعداد الکترون‌های مجموعی ولانسی را محاسبه نمایید.

هر اتم هایدروجن دارای یک الکترون ولانسی بوده؛ پس دو اتم آن دارای دو الکترون ولانسی می‌باشد؛ به همین ترتیب یک اتم کاربن، دارای چهار الکترون ولانسی و یک اتم آکسیجن دارای شش الکترون بوده که به صورت کل در این مرکب، دوازده الکترون ولانسی موجود است. با در نظر داشت الکترون‌های ولانسی اتم‌های متشکله مالیکول فارم الدیهاید، اتم‌های متشکله مالیکول مرکب مذکور را با هم نزدیک قرار دهید، کاربن که اتم مرکزی بوده، در وسط قرار گرفته، در این صورت الکترون‌های ولانسی هر یک از اتم‌ها را به نزدیک آن‌ها قرار داده، قاعده لیویس تطبیق می‌گردد:



در فورمول فوق تعداد الکترون‌های تحریر شده دوازده عدد و تعداد الکترون‌های ولانسی نیز دوازده عدد اند، کاربن دو رابطه یگانه و یک رابطه دو گانه داشته و در مجموع چهار رابطه کوولانت را تشکیل

داده است. اگر رابطه‌ها را به یک خط افاده نماییم، فورمول ساختمانی زیر حاصل می‌شود:



در این فورمول رابطه دوگانه نمایان گر چهار الکترون مشترک بین کاربن و آکسیجن است؛ بنابراین قاعده اکتیت رعایت شده است.

فعالیت



ساختمان لیویس مالیکول‌های زیر را ترسیم نمایید:

الف - کاربن دای اکساید (CO_2) ب- کاربن تترا کلوراید (CCl_4) ج - آمونیا (NH_3)

هایبریدیزیشن (Hybridization)

طوری‌که در بالا مطالعه گردید، اتوم‌های کاربن رابطه یگانه، دوگانه و سه گانه را تشکیل داده می‌توانند، باید دانسته شود که چطور این رابطه‌ها تشکیل می‌گردند؟ کدام نوع اوربیتال‌ها در تشکیل آن‌ها دخیل اند؟ به خاطر جواب به سؤالات بالا اوربیتال‌های هایبرید شده را مطالعه می‌نماییم.


کلمه Hybrid دریونانی به معنی اختلاط خون بوده، یعنی نسلی که از دو نسل مختلف تشکیل شده باشد و مفهوم امتزاج یا اختلاط را می‌رساند. در اینجا منظور از اختلاط دو و یا چندین اوربیتال اتومی مختلف بوده که دو و یا چندین اوربیتال هایبریدی جدید را به میان می‌آورد.

الکترون‌های ولانسی اتوم‌های عناصر کیمیاوی می‌تواند در اوربیتال s, p, d, f و غیره موجود باشد که در این صورت تمام اوربیتال‌های مذکور از لحاظ انرژی هم ارزش نبوده و روابط آن‌ها نیز هم ارزش نمی‌باشد؛ لکن تجربه به اثبات رسانیده که در مالیکول‌ها، اتوم‌های مرکزی آن‌ها دارای اوربیتال‌های مختلف ولانسی (s, p, d, \dots) بوده و از لحاظ رابطه هم ارزش می‌باشند، این مطلب توسط علما هریک Pamling و Cleyster توضیح گردید. علمای مذکور ارائه داشته اند: اوربیتال‌های که از لحاظ انرژی اختلاف زیادی نداشته و در عین قشر اصلی واقشار اخیر اتوم‌ها قرار داشته باشند، مطابق به تعداد اولی شان با هم Hybridization نموده و به تعداد اولی خود اوربیتال‌های هایبرید شده را تولید می‌نمایند که در یک سطح انرژی قرار دارند و عین ساختمان ابر الکترونی را دارا می‌باشند. این اوربیتال‌ها به سمت تشکیل رابطه، کش شده و تداخل آن‌ها اعظمی بوده، زمینه تشکیل روابط مساعد می‌گردد. در هایبریدیزیشن اوربیتال‌های اتومی یک مقدار انرژی به مصرف رسیده؛ بنابراین همچو اوربیتال‌ها بی ثبات به نظر می‌رسند؛ اما در اثباتی تشکیل رابطه انرژی را ازدست داده، ثبات لازمه را حاصل می‌نمایند.

گر چه اتوم کاربن تنها دارای دو الکترون تاقه در قشر ولانس است؛ اما چهار رابطه را با اتوم‌های هایدروجن تشکیل داده می‌تواند، به این معنی است که اتوم کاربن چهار اوربیتال‌های نیمه پُر شده الکترونی خود را در تشکیل رابطه با اتوم‌های هایدروجن به کار برده است. برای تشریح تشکیل چهار رابطه کاربن، تیوری تشکیل رابطه واضح می‌سازد که چهار اوربیتال ولانسی کاربن ($2s, 2p$) با هم دیگر


مخلوط گردیده، باعث تشکیل چهار اوربیتال که دارای عین شکل و انرژی اند، تشکیل می گردند.

sp^3 هایبریدیزیشن: این نوع هایبریدیزیشن را اتم های کربن در هیدروکربن های مشبوع دارا بوده و طوری است که یک اوربیتال s با سه اوربیتال p در نتیجه جذب انرژی باهم مختلط گردیده و چهار اوربیتال هایبرید شده sp^3 را تشکیل می دهند که مقابل به رأس های چهاروجهی بوده و زاویه بین آنها 109.5° درجه است، این هایبریدیزیشن را می توان در مالیکول، CH_4 ، و CCl_4 و غیره ملاحظه کرد. سهم s در sp^3 $\frac{1}{4}$ و سهم p در آن $\frac{3}{4}$ است.



شکل (1 - 6) هایبرید Sp^3

برای کسب معلومات بیشتر در باره نوع هایبریدیزیشن، تشکیل CH_4 را به صورت مفصل مطالعه می کنیم. تشکیل رابطه در میتان باعث به میان آمدن چهار رابطه معادل $C-H$ و شکل (tetrahedral) چهاروجهی در مالیکول آن می گردد. ترتیب الکترونی قشر ولانسی اتم کربن تتراهایدرال و زاویه ولانسی آن در شکل ذیل نشان داده شده است:



شکل (1 - 7) هایبرید اتم کربن و تشکیل مالیکول میتان



شما پیش از این شکل اوربیتال هیبرید را مشاهده کردید و در بارهٔ موقعیت چهار اوربیتال در فضای اطراف هستهٔ اتم کربن معلومات حاصل کردید و دیدید که چهار اوربیتال هیبرید در چهار کنج تتراهیدرال که زاویه بین اوربیتال‌ها 109.5° است، قرار دارد.

اوربیتال‌های هیبرید sp^3 باعث جدا شدن اعظمی اوربیتال‌ها از همدیگر گردیده و رابطه‌ها از یکدیگر فاصلهٔ اعظمی دارند. وقتی که اوربیتال‌های $1s$ چهار اتم هیدروجن با چهار اوربیتال sp^3 کربن تداخل مستقیم می‌نمایند، یک مالیکول تتراهیدرال با چهار رابطهٔ معادل $C-H$ (شکل 1 - 7) تشکیل می‌گردد که با ساختمان CH_4 که در تجربه ثابت گردیده، مطابقت دارد.


شکل (1 - 7) تداخل مستقیم اوربیتال‌های sp^3 با چهار اوربیتال $1s$ اتم‌های هیدروجن و شکل تتراهیدرال CH_4 را نشان داده و هایبریدیزشن sp^3 را برای تشریح دیگر مرکبات عضوی و غیرعضوی از قبیل NH_3 و H_2O به کار می‌برد.

فعالیت: تشکیل رابطه در ایتان



سامان و مواد مورد ضرورت: یک ست مدل‌های مالیکولی

شما در این فعالیت ساختمان لیویس مالیکول ایتان را در شکل ذیل ملاحظه نموده، به سؤالات زیر جواب ارائه نمایید:



شکل (1 - 8) تداخل مستقیم اوربیتال‌های هایبرید شدهٔ ایتان

- 1 - تعداد رابطه‌ها در اطراف هر کربن چند است؟
- 2 - هایبریدیزشن هر اتم کربن چه نوع است؟
- 3 - ترتیب سه بعدی اتم‌ها در اطراف هر اتم کربن چگونه است؟
- 4 - یک مدل ایتان را بسازید.
- 5 - دو اوربیتال که در اثر تماس آن‌ها رابطه بین کربن و کربن در ایتان به وجود می‌آید چه نام دارد؟

هر اتموم کاربن دارای چهار رابطه بوده که با دیگر اتمومها رابطه برقرار نموده و شکل تتراهیدرال را تشکیل می دهد. برای تشکیل چهار رابطه، هر اتموم کاربن، چهار اوربیتال هایبیرید sp^3 خود را به کار برده و از تداخل مستقیم آنها با اوربیتال های اتموم های دیگر، رابطه سگما (σ) (Sigma) تشکیل می گردد که باعث تشکیل رابطه ها به شکل تتراهیدرال در اطراف هر اتموم کاربن می گردد. در اینجا سوال پیدا می شود که آیا اتموم کاربن دیگر نوع هیبریدیزشن را در تشکیل رابطه به کار برده می تواند؟ جواب سؤال را توضیحات ذیل ارایه می کند.

sp^2 هایبریدیزیشن: در این نوع هایبرید یک اوربیتال s و دو اوربیتال p با هم امتزاج نموده، در نتیجه سه اوربیتال هایبرید شده sp^2 را تشکیل می دهند، این اوربیتال ها در یک سطح قرار داشته که سهم s در هر اوربیتال sp^2 مساوی به $\frac{1}{3}$ و از $\frac{2}{3}$ p می باشد، زاویه ولانسی در بین این اوربیتال ها 120° درجه است.


شکل (1 - 9) هایبرید sp^2

هایبرید sp^2 را اتموم های کاربن در هایدروکاربن های غیرمشبوع فامیل ایتلین دارا اند. در مالیکول BF_3 اتموم بورون هایبرید sp^2 را دارا است:

شکل (1 - 10) sp^2 هایبرید اتموم بورون در BF_3 :

در هایبریدیزیشن اوربیتال های نیمه پر شده و یا اوربیتال های پر شده مکمل سهم داشته، مالیکول اوربیتال را تشکیل می دهد؛ در هایبریدیزیشن نه تنها اوربیتال های s و p سهم گرفته؛ بلکه اوربیتال های d و f نیز سهم می باشند.

هایبریدیزیشن sp^2 در مرکبات کاربن که باعث تشکیل رابطه دو گانه می گردند، موجود است. ساده ترین مالیکول عضوی که دارای رابطه دو گانه بین دو اتموم کاربن است، عبارت از مرکب ایتلین بوده که دارای ساختمان لیویس ذیل می باشد:




شکل (1 - 11) ساختمان لیویس در مالیکول ایتلین



تجربه نشان می‌دهد که مالیکول ایتلین دارای ساختمان مسطح بوده و زوایای رابطه وی در آن در حدود 120° است.


هایبریدیزیشن بین دو اتم کربن در مرکب ایتلین چه نوع است؟
در ساختمان لیویس ایتلین دیده می‌شود که هر اتم کربن با یک اتم دیگر کربن رابطه برقرار نموده است. سه اوربیتال هیبرید شده برای تشکیل رابطه‌های هراتوم کربن با سه اتم دیگر در اطراف آن (یک اتم کربن و دو اتم هایدروجن) ضرورت است؛ ازاین سبب باعث تشکیل هایبریدیزیشن sp^2 می‌گردد.

شکل فضای اوربیتال‌های sp^2 به اطراف اتم کربن چگونه است؟ هر سه اوربیتال مذکور در یک سطح قرار داشته و زوایای بین آنها 120° است، طوریکه اوربیتال p هایبرید نشده به شکل عمود بالای سطح قرار داشته که در شکل (1 - 12) نشان داده شده است.



شکل (1 - 12) تشکیل رابطه مرکب ایتلین دو اوربیتال هیبرید sp^2

در تشکیل روابط در مرکب ایتلین دو اوربیتال هیبرید sp^2 دو اتم کربن هریک با دو اتم هایدروجن رابطه برقرار نموده و دو رابطه $C-H$ را تشکیل می‌دهد. یک هیبرید اوربیتال sp^2 باقیمانده در هر اتم کربن با همدیگر تداخل مستقیم نموده و باعث تشکیل رابطه σ در بین دو اتم کربن گردیده طوری که شما پیش از این در تشکیل رابطه ایتلین مشاهده نمودید، رابطه دوم در بین دو اتم کربن در اثر تداخل جانبی اوربیتال‌های الکترونی هایبرید نشده p آنها به وجود می‌آید که در شکل (1 - 13) نشان داده شده است:



شکل (1 - 13): تشکیل رابطه‌ها با استفاده از اوربیتالها در مرکب ایتلین

از تداخل جانبی اوربیتال‌های p در بین دو اتم کربن رابطه به میان می‌آید که به نام رابطه پای (π) یاد می‌شود. الکترون‌های اوربیتال p_z غیر هایبرید شده دو اتم کربن در قسمت بالا و پایین سطح

مالیکول با همدیگر شریک شده، رابطه π را تشکیل می دهند. همیشه یک رابطه دوگانه شامل یک رابطه σ و یک رابطه π می باشد. رابطه π از تداخل جانبی اوربیتال های غیر هایبرید شده p تشکیل می گردد (شکل 1 - 13 را ملاحظه نمایید).

فکر کنید




به نظر شما رابطه σ قوی و مستحکم است و یا اینکه رابطه π تشریح کنید.

sp هایبرید: در فوق مطالعه نمودید که چطور می توانیم با استفاده از هایبریدیزیشن sp^2 رابطه دوگانه بین دو اتوم کاربن را توضیح نماییم، حالا می آموزیم که چطور با استفاده از هایبریدیزیشن sp می توانیم رابطه سه گانه را بین دو اتوم کاربن توضیح نماییم؛ در این نوع هایبرید یک اوربیتال s و یک اوربیتال p با هم امتزاج نموده، در نتیجه هایبرید sp ($sp - hybrid$) تشکیل می گردد که زاویه ولانسی روابط 180° بوده، مثال آن را می توان هایبرید sp عناصر Hg, Cd, Zn, Be در مرکبات هلوجنیدها ارائه کرد. نتایج تجربی نشان می دهد که Hg, Cd, Zn, Be هایبرید sp را در هلوجنیدها دارا بوده و مرکبات آن ها دارای ساختمان هندسی خطی می باشد. سهم s و p هر یک $\frac{1}{2}$ است.


شکل (1 - 14) هایبرید sp :

هایبرید sp و تشکیل رابطه سه گانه را در مرکب استلین (C_2H_2) که ساده ترین مرکب عضوی است، با ساختمان لیویس آن قرار ذیل مطالعه می نماییم:



شکل (1 - 15) مرکب استلین با ساختمان لیویس آن


طوری که در شکل دیدید، استلین یک مالیکول خطی بوده که زاویه رابطه آن مساوی به 180° است. کدام نوع هایبریدیزیشن در اتوم های کاربن مرکب استلین موجود است؟ هر اتوم کاربن در مالیکول استلین به دو اوربیتال هایبرید ضرورت دارد که بین هم و اتوم هایدروجن رابطه ها را برقرار نمایند:



شکل (1 - 16) هایبرید sp دو اتم کربن در استلین

در شکل 1 - 16 موقعیت اوربیتال‌ها در اتم کربن و هایبریدیزیشن sp ملاحظه می‌گردد که دو اوربیتال sp حالت خطی داشته و زاویه 180° را تشکیل می‌دهند. در حالیکه دو اوربیتال هایبریدیزیشن ناشده هریک از اتم‌های کربن بالای همدیگر و بالای خطی که دو اوربیتال sp را ارتباط می‌دهد، عمود واقع می‌باشد.

برای تشکیل استلین، یک هایبرید اوربیتال sp هر اتم کربن با یک اوربیتال $1s$ اتم‌های هایدروجن تداخل مستقیم نموده و رابطه $C-H$ را برقرار می‌نمایند. دو اوربیتال sp باقیمانده در دو اتم کربن تداخل مستقیم نموده رابطه σ را در بین دو اتم کربن تشکیل می‌دهند و دو الکترون هریک از اتم‌های کربن که در اوربیتال‌های غیر هایبرید شده p قرار دارند، از تداخل جانبی و موازی این اوربیتال‌ها با همدیگر دو رابطه π را در بین اتم‌های کربن در مالیکول استلین به وجود می‌آورند که در شکل ذیل نشان داده شده است:



شکل (1 - 17) تشکیل رابطه‌ها در استیلین با استفاده از اوربیتال‌های هایبرید شده

فعالیت



بادر نظر داشت ساختمان مالیکولی مرکبات و ترسیم آنها، هایبریدیزیشن آکسیجن را در مالیکول آب و هایبریدیزیشن اتم‌های کربن شماره 1 - 4 را در مالیکول $CH_3-CH=C=CH_2$ مشخص سازید.

فعالیت



شکل فضایی مالیکول SO_3 را تحریر و به سوالات ذیل جواب ارائه نماید.

1 - چند جوهره‌های الکترونی اتم سلفر را احاطه می‌نماید

خلاصه فصل اول



- کیمیای عضوی عبارت از کیمیای مرکبات کاربن، هایدروجن و مشتقات آن است.
- کاربن دارای ساختمان الکترونی $1s^2 2s^2 2p^2$ بوده و اتم کاربن به حالت تحریک ساختمان الکترونی $1s^2 2s^1 2p^3$ را دارا است
- برای پوره کردن حالت هشت الکترونی (octate) قشر الکترونهای ولانسی، اتم کاربن چهار الکترون ولانسی خود را با دیگر اتمها به شمول دیگر اتمهای کاربن شریک ساخته، در نتیجه ولانسی کاربن چهار است.
- اتمهای کاربن می تواند رابطه یگانه، دو گانه و سه گانه را تشکیل دهند.
- Hybridization عبارت از اختلاط دوویا چندین اوربیتال اتمی مختلف بوده که دو ویای چندین اوربیتال هایبیرییدی جدید را به میان می آورند.
- sp^3 هایبیریذیشن: این نوع هایبیریذیشن را اتمهای کاربن در هایدروکاربنهای مشبوع دارا بوده و طوری است که یک اوربیتال s با سه اوربیتال p در نتیجه جذب انرژی باهم مختلط گردیده و چهار اوربیتال هایبیرید شده sp^3 را تشکیل می دهند.
- sp^2 هایبیریذیشن: در این نوع هایبیریذیشن یک اوربیتال s و دو اوربیتال p با هم امتزاج حاصل نموده، در نتیجه سه اوربیتال هایبیرید شده sp^2 را تشکیل می دهند.
- sp هایبیرید: در این نوع هایبیرید یک اوربیتال s و یک اوربیتال p با هم امتزاج نموده، در نتیجه هایبیرید sp تشکیل می گردد.
- اتمهای کاربن می تواند زنجیرهای کاربنی، زنجیرهای منشعب و حلقه ها را با همدیگر تشکیل دهند.
- رابطه سگما: اگر پوشش ابرهای الکترونی به امتداد خطی که هسته های دو اتم را وصل می سازد، صورت بگیرد، یعنی تداخل اوربیتالها مستقیم و اعظمی باشد رابطه مستحکم بوده و به نام رابطه سگما (σ) یاد می شود
- رابطه π : رابطه بین دو اتم در مالیکولها می تواند دو گانه و یا سه گانه باشد. این نوع رابطه توسط بیشتر از یک جوره الکترونها تشکیل می گردد؛ به طور مثال: در مالیکول آکسیجن رابطه بین دو اتم آکسیجن دو گانه و در مالیکول نایتروجن رابطه بین دو اتم آن سه گانه است. اگر تداخل اوربیتالهای اتمی جانبی باشد؛ یعنی پوشش ابر الکترونی اوربیتالهای p جانبی بوده باشد و بالای محور x عمود قرار گیرد، این رابطه تشکیل شده به نام رابطه π یاد می شود.
- رابطه دو گانه متشکل از یک رابطه سگما (σ) و یک رابطه π و رابطه سه گانه متشکل از یک سگما (σ) و دو پای (π) می باشد.


سوالات فصل اول

سوالات چهار جوابه


- 1 - اتم کاربن در حالت تحریک قرار داشته و ساختمان الکترونی ----- را دارا است:
الف - $1s^2 2s^2 2p^2$ ب - $1s^2 2s^1 2p^3$ ج - $1s^2 2s^1 2p^3$ د - $1s^2 2s^1 2p^2$
- 2 - نصف طول عمر $^{14}_6C$ --- سال است و در نتیجه تشعشع ---- به نایتروجن مبدل می گردد:
الف - $5568, \beta^+$ ب - $5730, \bar{\beta}$ ج - $5580, \gamma$ د - $5580, \alpha$
- 3 - در تمام مرکبات عضوی هر اتم کاربن --- رابطه اشتراکی را با دیگر اتم های کاربن یا اتم های عناصر دیگر؛ از قبیل: هایدروجن، آکسیجن، نایتروجن و هلوجن ها تشکیل می دهد.
الف - دو رابطه ب - سه رابطه ج - چهار رابطه د - یک رابطه
- 4 - کاربن می تواند رابطه های ----- دارا باشد
الف - یگانه، ب - دو گانه، ج - سه گانه د - هر سه جواب درست است.
- 5 - بین هر اتم کاربن و هر اتم هایدروجن یک رابطه موجود بوده که ---- الکترون مشترک بین آنها موجود می باشد.
الف - یک جوهر ب - دو جوهر ج - سه جوهر د - چهار جوهر
- 6 - Hybrid عبارت از اختلاط دو یا چندین ---- مختلف بوده که دو یا چندین اوربیتال ---- جدید را به میان می آورد.
الف - اوربیتال اتمی، هایبریدی ب - اوربیتال مالیکولی، هایبریدی
ج - الف و ب هر دو د - هیچکدام
- 7 - اگر یک اوربیتال s با سه اوربیتال p در نتیجه جذب انرژی با هم مختلط گردد، کدام اوربیتال هایبرید را تشکیل می دهند؟
الف - sp ب - sp^4 ج - sp^2 د - sp^3
- 8 - سهم s در هر اوربیتال sp^2 مساوی به --- وزاویه ولانسی در بین این اوربیتال ها ---- است.
الف - 120° و $\frac{1}{3}$ ب - 120° و $\frac{2}{3}$ ج - 180° و $\frac{2}{3}$ د - 180° و $\frac{4}{5}$
- 9 - اگر یک اوربیتال s و یک اوربیتال p با هم امتزاج نمایند کدام هایبرید حاصل می شوند؟
الف - sp ب - sp^2 ج - sp^3 د - spd
- 10 - اگر تداخل اوربیتال ها مستقیم و اعظمی باشد، رابطه مستحکم بوده و به نام رابطه ---- یاد می شود.
الف - سگما ب - σ ج - الف و ب د - هیچکدام
- 11 - در مرکب $CH_3 - CH = CH - C \equiv CH$ چند رابطه π موجود است؟
الف - سه ب - چهار ج - پنج د - دو

سوالات تشریحی


- 1 - چرا مالیکول‌ها با فورمول‌های CH_3 یا C_2H_5 موجود بوده نمی‌توانند؟
- 2 - چند اتم هایدروجن با هر یک از اتم‌های کاربن در اسکلیت کاربنی $C-C=C-C \equiv C$ ترکیب شده می‌تواند؟
- 3 - ساختمان لیویس و روابط خطی ایتایل دیهاید (CH_3CHO) را رسم نمایید.
- 4 - ساختمان روابط خطی پروپین ($CH_3CH=CH_2$) را با هایپریدیزیشن و زوایای روابط آن ترسیم نمایید.
- 5 - هایپریدیزیشن اتم‌های کاربن را در مالیکول مرکبات ذیل مشخص سازید:



- 6 - با استفاده از هایپریدیزیشن، تشکیل رابطه‌ها را در مرکب CCl_4 توضیح دهید.
- 7 - هایپریدیزیشن اتم مرکزی را در مالیکول مرکبات ذیل توضیح دهید:



- 8 - زاویه رابطه وی در مالیکول‌های ذیل به صورت تقریبی چند خواهد بود؟



- 9 - مودل مالیکول اسپرین را قرار ذیل به دقت ملاحظه نموده، فورمول مالیکولی آن را به اساس روابط خطی ترسیم و هایپریدیزیشن اتم‌های کاربن را در آن مشخص سازید.
(در مودل اسپرین گلوله نصولی اتم کاربن، سرخ اتم آکسیجن و سرخ مایل به سفید اتم‌های هایدروجن را افاده می‌کند):




مالیکول اسپرین:

- 10 - در مرکبات ذیل چند رابطه سگما و چند رابطه پای موجود است؟ ساختمان لیویس آن را تحریر داشته و هم هایپریدیزیشن تمامی اتم‌های کاربن را توضیح بدارید:



فصل دوم

ساختمان مالیکولی و فورمول‌ها




مالیکول‌های مرکبات کیمیای از جمله مالیکول‌های مرکبات عضوی دارای ترکیب خاص مربوط به خود بوده و از اتم‌های عناصر به اشکال مختلف و با قوه‌های مختلف تشکیل گردیده اند. مالیکول‌های مرکبات با ترکیب مختلف دارای اتم‌های عناصر مختلف بوده که طرز روابط اتم‌ها نیز به اشکال مختلف ملاحظه می‌گردند. باید بدانیم که مالیکول چیست و ساختمان مالیکول‌ها چه نوع است؟ مالیکول‌های مرکبات توسط کدام اشکال و سمبول‌ها ارائه می‌شوند؟ فورمول چیست و کدام مشخصات مالیکول را ارائه می‌کند؟ فورمول‌ها چند نوع اند و چگونه تحریر می‌گردند؟ ایزومیری چیست و چطور مفهوم ایزومیری را توضیح کرده می‌توانیم؟ با مطالعه این فصل می‌توان به سؤالات فوق جواب ارائه کرد.

۲-۱: فورمول مالیکولی

یک مرکب کیمیاوی را به طور معمول توسط طرز ترتیب سمبول‌های عناصر تشکیل دهنده آن با ضرایب نسبتی که به نام ضرایب استیکیومتری (Stoichiometry) نیز یاد می‌شود، نشان می‌دهند. به طور مثال: NaCl نشان دهنده نمک طعام و H_2O نشان دهنده آب است که طرز ترتیب سمبول‌های عناصر تشکیل دهنده با ضرایب نسبتی مرکبات را به نام فورمول مالیکولی یاد می‌نمایند. یک مالیکول آب از دو اتوم هایدروجن و یک اتوم اکسیجن تشکیل گردیده است، به این اساس فورمول مالیکولی آب H_2O است.

فورمول مالیکولی را می‌توان به اساس تجزیه کیمیاوی تعیین نمود. در این فورمول تعداد نسبتی اتوم‌های عناصر مختلف در یک مرکب نشان داده می‌شود. (کلمه تجربی درین جا به این معنی است که فورمول ارائه شده تنها به اساس مشاهده و اندازه گیری؛ یعنی تحلیل توصیفی و مقداری مشخص گردیده است). مالیکول گلوکوز دارای 6 اتوم کاربن، 12 اتوم هایدروجن و 6 اتوم اکسیجن بوده و فورمول تجربی آن CH_2O است که تنها نسبت اتوم‌های کاربن، اتوم‌های هایدروجن و اتوم‌های اکسیجن را در مالیکول گلوکوز نشان می‌دهد. چون این نسبت‌ها همواره ساده ترین شکل یک ماده را آشکار می‌سازد، که این فورمول را به نام فورمول ساده نیز یاد می‌کنند. در شکل ذیل فورمول‌های گلوکوز به چندین شکل نشان داده شده است:






فورمول مالیکولی $C_6H_{12}O_6$

فورمول تجربی CH_2O

شکل (2 - 1): فورمول‌های گلوکوز

فورمول‌های تجربی

در جدول زیر مثال‌های فورمول تجربی و مالیکولی ارائه شده است:
جدول (2 - 1): مقایسه فورمول تجربی و مالیکولی

| مرکب | فورمول ساده | فورمول مالیکولی | کته مالیکولی | طرز نمایش |
|---------------|-------------|-----------------|--------------|---|
| فارم الدیهاید | CH_2O | CH_2O | 30.03 |  |
| استیک اسید | CH_2O | $C_2H_4O_2$ | 60.06 |  |
| گلوکوز | CH_2O | $C_6H_{12}O_6$ | 180 |  |

برای این که فورمول ساده و مالیکولی مرکبات را به درستی تحریر و دریافت نموده باشیم، لازم است تا تحلیل توصیفی و مقداری مرکب را بدانیم. با دانستن تحلیل توصیفی و مقداری مرکب می توان فورمول تجربی آن را قرار مواد ذیل تحریر و دریافت کرد:

- 1 - کمیت های مقداری هر عنصر را که در اثر آنالیز (تجزیه) حاصل شده است، به مول تبدیل می کنیم.
- 2 - مقدار مول های هر عنصر تشکیل دهنده مرکب را که قرار ماده 1 حاصل نمودیم، به گونه دقیق ملاحظه نموده، کمیت کوچک آن ها را بر ملا می سازیم، سپس تمام کمیت مولی عناصر متشکله مالیکول مرکب مطلوب را تقسیم بر همین کمیت کوچک مولی نموده، ارقام بدون واحدهای قیاسی حاصل می شود.
- 3 - کمیت های رقمی که طبق ماده 2 حاصل می گردد، به گونه دقیق مطالعه شده، در صورتی که اعداد تام باشد، ضرایب اتوم های عناصر متشکله مالیکول مرکب را در فورمول ساده نشان داده و اگر ارقام تام نباشند، آن ها را به طریقه رونداف و یا ضرب نمودن کوچکترین عدد تام، به اعداد تام تبدیل نموده، این اعداد تام نسبت اتومی عناصر را در فورمول ساده افاده می کند، ارقام نسبتی عناصر را با در نظر داشت طرز تحریر درست فورمول مالیکولی به سمبول های عناصر کیمیاوی ضمیمه ساخته، فورمول ساده حاصل می شود.

- 4 - غرض تحریر درست فورمول مالیکولی مرکب، علاوه از داشتن تحلیل توصیفی و مقداری باید کتله مالیکولی مرکب نیز معلوم باشد، بدین اساس با در نظر داشت تحلیل توصیفی و مقداری قرار مواد فوق فورمول ساده را دریافت و کتله مالیکولی مرکب مطلوب را به کتله مالیکولی نسبتی فورمول ساده تقسیم و عدد تام حاصل خواهد شد که این عدد را به نسبت عناصر در فورمول ساده ضرب نموده و در نتیجه فورمول مالیکولی مرکب حاصل می گردد:

$$n = \frac{\text{کتله فورمول مالیکولی}}{\text{کتله فورمول تجربی}}$$

مثال اول: به مقدار 7.2g یک مرکب عضوی با اکساید مس در نل امتحانی حرارت داده شده است و در نتیجه 10.52 گرم کاربن دای اکساید و 4.32 گرم بخارات آب حاصل گردیده است، اگر به مقدار 1.8 گرم آن در 50 گرم آب حل گردد، محلول حاصل به حرارت 0.37°C - منجمد می گردد، فورمول ساده مرکب مذکور را تحریر دارید.

ماده عضوی کاربن دای اکساید

حل: فیصدی کاربن دای اکساید

$$\left. \begin{array}{rcl} 10.52\text{g CO}_2 & - & 7.2\text{g} \\ x & - & 100 \end{array} \right\} x = \frac{10.52\text{g} \cdot 100}{7.2\text{g}} = 146.11\%$$

فیصدی کاربن:

$$\left. \begin{array}{rcl} 44\text{g CO}_2 & - & 12\text{gC} \\ 146.11\text{gCO}_2 & - & x \end{array} \right\} x = \frac{146.11\text{gCO}_2 \cdot 12\text{gC}}{44\text{CO}_2} = 40\%\text{C}$$

فیصدی آب:

$$\left. \begin{array}{rcl} \text{مادهٔ عضوی} & \text{مقدار آب} & \\ 4.32gH_2O & - & 7.2g \\ x & - & 100 \end{array} \right\} x = \frac{4.32g \cdot 100}{7.2g} = 60\%$$

فیصدی هایدروجن:

$$\left. \begin{array}{rcl} 18gH_2O & - & 2gH \\ 60gH_2O & - & x \end{array} \right\} x = \frac{6.6g \cdot 100}{7.2} = 6.67\%$$

فیصدی اوکسیجن:

$$\left. \begin{array}{rcl} 18gH_2O & - & 16gO \\ 60gH_2O & - & x \end{array} \right\} x = \frac{60gH_2O \cdot 16gO}{18H_2O} = 53.3\%$$

$$C = 40g / 12g \cdot mol^{-1} = 3.33mol$$

$$H = 6.66 / 1g \cdot mol^{-1} = 6.66mol$$

فیصدی عناصر را به مول آن تبدیل می‌نماییم بعد از آن تمام

$$O = 53.3 / 16g \cdot mol^{-1} = 3.3mol$$

مول‌ها تقسیم کوچکترین آن نموده تا نسبت اتم‌ها (فورمول

$$C = 3.33mol / 3.33mol = 1$$

ساده) به دست آید.

$$H = 7mol / 3.33mol = 2$$

$$O = 3.3mol / 3.33mol = 1mol$$

$$\left. \begin{array}{l} C=1 \\ H=2 \\ O=1 \end{array} \right\} \text{فورمول ساده } CH_2O$$

از صنف یازدهم می‌دانیم که $\Delta t = K \cdot C_m = K \cdot \frac{m \cdot 1000g \cdot molal}{M \cdot m'}$ است از این جا داریم که:

$$M = K \cdot \frac{m \cdot 1000g \cdot molal}{\Delta t \cdot m'}$$

$$M = 1.85 \frac{CKg}{mol} \cdot \frac{1.8g \cdot 1000g \cdot molal}{0.37C^\circ \cdot 50g} = 180$$

$$M = 180$$

پس فارمول حقیقی از روی کتله مالیکولی دریافت می‌گردد.

$$M(CH_2O)_n = 180$$

$$(12 + 1 \cdot 2 + 16)n = 180$$

$$(30)n = 180 \Rightarrow n = \frac{180}{30} = 6$$

$$(CH_2O)_n = (CH_2O)_6 \Rightarrow C_6H_{12}O_6$$

تحلیل توصیفی و مقداری یک مرکب عضوی نشان داده است که در ترکیب آن به مقدار 6g کاربن و 1.2g هایدروجن شامل است، فورمول بسیط آن را تحریر نمایید. کتله مالیکولی آن 72 است، فورمول مالیکولی آن را دریافت کنید.

فورمول مالیکولی الکان‌ها

فورمول مالیکولی مرکبات را به زبان کیمیاوی معرفی می‌نماید. فورمول نه تنها نوع اتوم‌ها را در مالیکول نشان داده؛ بلکه تعداد و انواع اتوم‌ها را نیز نشان می‌دهد. میتان ساده‌ترین هایدروکاربن الکان بوده و دو مرکب دیگر الکان‌ها عبارت از ایتان C_2H_6 و پروپان C_3H_8 می‌باشد. آیا می‌توانید فورمول الکان دارنده چهار کاربن را تحریر نمایید؟ برای این کار از فورمول سه الکان اولی کمک گرفته و رابطه بین تعداد اتوم‌های کاربن و هایدروجن را در هریک آن دریافت نمایید؛ بنابر این تمامی الکان‌ها دارای فورمول عمومی C_nH_{2n+2} اند، در این فورمول n تعداد اتوم‌های کاربن را در هر الکان نشان می‌دهد.

جدول (2 - 3) تعیین فورمول عمومی الکان‌ها C_nH_{2n+2}

| CH_4 | C_2H_6 | C_3H_8 | C_4H_{10} |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| تعداد | C=2 تعداد | C=3 تعداد | C=4 تعداد |
| H=2(1)+2=4 تعداد | H=2(2)+2=6 تعداد | H=2(3)+2=8 تعداد | H=2(4)+2=10 تعداد |

فعالیت



فورمول مالیکولی الکان‌های را دریافت کنید که تعداد کاربن آن قرار جدول زیر بوده باشد:

| تعداد کاربن (n) هر الکان | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|----|
| فورمول مالیکولی | | | | | | |

۲-۲: فورمول‌های ساختمانی

فورمول‌های مالیکولی مرکبات برای ما نشان می‌دهد که کدام عناصر در ترکیب یک مرکب شامل است و تعداد اتوم‌های آن چه تعداد است؛ اما برای این که بدانیم اتوم‌های عناصر متشکله مالیکول‌های مرکبات چگونه متصل شده‌اند، باید فورمول ساختمانی آنها را نوشته کرده بتوانیم. فورمول‌های ساختمانی معلومات زیادی را در مورد مالیکول مرکب برای ما ارائه می‌کند و موقعیت اتوم‌ها را در مالیکول‌ها برای ما نشان می‌دهد. فورمول‌های ساختمانی علاوه از نوع، تعداد اتوم‌های هر عنصر، شیوه اتصال اتوم‌ها را بایکدیگر نیز نشان می‌دهد.

فورمول‌های تجربی، مالیکولی و ساختمانی دو مالیکول هریک مرکب ایتایل الکول و دای میتایل ایتر را که در جدول (2-2) درج است، باهم مقایسه نمایید. نوع و تعداد اتوم‌ها در هر دو مالیکول مرکبات یکسان بوده؛ اما طرز روابط اتوم‌ها و ساختمان آن‌ها از هم فرق دارد. همین فرق کوچک ساختمانی باعث تفاوت خواص کیمیاوی آن‌ها گردیده است. دای میتایل ایتر گازی است که در یخچال‌ها به کار رفته و ماده بی‌هوش کننده می‌باشد؛ اما ایتانول مایعی است که به حیث محلول مواد عضوی در صنعت از آن استفاده می‌گردد و یک ماده بی‌نشه آور بوده، به انسان بی‌خودی را بار می‌آورد. فورمول‌های ساختمانی آن‌ها مانند ساختمان‌های لیویس است و یک خط کوتاه نمایانگر یک رابطه ساده می‌باشد که تصور یک، یک الکترون در انجام‌های این خط متصور است. مرکباتی که دارای عین ترکیب مالیکولی بوده؛ اما فورمول ساختمانی شان از هم فرق داشته باشند، به نام ایزومیر یکدیگر یاد می‌شوند.

جدول (2-2): مقایسه خواص ایتانول و دای میتایل ایتر

| مرکب | فورمول ساده | فورمول مالیکولی | فورمول ساختمانی | نقطه غلیان | کثافت |
|-----------------|-------------|-----------------|--|------------------|---------------|
| ایتانول | C_2H_6O | C_2H_6O | $ \begin{array}{c} H \quad H \\ \quad \\ H-C-C-O-H \\ \quad \\ H \quad H \end{array} $ | $78^{\circ}C$ | $0.816g/cm^3$ |
| دای میتایل ایتر | C_2H_6O | C_2H_6O | $ \begin{array}{c} H \quad H \\ \quad \\ H-C-O-C-H \\ \quad \\ H \quad H \end{array} $ | $-24.5^{\circ}C$ | $0.661g/cm^3$ |


۲-۳: طرز نوشتن فورمول‌های ساختمانی

چطور می‌توان اشکال هندسی مالیکول‌ها را پیشبینی کرد و آن را نوشت؟ تاحال مطالب زیادی را در مورد ساختمان مالیکول‌ها آموختید؛ اما جهت گیری سه بعدی یا ساختمان هندسی مالیکول‌ها را مطالعه نکرده اید. اشکال هندسی مالیکول‌ها عامل بسیار مهمی در تعیین خواص کیمیاوی آن‌ها است. مالیکول‌های ساده دارای شکل هندسی ساده اند مالیکول‌های دو اتومی مانند مالیکول هایدروجن دارای یک شکل ساده بوده که قرار ذیل نمایش داده شده است؛ اما مالیکول‌های که بیشتر از دو اتوم را دارند، دارای اشکال هندسی مغلق بوده و باید معلومات زیادی ارائه گردد:



شکل (2-2) مالیکول‌های دو اتومی مانند مالیکول هایدروجن

به صورت عموم بین فورمول مالیکولی یک مرکب و شکل هندسی آن رابطه روشن موجود نیست؛ به طور مثال: دو مالیکول مرکبات هر یک کاربن دای اکساید (CO_2) و سلفردای کساید (SO_2) را در نظر می گیریم، در هر دو مرکب سه اتم موجود است که دو اتم آن آکسیجن است؛ اما مالیکول های این دو مرکب دارای اشکال مختلف هندسی اند، مالیکول CO_2 خطی و مالیکول SO_2 خمیده است چرا؟ جواب این سؤال را می توان در ساختمان الکترون های ولانسی، به گونه خاص جوهره الکترون های آزاد اتم های آن ها جستجو کرد:




شکل (2 - 3): مودل ساختمان مالیکول کاربن دای اکساید و سلفردای اکساید

یکی از نظریاتی که برای پیشبینی اشکال هندسی مالیکول ها ارائه شده است، عبارت از نظریه قوه دافعه جفت الکترون های قشر ولانسی (VSEPR) ارائه می گردد. مطابق به این نظریه، قوه های دافعه الکتروستاتیکی موجود بین جفت الکترون های رابطیه و یا نارابطیه در یک مالیکول سبب می شود تا این الکترون ها تا حد امکان از هم فاصله گرفته و جهت داشته باشد و این جهت گیری جفت الکترون ها طوری است که پایدار ترین ساختمان هندسی را به مالیکول فراهم می کند. ساختمان خاصی از اتم ها که باعث می شود تا بین جوهره الکترون های رابطیه و غیر رابطیه مالیکول ها کمترین دفع موجود باشد، به نام ساحة الکترونی یاد می شود و عبارت از ساحة اطراف اتم مرکزی است که الکترون ها صرف نظر از تعداد در آنجا موجود باشد. به اساس این تعریف رابطه های یگانه، دو گانه و سه گانه یک ساحة به شمار می رود.

فعالیت

برای نشان دادن شکل هندسی مالیکول ها می توان از پوقانه های باد دار استفاده کرد. چندین پوقانه را تهیه و تجارب زیر را انجام دهید:

1 - ابتدا دو پوقانه کوچک را به عین اندازه باد پر نمایید، سپس با استفاده از نخ سر پوقانه ها را با همدیگر طوری بسته کنید که باهم نزدیک بوده؛ اما آزاد باشند. پوقانه ها را روی پارچه ابریشمی مالش داده تا چارج برقی حاصل نمایند؛ سپس آن ها را روی میز رها نمایید تا حالت ثابت را به خود اختیار کنند، پوقانه ها کدام یک از حالت های زیر را به خود اختیار خواهد کرد؟



(ب)



(الف)

شکل (2 - 4)

2- اگر در آزمایش فوق سه پوقانه را به کار ببرید، کدام ساختمان زیر به آن‌ها مناسب خواهد بود؟



(ب)



(الف)

شکل (2 - 5)

3- اگر در آزمایش فوق چهار پوقانه را به کار ببرید، کدام ساختمان زیر به آن‌ها مناسب خواهد بود؟



(ب)



(الف)

شکل (2 - 6)

4- چطور شکل هندسی مالیکول‌ها به اساس ساختار لیویس آن‌ها تعیین می‌گردند؟

برای این مقصد طبق شیوهای زیر عمل می‌گردد:


1- ساختار لیویس مالیکول رسم می‌گردد.

2- تعداد ساحه‌های الکترونی در اطراف اتوم مرکزی معین می‌گردد.

3- ساختمان هندسی مناسب را بر اساس تعداد ساحه‌های الکترونی مشخص سازید.

زاویه راکه سه اتوم مرتبط شده باهم تشکیل می‌دهد، به نام زاویهٔ رابطیه‌ی یاد می‌کنند که حد اکثر این 180° زاویه است.

دو ساحة الكتروني (ساختار خطي): مالیکول CO_2 راکه دارای ساختمان لیویس است، در نظر می‌گیریم:




در اطراف اتوم مرکزی دوساحة الكتروني (چپ و راست) موجود است. تنها جهت گیری ممکنه که می‌تواند دو ساحة الكتروني اطراف اتوم کاربن را تا حد امکان دور از یکدیگر قرار دهد، عبارت از ساختمان خطي می‌باشد. شکل زیر را ملاحظه نمایید.

شکل (2 - 7) ساختمان مالیکول خطي

مطابق به نظریهٔ (VSEPR) مالیکولی که دارای دوساحة الكتروني در اطراف اتوم مرکزی اند، طوری که در کاربن دای اکساید دیده می‌شود، ساختمان خطي را دارا است و زاویهٔ ولانسی 180° است.

سه ساحة الكتروني (ساختار سه ضلعي یا مسطح)

در این مورد ساختمان سلفر برای اکساید (SO_3) را ملاحظه می‌نماییم:



در SO_3 ساحة سه بعدی الكتروني در اطراف اتوم مرکزی (S) موجود است. ساختمان هندسی این مالیکول که سه ضلعي یا مسطح است قرار ذیل می‌باشد:



شکل (2 - 8) ساختمان مسطح مالیکول

در مالیکول‌های مانند SO_3 ، زمانی که اتوم مرکزی توسط سه اتوم دیگر احاطه شده باشد و جوهره‌های

الکترونی در آن نوع الکترون‌های رابط‌ه‌یی باشد، ساختمان مالیکول مسطح بوده و زاویه ولانسی آن 120 درجه است.


چهار ساحة الکترونی (ساختر چهار وجهی)

وضعیت مالیکول‌های که چهار ساحة الکترونی را دارا اند، ساختمان مالیکول آن‌ها کمی پیچیده است که مثال آن را می‌توان میتان CH_4 ارائه کرد؛ زیرا به عوض یک شکل مسطح که در صفحه کاغذ نمایش داده می‌شود؛ دارای یک شکل سه بعدی موسوم به چهار وجهی است. چند طریقه نمایش مختلف مالیکول میتان در شکل (2 - 9) نشان داده شده است. اشکال را می‌توان به صورت سه پایه در نظر گرفت که پایه چهارمی آن به سمت بالا بر آن استوار است. در این نوع ساختمان جوره‌های الکترونی بایکدیگر زاویه 109.5° است.

(ب)

شکل (2 - 9) فورمول‌های مالیکولی میتان

مالیکول‌های که دارای جوره الکترون غیر رابط‌ه‌یی اند در صورت موجودیت جوره الکترون‌های غیر رابط در مالیکول‌ها، زوایای رابط‌ه‌یی را طوری تنظیم کنید که برای ساحة‌های الکترونی مربوط به جوره‌های غیر رابط‌ه‌یی فضای بزرگتری باز گردد. اتم سلفر را در مالیکول SO_2 ملاحظه نمایید:



به اطراف اتم سلفر سه ساحة الکترونی موجود بوده؛ از این سبب ساختار آن به گروپ سه ضلعی مسطح مربوط است. در این ساختمان ساحة‌های الکترونی با هم زاویه 120 درجه را دارا اند؛ اما یک جوره الکترونی غیر رابط‌ه‌یی در مقایسه با یک جوره الکترون رابط‌ه‌یی فضای زیاد را اشغال می‌نماید؛ زیرا جوره الکترون‌های غیر رابط‌ه‌یی تحت تأثیر یک هسته بوده و در حالی که جوره الکترون‌های رابط‌ه‌یی تحت تأثیر دوهسته قرار دارند. قوه دافعه بین جوره‌های الکترونی غیر رابط‌ه‌یی - رابط‌ه‌یی کمی بیشتر از قوه دافعه بین جوره الکترون‌های رابط‌ه‌یی - رابط‌ه‌یی است. در اثر این قوه دفع بیشتر، جوره الکترون‌های رابط‌ه‌یی کمی از همدیگر دور شده، از این سبب است که زاویه رابط‌ه‌یی مالیکول SO_2

که باید 120 درجه باشد، به 119.5 درجه تقلیل نموده است. در مورد SO_2 باید گفت که در آن رابطه دو گانه و سه گانه نیز به همین ترتیب بوده؛ زیرا ساحت الکترونی آنها نسبت به ساحت الکترونی رابطه یگانه به فضای بیشتر نیاز دارد. اشکال ذیل فورمول‌های مالیکولی ایتلین و استلین را نشان می‌دهد که بین دو کاربن در مالیکول شان به ترتیب رابطه دو گانه و سه گانه موجود است:

شکل (2 - 10) ساختمان مالیکول ایتلین



شکل (2 - 11): فورمول و ساختمان خطی مالیکول استلین

فورمول ساختمانی بعضی الکان‌ها در جدول زیر تحریر گردیده است:


جدول (2 - 3) نام و ساختمان لیویس بعضی الکان‌ها

| نام الکان | فورمول مالیکولی | فورمول ساختمانی |
|-----------|---------------------------|--|
| پروپان | C_3H_8 | $\begin{array}{ccccccc} & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} & \\ & & & & & & \\ \text{H} & - \text{C} & - & \text{C} & - & \text{C} & - \text{H} \\ & & & & & & \\ & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} & \end{array}$ |
| بیوتان | C_4H_{10} | $\begin{array}{ccccccc} & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} \\ & & & & & & & \\ \text{H} & - \text{C} & - & \text{C} & - & \text{C} & - & \text{C} & - \text{H} \\ & & & & & & & \\ & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} \end{array}$ |

| | | |
|--------|----------------|--|
| پنتان | C_5H_{12} | $ \begin{array}{ccccccc} & H & & H & & H & & H & & H \\ & & & & & & & & & \\ H & -C & - & C & - & C & - & C & - & C & -H \\ & & & & & & & & & \\ & H & & H & & H & & H & & H \end{array} $ |
| هگزان | C_6H_{14} | $ \begin{array}{ccccccc} & H & & H & & H & & H & & H & & H \\ & & & & & & & & & & & \\ H & -C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & -H \\ & & & & & & & & & & & \\ & H & & H & & H & & H & & H & & H \end{array} $ |
| هپتان | C_7H_{16} | $ \begin{array}{ccccccc} & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H \\ & & & & & & & & & & & & & \\ H & -C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & -H \\ & & & & & & & & & & & & & \\ & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H \end{array} $ |
| اوکتان | C_8H_{18} | $ \begin{array}{ccccccc} & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H \\ & & & & & & & & & & & & & & & \\ H & -C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & -H \\ & & & & & & & & & & & & & & & \\ & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H \end{array} $ |
| نونان | C_9H_{20} | $ \begin{array}{ccccccc} & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H \\ & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ H & -C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & -H \\ & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H \end{array} $ |
| دیکان | $C_{10}H_{22}$ | $ \begin{array}{ccccccc} & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H \\ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ H & -C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C & -H \\ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H & & H \end{array} $ |

اگر به ساختمان الکان‌های جدول فوق توجه شود، دیده می‌شود که اینها به اندازه یک گروپ متلین $(-CH_2-)$ از هم فرق دارند. مرکباتی که به اندازه یک $(-CH_2-)$ از هم فرق داشته باشند، به نام هومولوگ یکدیگر (homolog) یاد می‌شوند.

آیا می‌توانید به اساس ساختمان‌های زیر فورمول مالیکولی مرکبات را تحریر نمایید؟



طوری که دیده می‌شود، الکان الف وب هر دو دارای عین فورمول مالیکولی (C_4H_{10}) بوده؛ اما ساختمان زنجیر کاربنی آنها از همدیگر فرق دارند، طوری که اولی (الف) زنجیر نارمل و مستقیم داشته، در حالی که دومی (ب) زنجیر منشعب دارد. از توضیحات فوق نتیجه گیری می‌شود که فورمول مالیکولی برای ما تمام اطلاعات را در مورد مرکب ارائه نداشته؛ اما فورمول‌های ساختمانی طرز روابط اتم‌های شامل مالیکول مرکب برای ما معلومات ارائه می‌کند.

مثال

شکل هندسی مالیکول آب (H_2O) و امونیا (NH_3) را پیشینی نموده، تحریر دارید.

حل

1 - ساختمان لیویس آن‌ها را تحریر می‌نماییم:



2 - تعداد ساحت‌های الکترونی را به اطراف اتم مرکزی هر دو مالیکول می‌شماریم

الف - اتم نایتروجن در NH_3 سه رابطه را با هایدروجن دارا بوده و یک جوهر الکترون آزاد دارد؛ بنابراین چهار ساحت الکترونی را دارا است.

ب - اتم آکسیجن در H_2O دو رابطه را با هایدروجن دارا بوده و دو جوهر الکترون آزاد دارد؛ بنابراین چهار ساحت الکترونی را دارا است.

3 - ساختمان هندسی مناسب را بر اساس نظریه VSEPR تعیین می‌نماییم:


الف - ساحت الکترونی در هر اتم دارای ساختمان چهار وجهی خواهد بود و زاویه رابطه‌ی 109.5° درجه است.

4 - وضعیت جوهره‌های الکترونی را مشخص می‌نماییم.

الف - در مورد آمونیا چهار وجهی را به شکل سه پایه در نظر می‌گیریم که پایه چهارمی آن به سمت بالا، بالای آن استوار است. اگر جوهر الکترون آزاد را پایه چهارمی قبول نماییم شکل هندسی به دست آمده یک هرم با قاعده سه ضلعی خواهد بود. (شکل (2 - 12) الف)

ب - در مورد آب، شکل مالیکول آب خمیده بوده و دو جوهر الکترون‌های آزاد دو پایه چهار وجهی را اشغال می‌نماید.

ج - بنابر موجودیت جوهر الکترون‌های غیر رابطه‌ی - غیر رابطه‌ی، غیر رابطه‌ی - رابطه‌ی، و رابطه‌ی - رابطه‌ی که به ترتیب قوه دافعه بین آنها کم می‌شود، زاویه روابط مالیکول آب و آمونیا کمی از زاویه نورمال کوچک شده (زاویه روابط در مالیکول آمونیا و در مالیکول آب است) اشکال ذیل را ملاحظه نمایید:



شکل (2 - 12) ساختمان مالیکولی آمونیا و آب

فعالیت




شکل هندسی مالیکول H_2S را پیشینی و تحریر دارید.

طریقه ساده ساختن فورمول‌های ساختمانی



اگر به فورمول‌های ساختمانی الکان‌ها در جدول (2-3) نظر اندازیم، دریافت می‌داریم که تحریر و ترسیم این‌ها مشکل، غیر اقتصادی و دشوار است؛ ازین سبب طریقه‌های دیگری برای نمایش و تحریر فورمول‌های ساختمانی بنا گذاشته شد که قرار ذیل است:

- برای تحریر فورمول‌های ساختمانی به طور فشرده، روابط ساده بین کاربن‌ها و هایدروجن را نمایش نمی‌دهند و بعضی اوقات روابط بین اتوم‌های کاربن را نیز تحریر نمی‌نمایند؛ به طور مثال:




نمایش علامه‌های کیمیاوی: در این روش تمامی اتوم‌های کاربن و هایدروجن از فورمول ساختمانی حذف می‌شود و تنها روابط که توسط خطوط (-) زاویه دار ارائه می‌گردد، نمایش داده می‌شود. این نوع ساختمان را به نام ساختمان اسکلتی ویاساختمان خط-زاویه یاد می‌کنند، در این ساختمان تنها رابطه‌های کاربن-کاربن (C-C) نمایش داده می‌شود، طوری که موقعیت اتوم‌های کاربن در محل تقاطع خطوط، ابتدا و انجام خطوط تصور می‌گردد و از رسم رابطه‌های C-H خودداری می‌گردد.

اگر از عدد ۴ تعداد روابط اتوم‌های کاربن-کاربن تفریق گردد، تعداد اتوم‌های هایدروجن متصل به همان اتوم کاربن حاصل می‌گردد:




فعالیت



1- فورمول‌های ساختمان نیمه مشرح، مشرح ناقص و اسکلتی مرکبات زیر را تحریر دارید:



2- فورمول‌های ساختمانی مکمل مرکبات زیر را تحریر دارید:



نام کیمیاوی آسپرین، استیل سالیسیلیک اسید است، چون نمایش کامل فورمول ساختمانی آن مشکل است؛ بنابراین کیمادان‌ها به طور معمول از فورمول اسکلتی آن استفاده می‌نمایند که قرار ذیل است:




شکل (۲-۱۳) اسپرین و فورمول آن

بیشتر بدانید: زاویه نورمال بین روابط ولانسی مالیکول مرکبات 109.5° بوده و در تمام مالیکول‌ها باید به همین اندازه بوده باشند؛ از این سبب مالیکول‌های مرکبات هایدرو کاربن زنجیری به شکل زگزاگ ملاحظه می‌شوند










۲-۴: ایزومیرها (Isomers)

در کیمیا به طور خاص در کیمیاوی عضوی مرکبات زیادی موجود است که مالیکول‌های آن‌ها دارای چندین فورمول ساختمانی بوده؛ اما یک فورمول ترکیبی مالیکولی را دارا اند؛ به طور مثال: ایتایل الکول و دای میتایل ایتِر دارای عین فورمول مالیکولی بوده؛ اما فورمول‌های ساختمانی آن‌ها از هم فرق دارند:



طوری که دیده می‌شود، در ایتانول اتوم آکسیجن با یک اتوم کاربن و یک اتوم هایدروجن رابطه داشته؛ در حالی که در مالیکول دای میتایل ایتِر اتوم آکسیجن با دو اتوم کاربن رابطه برقرار نموده است؛ پس مرکباتی که دارای عین فورمول مالیکولی بوده؛ اما فورمول ساختمانی آن‌ها از هم فرق داشته باشند؛ یعنی طرز روابط اتوم‌ها در مالیکول‌های شان از هم متفاوت باشند، ایزومیر (Isomers) همدیگر گفته می‌شوند.

برای استخراج فورمول‌های ایزومیرها توصیه می‌گردد تا به صورت مقدماتی شکل اسکلت کاربنی مالیکول‌های مرکبات را تحریر نموده و بعد از آن به تدریج زنجیر اصلی (عمده) را کوتاه نموده و اتوم‌های کاربن حذف شده از زنجیر اصلی را به شکل زنجیر منشعب (زنجیر جانبی) در تمام حالات ممکنه تحریر کرد؛ به طور مثال: شکل اسکلت کاربنی ایزومیرهای هپتان (C_7H_{16}) را مطالعه می‌نماییم:




فورمول‌های مکمل هایدروکاربن‌ها بعد از تکمیل شکل اسکلیت‌های کاربنی با علاوه نمودن تعداد لازمی هایدروجن‌ها به دست می‌آید.

ایزومیری در مرکبات عضوی زیاد بوده که در هر مبحث مرکبات هایدروکاربن‌ها ومشتقات آن‌ها مطالعه می‌گردد.


الکین‌ها علاوه از ایزومیری ساختمانی ایزومیری نظر به موقعیت رابطه دوگانه، دارای ایزومیری فضایی نیزاند:

الف: ایزومیری ساختمانی و موقعیت رابطه دوگانه

مرکبات ذیل را درنظر بگیرید.



1- Butene.



2- Butene


فورمول جمعی هردو مرکب فوق C_4H_8 بوده؛ اما فورمول ساختمانی هردو مالیکول مرکب ازهم متفاوت بوده، موقعیت رابط دوگانه دراین مرکبات از هم فرق دارد، این ایزومیری را به نام ایزومیری ساختمانی از لحاظ موقعیت رابط دوگانه یاد می‌کنند.

ب - ایزومیری فضایی (Stereo isomeris)

Stereo isomeris کلمه یونانی بوده که به معنی جامد واجسام سخت می‌باشد، بنابراین Stereo isomeris مربوط به مرکباتی است که ساختمان فضایی مستحکم را دارا بوده وشکل هندسی آن در فضا تغییر نمی‌کند.

زیادتر بدانید

الکین‌ها با سایکلوالکان‌ها ایزومیر بوده والکاین‌ها با سایکلو الکین‌ها ایزومیر می‌باشند؛ به طور مثال: مرکب دارای فورمول جمعی C_3H_6 می‌تواند پروپین باشد ویاینکه سایکلو پروپان بوده باشد:



1- propene

Cyclo propane



خلاصه فصل دوم

- * یک مرکب کیمیاوی را به گونه معمول توسط طرز ترتیب سمبول‌های عناصر تشکیل دهنده آن با ضرایب نسبتی که به نام ضرایب استیکیو متری (Stoichiometry) نیز یاد می‌شود، نشان می‌دهند، طرز ترتیب سمبول‌های عناصر تشکیل دهنده با ضرایب نسبتی مرکبات را به نام فورمول مالیکولی یاد می‌نمایند.
- * فورمول مالیکولی را می‌توان به اساس تجزیه کیمیاوی تعیین نمود. نوع دیگری از فورمول‌های کیمیاوی عبارت از فورمول تجربی است، درین فورمول تعداد نسبتی اتوم‌های عناصر مختلف در یک مرکب نشان داده می‌شود. (کلمه تجربی دراین جا به این معنی است که فورمول ارائه شده تنها به اساس مشاهده و اندازه گیری؛ یعنی تحلیل توصیفی و مقداری مشخص گردیده است).
- * فورمول مالیکولی، مرکبات را به زبان کیمیاوی معرفی می‌نماید. فورمول نه تنها نوع اتوم‌ها را در مالیکول نشان داده؛ بلکه تعداد و انواع اتوم‌ها را نیز نشان می‌دهد.
- * فورمول‌های ساختمانی معلومات زیادی را درمورد مالیکول مرکب برای ما ارائه می‌کند، موقعیت اتوم‌ها را در مالیکول‌ها برای ما نشان می‌دهد.
- * اشکال هندسی مالیکول‌ها عامل بسیار مهمی در تعیین خواص کیمیاوی آن‌ها است.
- * یکی از نظریاتی که برای پیشینی اشکال هندسی مالیکول‌ها ارائه شده است، عبارت از نظریه قوه دافعه جفت الکترون‌های قشر ولانسی (Valeance shell Elctronpairs Repulsion) است که به (VSEPR) ارائه می‌گردد. مطابق به این نظریه، قوه‌های دافعه الکترواستاتیکی موجود بین جفت الکترون‌های رابطی و یا غیر رابطی در یک مالیکول سبب می‌شود تا این الکترون‌ها تا حد امکان از هم فاصله گرفته و جهت داشته باشد و این جهت گیری جفت الکترون‌ها طوری است که پایدار ترین ساختمان هندسی را به مالیکول فراهم می‌کند.
- * زاویه راکه سه اتوم مرتبط شده باهم تشکیل می‌دهد، به نام زاویه رابطی یاد می‌کنند که حداکثر آن 180° است.
- * مرکباتی که دارای عین فورمول مالیکولی بوده؛ اما فورمول ساختمانی آن‌ها از هم فرق داشته باشد؛ یعنی طرز روابط اتوم‌ها در مالیکول‌های شان از هم فرق داشته باشند، ایزومیر (Isomers) همدیگر گفته می‌شوند.

تمرین و سؤالات فصل دوم

سؤالات چهار جوابه

- 1 - فورمول مالیکولی را می‌توان به اساس کیمیاوی تعیین نمود.
الف - تعاملات کیمیاوی ب - سنتیز کیمیاوی ج - تجزیه د - هیچکدام
- 2 - برای دانستن فورمول‌های ساده و مالیکولی مرکبات، لازم است تا تحلیل مرکب دانسته شود:
الف - توصیفی ب - مقداری ج - الف و ب د - هیچکدام
- 3 - فورمول‌های ساختمانی علاوه از نوع، تعداد اتوم‌های هر عنصر، اتوم‌ها را بایک دیگر نیز نشان می‌دهد.
الف - شیوه اتصال ب - طرز روابط ج - تعداد مالیکول‌ها د - الف و ب درست است.
- 4 - ساختمان خاصی از اتوم‌ها که باعث می‌شود تا بین جوره الکترون‌های رابطی و غیر رابطی

مالیکول‌ها کمترین قوه دفع موجود باشد، به نام..... یاد می‌شود

الف - مدار الکترونی ب - قشر الکترونی ج - قشر فرعی الکترونی د - ساحت الکترونی
5 - اشکال هندسی مالیکول‌ها عامل بسیار مهمی در تعیین..... آن‌ها است

الف - خواص کیمیاوی ب - خواص فیزیکی ج - الف و ب د - هیچ کدام
6 - در ساختمان چهار وجهی جوره‌های الکترونی بایکدیگر زاویه... است.

الف - 120° ب - 109.5° ج - 309.5° د - 180°

7 - فورمول مالیکولی مرکبات $\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ | & | \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ | & | \\ \text{H} & \text{H} \end{array}$ و $\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ | & | \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{H} \\ | & | \\ \text{H} & \text{H} \end{array}$ عبارت است از:

الف - $\text{C}_4\text{H}_{14}\text{O}$ ب - $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ج - $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}$ د - هیچکدام

8 - شکل مالیکول $\begin{array}{c} \text{H} & \text{N} & \text{H} \\ & : & \\ & \text{H} & \end{array}$ به نام ساختمان کدام عالم زیر یاد می‌شود؟

الف - اوگدرو ب - واندروالس ج - ماکسویل د - لیویس

9 - مرکباتی که دارای عین فورمول مالیکولی بوده؛ اما فورمول ساختمانی آن‌ها از هم فرق داشته،
..... همدیگر گفته می‌شوند.

الف - ایزومیر ب - (Isomers) ج - الف و ب د - هیچکدام

۱۰ - ایزومیری دارای خواص..... فیزیکی است.

الف: مشابه ب: مساوی ج: مختلف د: کیمیاوی

سوالات تشریحی

1 - فرق بین فورمول ساده و مالیکولی چیست آن را توسط مثال واضح سازید.

2 - به مقدار 0.3 گرم یک ماده عضوی دارای هایدروجن، کاربن و آکسیجن است، مقدار کاربن در این مقدار ماده عضوی 0.12 گرم و مقدار هایدروجن 0.02 گرم است، فورمول تجربی این مرکب را دریافت کنید. (کته اتوم کاربن 12، هایدروجن 1 و آکسیجن 16 است)

3 - فورمول ساده یک مرکب CH_2O بوده و کته مالیکولی مرکب مذکور 180g/mol است فورمول مالیکولی آن را دریافت کنید.

4 - در ترکیب یک مرکب 55% کاربن، 36% آکسیجن و 9% هایدروجن شامل است، فورمول مالیکولی آن را دریافت و تحریر دارید، کته مالیکولی مرکب عضوی 180g/mol است.

5 - در ترکیب یک مرکب عضوی صرف کاربن و هایدروجن موجود است که 1.5 گرم هایدروجن و 9 گرم کاربن از آنالیز آن به دست آمده است، کته مالیکولی آن 210 بوده فورمول مالیکولی آن را دریافت نمایید.

6 - فورمول‌های ساختمانی و اسکلتی مرکبات زیر را تحریر دارید:

الف - 1,1-dichloro-1-butene ب - 1,2-dibromoethene ج - 3-hexene

7 - مرکبی دارای فورمول مالیکولی C_6H_{14} دارای کدام ایزومیری‌ها است؟ فورمول ساختمان تمامی ایزومیری‌های آن را تحریر دارید.

8 - ایزومیری هندسی چه نوع ایزومیری است؟ در باره معلومات دهید.

9 - تمامی ایزومیری‌های ممکنه مرکب $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ را با فورمول‌های ساختمانی و اسکلتی شان تحریر دارید.

فصل سوم

طبقه بندی مرکبات عضوی



اساس بیولوژی، طب و صنعت امروزی را مرکبات عضوی تشکیل داده است. جزء اساسی ساختمان موجودات زنده علاوه از آب، مرکبات عضوی است؛ چون مرکبات عضوی عبارت از مرکبات کاربن و مشتقات آن بوده؛ بنابر این گفته می‌توانیم که ما در مرکبات عنصر کاربن زنده گی می‌نمایم.

چرا مرکبات عضوی را طبقه بندی می‌نمایند؟ آیا آموختن خواص هر مرکب به طور جداگانه کار ساده خواهد بود؟ سلسله هومولوگ چیست؟ گروپ‌های وظیفه‌ی چیست و چه تأثیری روی خاصیت مرکبات دارند؟ چون مرکبات عضوی به پیمانۀ زیاد در طبیعت موجود است مطالعه هر یک آن‌ها به طور جداگانه کار مشکل خواهد بود؛ از این سبب مرکبات عضوی را به طبقات مختلف تقسیم نموده اند که این طبقه بندی مرکبات عضوی را در زیر مطالعه می‌نماییم.

۳- ۱: معلومات عمومی

مرکباتی عضوی که تعداد آن‌ها بیش از بیست میلیون می‌باشد، به اساس ساختمان زنجیر کاربنی (اسکلیت کاربنی) و یا به اساس موجودیت گروپ‌های وظیفه‌ی طبقه‌بندی می‌گردند. نوع روابط اتوم‌های کاربن با همدیگر نیز در طبقه‌بندی مرکبات عضوی رول اساسی را دارا اند. نظر به ساختمان اسکلیت کاربنی، مرکبات عضوی را به دو دسته تقسیم نموده‌اند که عبارت از اسکلیت زنجیری (*Acyclic*) و حلقه‌ی (*Cyclic*) می‌باشد.

مرکبات زنجیری نوع مرکباتی اند که دارای زنجیر باز بوده و اساس آن‌ها را ساختمان هایدروکاربن‌های الیفاتیک تشکیل می‌دهند.

1- هایدروکاربن‌های الیفاتیک: مالیکول‌های این مرکبات تنها از اتوم‌های کاربن و هایدروجن تشکیل گردیده است، این مرکبات می‌توانند مشبوع؛ مانند: الکان‌ها (*Alkanes*) و یا غیر مشبوع دارای رابطه‌ی دو گانه مانند: (*Alkenes*) و سه گانه مانند: (*Alkynes*)، دو رابطه‌ی دو گانه مانند: والکاداین‌ها (*Alka di enes*) باشد.

2- مرکبات حلقه‌ی (*Cyclo Compounds*): این مرکبات در مالیکول‌های خود دارای ساختمان زنجیر بسته به شکل حلقه بوده و نظر به نوعیت اتوم‌های تشکیل دهنده حلقه به کاربوسکلیک (*Carbocyclic*) و هیتروسکلیک (*Hetrocyclic*) طبقه‌بندی گردیده‌اند.

3- کربوسکلیک‌ها (*Carbocyclic*): در این نوع مرکبات حلقه تنها از اتوم‌های کاربن تشکیل گردیده است و نظر به تفاوت خواص کیمیای شان به دو گروپ تقسیم گردیده‌اند که عبارت از الیسکلیک *Alicyclic* و اروماتیک (*Aromatic*) است.

اساس مرکبات اروماتیک را مرکبات بنزین تشکیل می‌دهد و عبارت‌اند از بنزین، نفتالین، انتراسین و مشتقات آن‌ها. مرکبات الیسکلیک‌ها به مرکبات سایکلوالکان‌ها (*Cyclo Alkanes*) و سایکلوالکین‌ها (*Cyclo alkenes*) منقسم می‌گردند.

اولین مرکب خاندان سایکلوالکان‌ها سایکلو پروپان بوده و فورمول عمومی سایکلوالکان‌ها C_nH_{2n} است که با الکین‌ها ایزومیراند. در سکلیک‌ها تعداد اتوم‌های کاربن 3 و بیشتر از آن است.


هایدروکاربن‌های اروماتیک (*Arenes*)

هایدروکاربن‌های که در ترکیب خود دارای حلقه بنزین باشند به نام مرکبات اروماتیک یاد می‌شوند، نفتالین، انتراسین و فینانتین از جمله این مرکبات می‌باشند که از تراکم چندین حلقه بنزین حاصل شده‌اند.

هیتروسکلیک (*Hetrocyclic*)

این مرکبات علاوه از اتوم‌های کاربن، در حلقه خود دارای یک و یا چندین اتوم‌های عناصر دیگر بوده که به طور عمده این عناصر عبارت از اکسیجن، نایتروجن، سلفر و غیره است. مرکبات هتروسکلیک می‌توانند مشبوع، غیر مشبوع و یا اروماتیک بوده باشند.

تمام مرکبات عضوی را می‌توان مشتق هایدروکاربن‌های فوق‌الذکر پنداشت؛ زیرا این مشتقات عضوی از تعویض یک و یا چندین اتم‌های هیدروجن هایدروکاربن‌ها توسط گروپ‌های وظیفه‌ی حاصل می‌گردند. شکل ذیل طبقه‌بندی مرکبات عضوی را به شکل فشرده نشان می‌دهد:



۳-۲: صنف بندی هایدروکاربن‌ها

هایدروکاربن‌ها مرکباتی‌اند که از ترکیب اتم‌های کاربن و هیدروجن تشکیل گردیده‌اند. در هایدروکاربن‌ها هر اتم کاربن چهار رابطه اشتراکی را دارا بوده که این روابط با اتم‌های کاربن و اتم‌های عناصر دیگر برقرار گردیده‌است.

طبقه‌بندی هایدروکاربن‌ها در قدم اول به اساس موجودیت و عدم موجودیت حلقه شش کاربنی؛ یعنی بنزین در هایدروکاربن‌ها صورت می‌گیرد و این حلقه به حیث گروپ وظیفه‌ی به شمار می‌رود. هایدروکاربن‌های که دارای حلقه بنزین باشند، به نام ارومات‌ها یاد می‌گردد و هایدروکاربن‌های که دارای حلقه بنزین نباشند به نام الیفاتیک (تیل ساز) یاد می‌گردند. هایدروکاربن‌های الیفاتیک نظر به نوعیت رابطه اتم‌های کاربن - کاربن به مشبوع و غیر مشبوع تقسیم شده‌اند، الیفاتیک‌های مشبوع به الکان‌ها (Alkanes) و سایکلوالکان‌ها تقسیم گردیده‌اند، الیفاتیک‌های غیر مشبوع به الکین‌ها

(Alkenes) و الکاین ها (Alkynes) تقسیم شده اند.

الکان ها مرکباتی اند که تمام ولانس های اتوم های کاربن توسط اتوم های هایدروجن مشبوع گردیده و اتوم های کاربن در آن ها دارای روابط یگانه می باشند.

الکین ها مرکباتی اند که بین دو اتوم کاربن در آن ها رابطه دو گانه برقرار گردیده، غیر مشبوع می باشند. هایدروکاربن های غیر مشبوع دیگر الکاین ها بوده، در این مرکبات بین دو اتوم کاربن رابطه سه گانه موجود بوده و نسبت به الکان ها چهار اتوم هایدروجن و نسبت به الکین ها دو اتوم هایدروجن کمتر را دارا اند.

فعالیت




شاگردان به گروه های مناسب تقسیم گردد، هر گروه تعداد زیاد مرکبات عضوی را لست نموده و با ارائه دلایل مقنع آن ها را گروه بندی نمایند و در طبقه بندی مرکبات از شکل فوق استفاده نمایند.

۳-۳: گروه های وظیفه یی در هایدروکاربن ها

گروه های وظیفه یی در انواع مختلف هایدروکاربن ها موجود است که مرکبات مختلف هایدروکاربن ها را تشکیل می دهند، این گروه ها نظر به طرز روابط اتوم های کاربن - کاربن به میان آمده که در جدول ذیل درج شده اند:

جدول (3 - 1) گروه های وظیفه یی هایدروکاربن ها

| گروه های هایدروکاربن ها | | | |
|-------------------------|---|------------------|-------------------------------|
| Alkanes | $CH_3 - CH_3$ | ایتان | - |
| Alkenes | $CH_2 = CH_2$ | ایتلین یا ایتلین | بقیه نوکلیوفیلیک |
| Alkynes | $CH \equiv CH$ | ایتاین یا استلین | بقیه نوکلیوفیلیک |
| Alkadienes | $CH_2 = CHCH = CH_2$ | 1، 3 - بیوتاداین | بقیه نوکلیوفیلیک |
| Arenes |  | بنزین | تعویض اروماتیک الکتروفیلیک |

۳-۴: سلسله هومولوگ الکانها

مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین ($-\text{CH}_2-$) از هم فرق داشته باشند، به نام هومولوگ (Homologe) یکدیگر یاد می‌شوند. سلسله هومولوگ در الکانها، الکینها، و الکاینها موجود بوده، طوری که در فورمولهای مالیکولی الکانها مشاهده می‌شود، مرکب ایتان از مرکب قبلی خود میتان به اندازه یک ($-\text{CH}_2-$) فرق دارد، به همین ترتیب پروپان نسبت به ایتان و بیوتان نسبت به پروپان به اندازه یک گروپ متلین ($-\text{CH}_2-$) بزرگ است. این سلسله را به نام سلسله هومولوگ (Homologe) یاد می‌نمایند.

جدول (2 - 3) سلسله هومولوگ الکانها

| نام مرکب | فورمول مرکب |
|------------------|---|
| Methane | CH_4 |
| Ethane | CH_3-CH_3 |
| Propane | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ |
| Butane | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ |
| Pentane | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ |
| Hexane | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ |
| Heptane | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ |
| Octane | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ |
| <i>Nonane</i> | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ |
| <i>Decane</i> | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ |
| <i>Undecane</i> | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ |
| <i>Dodecane</i> | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ |
| <i>Tridecane</i> | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ |

علاوه از اصطلاح هومولوگ، اصطلاح ایزولوگ نیز در کیمیای عضوی به کار برده می‌شود، مفهوم این اصطلاح این است که: مرکبات عضوی هایدروکاربنها که دارای عین تعداداتومهای کاربن باشند به نام ایزولوگ یکدیگر یاد می‌شوند.

فعالیت



شاگردان به چند گروپ مناسب تقسیم گردند تا هر گروپ به طور جداگانه راجع به اصطلاح هومولوگ در هایدروکاربنها مباحثه نمایند و فورمولهای ساختمانی ایتان الی هگزان و استیلین الی اوکتین را تحریر نمایند و اشکال هومولوگی را در فورمولهای مرکبات مذکور توضیح و تشریح نمایند و نماینده هر گروپ کار هر گروپ را ارائه بدارد.

۳-۵: مرکبات عضوی و گروپ‌های وظیفه‌ی (مشتقات هایدروکاربن‌ها)

کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هایدروکاربن‌ها و مشتقات آن‌ها می‌باشد. اگر یک یا چندین اتم‌های هایدروجن هایدروکاربن‌ها به گروپ‌های وظیفه‌ی (Functional groups) مشخص تعویض گردد، مرکبات عضوی حاصل می‌گردد که به نام مشتقات هایدروکاربن‌ها یاد می‌شوند. گروپ‌های وظیفه‌ی (Functional groups) عبارت از اتم و یا گروپی از اتم‌ها در مالیکول‌های هایدروکاربن‌ها بوده که دارای ساختمان معین و مشخص می‌باشند و باعث تبارز خواص کیمیای فیزیکی مشخص مرکبات عضوی می‌گردند. هایدروکاربن‌های دارنده عین گروپ وظیفه‌ی دارای خواص کیمیای یکسان اند:

جدول (3-3) گروپ‌های وظیفه‌ی

| نام مرکب | مرکب | فرمول عمومی مرکب | نام گروپ وظیفه‌ی | گروپ وظیفه‌ی |
|----------------------|---|--|-------------------|--|
| Methyl Iodide | $CH_3 - I$ | $R - X$ | هالایدها (Halyds) | $X = (-F, -Cl, -Br, -I)$ |
| Ethanol | $CH_3 - CH_2 - OH$ | $R - OH$ | Hydroxyl | $-OH$ |
| Propanal | $CH_3 - CH_2 - \overset{O}{\underset{ }{C}} - H$ | $R - \overset{O}{\underset{ }{C}} - H$ Aldihydes | Carbonyl | $\overset{O}{\underset{ }{C}} -$ |
| Propanon | $CH_3 - \overset{O}{\underset{ }{C}} - CH_3$ | $R - \overset{O}{\underset{ }{C}} - R$ Ketones | | |
| Acetic acid | $CH_3 - COOH$ | $R - COOH$ | Carboxyl | $-COOH$ |
| Di methyl eter | $CH_3 - O - CH_3$ | $R - O - R$ | Oxy | $-O-$ |
| Di methyl ester | $H_3 - \overset{O}{\underset{ }{C}} - O - CH_3$ | $R - \overset{O}{\underset{ }{C}} - O - R$ | Ester Group | $\overset{O}{\underset{ }{C}} - O -$ |
| Methyl amin | $CH_3 - NH_2$ | $R - NH_2$ | amide | $-NH_2$ |
| Methyl amide | $CH_3 - \overset{O}{\underset{ }{C}} - NH_2$ | $R - \overset{O}{\underset{ }{C}} - NH_2$ | Amides Group | $\overset{O}{\underset{ }{C}} - NH_2$ |
| Ethyl Marcaptane | $CH_3 - CH_2 - S - H$ | $R - S - H$ | Marcaptan Group | $-S - H$ |
| Di methyl thio ether | $CH_3 - S - CH_3$ | $R - S - R$ | Thioether | $-S -$ |
| Benz Sulphonic-acid | $C_6H_5 - SO_3H$ | $R - SO_3H$ | Sulpho Group | $-SO_3H$ |

نظر به نوعیت هتروا اتم‌های که در ترکیب گروپ‌های وظیفه‌ی شامل اند، آن‌ها را به گروپ‌های ذیل تقسیم نموده اند:

۳-۵-۱: گروه‌های وظیفه‌ی اکسیجن دار: در ترکیب این گروه‌ها اکسیجن به حیث هترو اتوم

موجود است که مثال آن را می‌توان $\text{C}-\text{O}-$, $-\text{O}-$, $\text{C}-\text{OH}$ و غیره ارائه کرد.

۳-۵-۲: گروه وظیفه‌ی نایتروجن دار: در ترکیب این گروه‌ها، اتوم نایتروجن به حیث هترو اتوم‌ها

موجود است که مثال آن را می‌توان $\text{C}-\text{NH}_2$, $-\text{NH}_2$, $-\text{NO}_2$ و غیره ارائه کرد.

۳-۵-۳: گروه‌های وظیفه‌ی سلفر دار: در ترکیب این گروه‌ها، اتوم سلفر به حیث هترو اتوم موجود

است که مثال آن را می‌توان $-\text{S}-\text{H}$, $-\text{S}-$, $-\text{SO}_3\text{H}$ و غیره ارائه کرد.

۳-۵-۴: گروه‌های وظیفه‌ی فاسفورس دار: در ترکیب این گروه‌ها، اتوم فاسفورس به حیث هترو

اتوم موجود است که مثال آن را می‌توان $-\text{PH}_2$, $-\text{H}_2\text{PO}_3$ و غیره ارائه کرد.

در مالیکول‌های مرکبات عضوی می‌تواند چندین گروه وظیفه‌ی وجود داشته باشد، در صورت که

این گروه‌ها هم نوع باشد (به طور مثال: دو گروه هلوژن و یا دو گروه هایدروکسیل و غیره) این

مرکبات را به نام چندین گروه‌های وظیفه‌ی یاد می‌نمایند. مرکبات عضوی که در مالیکول آن‌ها

چندین گروه وظیفه‌ی (Poly Functional Group) مختلف موجود باشد، به نام مرکباتی دارای

گروه‌های مختلف ترکیب (Hetro Functional groups) یاد می‌گردد.

در ذیل مثال‌های مرکبات مونو، پولی، و هترو گروه‌های وظیفه‌ی داده شده است:

مرکب هایدروکسیل مونو فونکشنال گروه $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$

مرکب هایدروکسیل پولی فونکشنال گروه $\text{HOCH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2\text{OH}$

مرکب هترو فونکشنال گروه (امینو اسید) $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$

مرکب هترو فونکشنال گروه (سیتو اسید) $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$


۳-۶: مرکبات عضوی با گروه‌های وظیفه‌ی

۳-۶-۱: مشخصات بعضی از گروه‌های وظیفه‌ی

۱- گروه هلایدها: اگر رابطه‌ی اتوم‌های مالیکول عناصر هلوژن‌ها به شکل هومولیتیکی قطع


گردد، رادیکال‌های آن تشکیل می‌گردد که به شکل گروه وظیفه‌ی اتوم‌های هایدروژن


هایدروکاربن‌ها را تعویض می‌نمایند؛ به طور مثال:



گروه وظیفه‌ی هلایدها دارای الکترون طاقه بوده و فعال می‌باشد؛ از این سبب به آسانی تعامل نموده

و مشتقات هلوژنی هایدروکاربن‌ها را تشکیل می‌دهد:






شکل (3 - 1) مدل برومو کلورو میتان

ذراتی که دارای الکترون‌ها طاقه بوده باشند، به نام رادیکال‌ها (Radicals) یاد می‌شود.

۲- گروه وظیفه‌ی هایدروکسیل

گروه هایدروکسیل متشکل از یک اتم هایدروجن و یک اتم اکسیجن بوده که اتم اکسیجن در آن دارای یک الکترون طاقه می‌باشد، فورمول ساختمانی آن قرار ذیل است:



شکل (3 - 2) مدل گروه هایدروکسیل

مرکبات دارنده گروه هایدروکسیل به نام الکول‌ها (Alcoholes) یاد می‌شوند، فورمول عمومی الکول‌ها $R-O-H$ بوده که در این فورمول $R-$ رادیکال‌های هایدروکاربن‌ها را افاده می‌نماید. اتم کاربن که به آن گروه وظیفه‌ی الکول‌ها ($-OH$) وصل است با این گروه به طور جمعی به نام کاربینول ($\text{Carbinol} - \overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{C}}}$) یاد می‌شود.

نظر به رابطه اتم کاربن گروه کاربینول، الکول‌ها را به نام الکول‌های اولی، دومی و سومی یاد می‌نمایند. اگر اتم کاربن گروه کاربینول یک الکترون ولانسی خود را با یک اتم کاربن غرض تشکیل رابطه به مصرف رسانیده باشد، الکول مذکور را به نام الکول اولی یاد می‌نمایند، در صورتی که با دو کاربن

رابطه داشته باشد، به نام الکل دومی یاد می‌گردند. اگر اتم کاربن گروه کاربنول سه الکترون ولانسی خود را با سه اتم کاربن دیگر غرض تشکیل روابط به مصرف رسانیده باشد، این نوع الکل را به نام الکل سومی یاد می‌نمایند.

فعالیت




به فورمول‌های ذیل دقیق شده، نوع الکل اولی، دومی و سومی را در آن‌ها تشخیص نموده و هم توضیح دهید که الکل چهارمی و بالاتر از آن نیز موجود خواهد بود و یا خیر؟
 $CH_3 - CH_2 - OH, CH_3 - C(CH_3)_2 - OH, CH(CH_3)_2 - OH, CH_3 - OH$

۳ - گروه وظیفه‌ی الدیهایدها و کتون‌ها (کاربونیل)

گروه کاربونیل متشکل از یک اتم کاربن و یک اتم اکسیژن است که بین اتم کاربن و اکسیژن رابطه دوگانه برقرار می‌باشد.

رابطه بین اتم اکسیژن - کاربن در گروه کاربونیل دوگانه بوده که یک رابطه آن سگما (σ) و دیگر آن پای (π) است. زاویه روابط بین آنها 120° و طول رابطه دوگانه 122pm است. اتم کاربن در گروه کاربونیل دارای هیبرید sp^2 بوده و ساختمان آن مسطح است که اشکال ذیل این ساختمان را نشان می‌دهد:





شکل (3-3) فورمول و مدل ساختمان گروه کاربونیل

رابطه دوگانه $C=O$ بر خلاف $C=C$ بنابر موجودیت عنصر الکترونیگاتیف اکسیژن که کثافت الکترونی رابطه π را به طرف خود کش می‌نماید، فوق العاده قطبی می‌باشد، این قطبیت بالای خواص فیزیکی و شیمیایی مرکبات کاربونیل (الدیهایدها و کتون‌ها) تاثیر وارد می‌نماید و اکثر الدیهایدها و کتون‌ها در آب به خوبی حل می‌گردند.


۴ - گروه وظیفه‌ی کاربوکسیل و مرکبات آن (Carboxylic Group)

گروه وظیفه‌ی کاربوکسیلیک اسیدها به نام کاربوکسیل یاد می‌شود که فورمول آن $COOH$ - می‌باشد. فورمول ساختمانی آن قرار ذیل است:



شکل (3-4) مدل مالیکول استیک اسید حاوی گروه کاربوکسیل

گروپ کاربوکسیل متشکل از گروپ کاربونیل و یک گروپ هایدروکسیل بوده که اکثراً به شکل $COOH$ - تحریر می گردد؛ اما رابطه بین $O-O$ هرگز موجود نمی باشد. این گروپ می تواند (Proton - Donator) پروتون دهنده عمل نمایند و به آیون COO^- به نام کاربوکسلات مبدل گردد. در این آیون هر دو اتوم اکسیجن عین ارزش رادار دارند، زیرا الکترون π در آن در حالت ریزونانس می باشد:



تمام مرکباتی که دارای گروپ کاربوکسیل در ترکیب مالیکولی خود باشند، به نام مرکبات کاربوکسیلیک اسید یاد می شوند.

مشخصات رابطه یی در مالیکول کاربوکسیلیک اسیدها که در زیر تحریر می گردد. موجودیت اتوم های اکسیجن، هایدروجن و کاربن بالکترونیگاتیویته مختلف مالیکول آن را قطبی می سازد:

جدول (3 - 4) مشخصات تیزاب ها

| نقطه غلیان | نقطه ذوبان | Pka_1 | Pka_2 | نام مروجه | فرمول |
|---------------|------------------------|---------|---------|---------------------------|----------------------|
| $101^\circ C$ | $8^\circ C$ | 3.75 | | فارمیک اسید (تیزاب مورچه) | $H - COOH$ |
| $118^\circ C$ | $17^\circ C$ | 4.75 | | استیک اسید (تیزاب سرکه) | $CH_3 - COOH$ |
| $189^\circ C$ | $63^\circ C$ | 2.87 | | مونو کلورو استیک اسید | $CH_2 - Cl - COOH$ |
| $141^\circ C$ | $-21^\circ C$ | 4.87 | | پروپانوئیک اسید | $CH_3CH_2 - COOH$ |
| $249^\circ C$ | $122^\circ C$ | 4.20 | | بنزوئیک اسید | C_6H_5COOH |
| | تخریب $190^\circ C(d)$ | 1.23 | 4.28 | اکزالیک اسید | $HOOC - COOH$ |
| | تخریب $136^\circ C(d)$ | 2.83 | 5.69 | مالونیک اسید | $HOOC - CH_2 - COOH$ |

۵ - گروپ ایترا (-O-)


مرکباتی که در آنها اتوم اکسیجن با دو بقیه هایدروکاربن ها مرتبط باشد، به نام ایترا یاد شده و این گروپ ساختمان (-O-) را دارا است. فرمول عمومی ایترا قرار ذیل است:




اگر فرض نماییم که الکل ها مشتق از مالیکول آب بوده، طوری که یک اتوم هایدروجن آب به بقیه عضوی تعویض و الکل حاصل گردیده است، در صورتی که هایدروجن دیگر آن نیز تعویض گردیده باشد، ایترا حاصل می شود؛ به طور مثال:




آب



ایتانول




دای ایتایل ایترا




شکل (3 - 5) مدل مالیکول دای ایتایل ایترا

۶- گروه وظیفه‌ی امین‌ها ($-\text{NH}_2$)


گروه امین ($-\text{NH}_2$) متشکل از دو اتم هایدروجن و یک اتم نایتروجن بوده که در حقیقت یک اتم هایدروجن مالیکول امونیا از این مالیکول به شکل همولیتیکی تجزیه گردیده و در نتیجه این گروه حاصل گردیده است. در صورتی که رابطه این گروه با رادیکال‌های هایدروکاربن برقرار گردد، مرکبات امین تشکیل می‌گردد. فورمول‌های عمومی امین‌ها قرار ذیل است:




امونیا



امین اولی




امین دومی



امین سومی

در تمام حالات مالیکول امین‌ها ساختمان هرمی با قاعده مثلثی را دارا است که یک جوهره الکترون غیررابطه‌ی آزاد از هایبرید sp^3 اوربیتال نایتروجن است که با زاویه‌های آن اختلاف دارد. اکثر امین‌ها در مواد طبیعی و یا محصولات ترکیبی یافت شده و زیاد تر مرکبات آن بوی نامطبوع را دارا اند، در ترکیب پروتئین‌های مواد عضوی نایتروجن شامل بوده و امین‌ها نیز بعد از تجزیه و تخریب مواد زنده با مرکبات سلفر دار بوی متعفن را ایجاد می‌نمایند. نام دو نوع مرکب دای امین $\{ \text{NH}_2(\text{CH}_2)_4\text{NH}_2 \}$ 1,4-diamino butane پیوترسین (**Putrescine** به معنی تعفن) و $\text{NH}_2(\text{CH}_2)_5\text{NH}_2 1,5-diamino pentane کداویرین (**Cadaverine** به معنی تعفن جسد) دقیقاً از تعفن اجساد مرده گرفته شده است.$



شکل (3 - 6): ساختمان و مدل امین‌ها (a - امونیا b - میتایل امین c - دای میتایل امین d - تری میتایل امین)




شاگردان را به گروه‌های مناسب تقسیم نموده، هر گروه خمیره کاغذ، سرش کاهی را با دیگر مواد مورد ضرورت تهیه نموده و از آن‌ها مدل‌های ایترها، الیهایدها، کیتون‌ها و امین‌ها را آماده ساخته و در باره آن نماینده هر گروه در صنف توضیحات ارائه نماید.

۷- گروه تیول، سلفایدها


گروه تیول ($-S-H$) متشکل از یک اتم سلفر و یک اتم هایدروجن بوده که مشتقات سلفر دار هایدروکاربن‌ها را تشکیل می‌دهد. این گروه در نتیجه قطع رابطه یک اتم هایدروجن مالیکول هایدروجن سلفایدها ($H-S-H$) به شکل هومولیتیکی حاصل می‌گردد. فورمول عمومی این مرکبات ($R-S-H$) بوده و مشابه به الکل‌ها می‌باشد.

اگر هایدروجن دومی گروه تیول نیز به بقیه عضوی تعویض گردد، سلفایدها تشکیل می‌گردد که فورمول عمومی آنها $R-S-R$ است. این مرکبات مشابه ایترها می‌باشند و فرق آن با ایترها این است که در اتر گروه وظیفه‌ی اکسیجن دار شامل بوده؛ اما در تیو ایترها، سلفر شامل می‌باشد. این گروه وظیفه‌ی را به نام مرکپتو گروه (*MercaptoGroup*) نیز یاد می‌نمایند. مثال‌های ساده مرکبات تیول و تیو اتر قرار ذیل است:



۸- گروه وظیفه‌ی ایستر

گروه وظیفه‌ی ایسترها $-C(=O)-O-$ بوده که در این گروه یک الکترون ولانسی آزاد اتم اکسیجن با الکترون آزاد اتم کاربن رادیکال عضوی (R) و یک الکترون طاقه اتم کاربن با یک الکترون آزاد اتم‌های کاربن رادیکال دیگر عضوی، رابطه برقرار نموده و مرکباتی به نام ایستر را تشکیل می‌دهد. در حقیقت اگر اتم هایدروجن گروه کاربوکسیل به بقیه‌های عضوی تعویض گردد، ایسترها تشکیل می‌گردد، فورمول عمومی ایسترها عبارت اند از:



کل (3-7) مدل مالیکول میتایل ایتایل ایستر

فعالیت: شاگردان را به گروه‌های مناسب تقسیم نموده، هر گروه مدل مالیکول ایستر را از چوب، گل رس و یا کاغذ تهیه نموده و راجع به عمل کردشان نماینده گروه توضیحات لازمه بدهند.





- * مرکبات عضوی عبارت از مرکبات کاربن و هایدروجن و مشتقات هایدروکاربن ها می باشد.
- * به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلیت کاربنی و موجودیت گروپ های وظیفه یی تقسیم نموده اند.
- * هایدروکاربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربو اسکلیک تقسیم نموده اند.
- * اسکلیک ها مرکبات زنجیری بوده که زنجیر آن ها می توانند نارمل و یا منشعب بوده باشد.
- * سیکلیک ها به دو گروپ کاربو سیکلیک و هترو سیکلیک تقسیم شده اند.
- * کاربو سیکلیک مرکباتی اند که دارای زنجیر بسته (حلقه) می باشند و به سیکلیک ها و ارومات ها منقسم می گردند، سیکلیک ها نیز به نوبه خود به سایکلو الکان و سایکلو الکین تقسیم گردیده اند.
- * اگر یک و یا چندین اتوم هایدروجن هایدروکاربن ها توسط گروپ های وظیفه یی تعویض گردد، مرکباتی حاصل می گردد که به نام مشتقات هایدروکاربن هایاد می گردند و عبارت از مشتقات هلو جنی، اکسی جنی، نایترو جنی، سلفری، فاسفوری و غیره می باشند.
- * فورمول عمومی الکیل هالیدها عبارت از $R-X$ است.
- * مرکباتی دارای گروپ های وظیفه یی اکسیجن دار عبارت اند از الکل ها، الیدها، کیتونها، تیزاب ها،

ایترها، ایسترها، و غیره است که بترتیب دارای فورمول های $R-OH$ ، $R-C(=O)-H$ ، $R-C(=O)-R$ ، $R-C(=O)-O-R$ ، $R-O-R$ ، $R-COOH$ می باشند.

* مرکباتی دارای گروپ وظیفه یی نایتروجن دار، امین ها و امایدها و غیره بوده که فورمول های آنها

به ترتیب $R-NH_2$ ، $R-C(=O)-NH_2$ است

* مرکباتی دارای گروپ وظیفه یی سلفر دار عبارت از $R-S-R$ ، $R-S-H$ و غیره است.

سوالات فصل سوم

سوالات چهار جوابه:

- 1- موجودیت کدام یکی از جوهر عناصر ذیل در ترکیب مرکبات عضوی حتمی است؟
 - الف- کاربن و سلفر
 - ب- سلفر و هایدروجن
 - ج- کاربن و فاسفورس
 - د- کاربن و هایدروجن
- 2- هایدروکاربن های که به اندازه یک گروپ متلین ($-CH_2-$) از همدیگر فرق دارند به نام ----- یاد می شوند.

- الف- ایزولوگ ب- ایزومیر ج- هومولوگ د- غیر مشبوع
- 3- کدام یکی از فورمول های ذیل فورمول عمومی ایترها می باشد؟

الف- $R-O-R$ ب- $R-C(=O)-H$ ج- $R-S-H$ د- الف و ج هر دو

4- فورمول عمومی تیول ها عبارت از ----- است.

الف - $R-OH$ ب - $R-NH_2$ ج - $R-S-H$ د - $R-S-R$
 5 - گروه وظیفه‌ی در مرکبات تیزابی عبارت از ----- است.

الف - $R-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-H$ ب - $R-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-OH$ ج - $R-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-O-R$ د - $R-OH$
 6 - مرکبات ساده‌ی که علاوه از کاربن، هیدروجن نیز در ترکیب شان موجود است، به نام ----- یاد می‌شوند.
 الف - الکان ب - الکین ج - هایدروکاربن‌ها د - مشتقات الکان‌ها
 7 - فورمول عمومی الکیل‌ها عبارت از --- است.

الف - $R-OH$ ب - $R-X$ ج - $R-S-H$ د - $R-S-R$
 8 - گروه‌های وظیفه‌ی عبارت از اتوم و یا گروهی از اتوم‌های مرتبط شده اند که در یک مالیکول مرکب شامل بوده و ---- را مشخص می‌سازد.

الف - نوع مرکب ب - ترکیب مالیکولی ج - مشتقات مرکب د - الف و ج هر دو
 9 - $R-OH$ فورمول عمومی ----- است.

الف - تیزاب ب - القلی ج - الکل د - الیدها
 10 - هایدروکاربن‌ها به صورت عموم به () تقسیم گردیده اند.

الف - دو ب - سه ج - چهار د - پنج
 11 - هترو سکلیک‌ها مرکباتی اند که در ترکیب حلقه آن‌ها عناصر بیگانه ---- شامل اند.


الف - سلفر، اکسیجن ب - نایتروجن، فاسفور و غیره ج - الف و ب هر دو د - هیچکدام
 12 - تیو ایترها مشابه به الکل‌ها بوده؛ اما فرق شان با ایترها در این است که در ایترها گروه وظیفه‌ی اکسیجنی شامل بوده؛ لکن در تیو اتر ---- شامل می‌باشد.

الف - نایتروجن ب - فاسفورس ج - سلفر د - نایتروجن
 13 - گروه وظیفه‌ی کیتون‌ها عبارت از گروه ---- است.

الف - کاربونیل ب - کاربوکسیل ج - هایدروکسیل د - هیچکدام
 14 - هایدروکاربن‌های که دارای زنجیر بسته باشد، به نام ---- یاد می‌شوند:
 الف - سکلیک‌ها ب - اسکلیک‌ها ج - ارومات‌ها د - همه درست است.

سوالات تشریحی


- 1 - در مورد سلسله هومولوگ هایدروکاربن‌ها معلومات مختصر ارائه بدارید.
- 2 - گروه‌های وظیفه‌ی را به طور مختصر توضیح نمایید.
- 3 - فورمول‌های عمومی ذیل را ملاحظه نموده و تحریر دارید که به کدام مرکبات عضوی تعلق دارند؟



- 4 - گروه وظیفه‌ی کاربونیل را به طور مختصر توضیح نمایید.
- 5 - درباره‌ی گروه وظیفه‌ی کاربوکسیل معلومات لازمه ارائه بدارید.

فصل چهارم

الکان ها و سایکلو الکان ها



مرباتی که در آن‌ها اتم‌های کربن به شکل زنجیر یا حلقه باهم ارتباط دارند و تمام اتم‌های کربن آن‌ها دارای رابطه یگانه سگما σ اند، به نام الکان‌ها یا سایکلو الکانها یاد شده اند. در این مرکبات اتم‌های کربن هائیرید sp^3 را دارا بوده و بین اتم‌های کربن رابطه یگانه موجود است، الکان‌ها دارای مالیکول‌های زنجیر کاربنی بوده و سایکلو الکان‌ها دارای زنجیر بسته و حلقه می‌باشند. در این فصل دانسته خواهد شد که الکان‌ها و سایکلو الکان‌ها کدام نوع مرکبات اند؟ منابع طبیعی آن‌ها کدام‌ها اند؟ دارای کدام خواص به خصوص می‌باشند؟ در کدام عرصه‌ها به کار می‌روند؟ فرق بین الکان‌ها و سایکلو الکان‌ها در کدام فکتور است؟ در این فصل ابتدا الکان‌ها را توضیح نموده و بعد از آن به مطالعه سایکلو الکان‌ها می‌پردازیم.

۴-۱: الکان‌ها (Alkanes)



الکان‌ها مرکباتی اند که بین اتم‌های کاربن، آن‌ها رابطه ساده (یگانه) موجود بوده و ولانس‌های متباقی اتم‌های کاربن توسط اتم‌های هیدروجن مشبوع گردیده است. مرکبات ساده آن‌ها میتان CH_4 وایتان C_2H_6 است. مالیکول میتان دارای ساختمان هندسی چهاروجهی بوده و رابطه C-H در آن‌ها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال sp^3 هایبرید کاربن و اوربیتال s هیدروجن برقرار گردیده و نوع رابطه مستحکم σ می‌باشد.

در شکل (4-1) زاویه، طول رابطه و هم ساختمان چهار وجهی مالیکول میتان ارائه گردیده است. طول رابطه به واحد پیکومتر pm ($10^{-12} m$) ارائه شده است.

قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان روابط در یک مالیکول مطابق به شکل (4-2) بوده، طوری که خطوط باریک -C- نمایانگر روابطی اند که در سطح قرار داشته، علامه مثلثی (\blacktriangle) رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلثی (\triangle) رابطه عقب سطح را افاده می‌کنند.




شکل (4-1) دو طریق مختلف ارائه مالیکول میتان.



شکل (4-2) قرارداد بین المللی برای نمایش رابطه‌ها در مالیکول میتان وایتان

مالیکول ایتان را می‌توان متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل CH_3 - بایکدیگر تصور کرد. در گروپ میتایل ($-CH_3$) هراتوم کاربن یک اوربیتال sp^3 هایبرید آزاد را دارا بوده و در موقع اتصال با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال‌های sp^3 - هایبرید اتم کاربن رابطه C-C را برقرار نموده که در شکل (4-3) نمایش داده شده است:



شکل (4-3) نمایش فضای مالیکول Ethane به وسیله مدل چوبی


الکان‌ها دارای فورمول عمومی ($C_n H_{2n+2}$) بوده و سر دسته آن‌ها میتان و دومی آن ایتان، پروپان... است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ متلین -CH₂- از همدیگر فرق دارند. درجدول (4 - 1) نام‌ها و درجه غلیان عده ازمربکات این خاندان با رادیکال‌های یک ولانسه شان ارائه گردیده است. قابل یادآوری است که: پسوند ane نام الکان (Alkane) مربوطه در رادیکال آن به (Alkyl)yl تعویض می گردد.


جدول (4 - 1) نام الکان‌ها و رادیکال مربوطه آنها:

| نام | فورمول | نقطه غلیان | نام رادیکال | فورمول |
|---------|----------------|------------|-------------|-----------------|
| Alkane | $C_n H_{2n+2}$ | - | Alkyl | $-C_n H_{2n+1}$ |
| Methane | CH_4 | $-161^0 C$ | Methyl | CH_3- |
| Ethane | CH_3-CH_3 | $-89^0 C$ | Ethyl | CH_2CH_2- |
| Propane | C_3H_8 | $-40^0 C$ | Propyl | C_3H_7- |
| Butane | C_4H_{10} | $-0.5^0 C$ | Butyl | C_4H_9- |
| Pentane | C_5H_{12} | $36^0 C$ | Pentyl | $C_5H_{11}-$ |
| Hexane | C_6H_{14} | $68^0 C$ | Hexyl | $C_6H_{13}-$ |
| Heptane | C_7H_{16} | $88^0 C$ | Heptyl | $C_7H_{15}-$ |
| Octane | C_8H_{18} | $126^0 C$ | Octyl | $C_8H_{17}-$ |
| Nonane | C_9H_{20} | $151^0 C$ | Nonyl | $C_9H_{19}-$ |
| Decane | $C_{10}H_{22}$ | $174^0 C$ | Decyl | $C_{10}H_{21}-$ |

۴-۱-۱: ایزومیری الکان‌ها

ایزومیری در الکان‌ها از مرکب بیوتان آغاز می گردد؛ به طور مثال: بیوتان دارای دو ایزومیری بوده که فورمول‌های ساختمانی آن قرار ذیل است:





شکل (4 - 4) مودل مالیکول ساختمانی نارمل بیوتان و ایزوبیوتان

قابل یاد آوری است که ایزومیری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف اند؛ به طور مثال: نقطه غلیان نارمل بیوتان 0.5°C - و کثافت آن 0.106g/cm^3 بوده و در حالی که نقطه غلیان ایزوبیوتان 11.6°C - و کثافت آن 0.549g/cm^3 است.

در الکان‌های زنجیری با ازدیاد تعداد اتم‌های کاربن (n) در مالیکول آنها، تعداد ایزومیری‌ها نیز زیاد می‌نماید، جدول ذیل را ملاحظه نمایید:

جدول (4 - 2) ایزومیری‌های بعضی الکان‌ها


| تعداد ایزومیری | فورمول مالیکولی | تعداد اتم‌های کاربن (n) |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2 | C_4H_{10} | n=4 |
| 5 | C_6H_{14} | n=6 |
| 18 | C_8H_{18} | n=8 |
| 75 | $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ | n=10 |
| به طور تقریبی "366 هزار" | $\text{C}_{20}\text{H}_{42}$ | n=20 |
| $6.0 \cdot 10^{13}$ در حدود | $\text{C}_{40}\text{H}_{82}$ | n=40 |

۴ - ۱ - ۲: نامگذاری الکان‌ها به اساس قواعد (IUPAC)


نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت ویژه برخوردار است؛ زیرا با توجه به فراوانی (بیش از بیست میلیون) این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمی‌توان آنها را خارج از قواعد نامگذاری نمود. اتحادیه بین‌المللی شیمیای تجربی و خالص (IUPAC) (International Union of Pure and Applied Chemistry) طبقه‌های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن می‌توان مرکبات عضوی را چنین نامگذاری کرد: با ارقام Methane، Metha، Etha، propa، Buta، penta، ... و غیره آشنایی دارید و هم، Ethane، propane، Butane که مرکبات اولی الکان‌ها است، آشنا هستید، طوری که دیده می‌شود، پسوند (ane) در اخیر نام ارقام مذکور تحریر گردیده است که مشخص‌کننده نوع مرکب

بوده و این ارقام مشخص کننده تعداد اتوم‌های کاربن در مرکب مطلوب می‌باشند، جدول (4 - 1) نام بعضی از الکان‌ها را نشان می‌دهد. الکان‌های دارنده زنجیر مستقیم را الکان‌های نارمل می‌نامند و به (n) مشخص شده‌اند.

اگر یک یا چندین اتوم هایدروجن مالیکول الکان‌ها حذف شود و یا اتوم و مالیکول که دارای الکترون طاقه باشند، چنین ذرات را به نام رادیکال (Radical) یا بقیه عضوی فعال یاد می‌کنند، در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشد و یک الکترون ولانسی اتوم کاربن مالیکول آن بدون جوهره شدن باقی مانده باشد، به نام الکیل (Alkyl) یاد می‌شوند، در این مرکبات پسوند *ane* نام آن‌ها در حالت داشتن یک الکترون طاقه به *yl* تعویض و نام رادیکال آن به دست می‌آید.




نامگذاری الکان‌های دارای زنجیر منشعب طوری است که نخستین زنجیر طویل را در مالیکول الکان‌ها دریافت و نمبر گذاری می‌نمایند، نمبر گذاری را از همان انجام زنجیر آغاز می‌نمایند که انشعاب به آن نزدیک باشد، در این صورت ابتدا نمبر کاربن که در آن‌ها بقیه نصب است به 1، 2، 3، ... و غیره تحریر و بقیه‌ها را که به آن وصل است بعد از نمبر کاربن تحریر می‌نمایند و در بین بقیه و نمبر کاربن مربوط آن علامه (،) را قرار می‌دهند. ذکر بقیه‌ها به اساس بزرگی و کوچکی و یا به اساس تقدّم حرف اول نام آن به الفبای انگلیسی عملی می‌گردد و در اخیر نام الکان‌های دارای زنجیر طویل در مرکب تحریر می‌گردد. در صورتی که بقیه‌های مشابه در زنجیر طویل نصب گردیده باشد، تعداد آن‌ها را به Di، Tri، Tetra، و غیره مشخص می‌سازند؛ به طور مثال:




۴-۱-۳: نام گذاری اشتقاقی الکان‌های منشعب

در این نوع نامگذاری انواع کاربن‌ها باید ابتدا مشخص گردد که عبارت از کاربن اولی، دومی، سومی و چهارمی می‌باشد. اتوم‌های کاربن که در مالیکول مرکبات عضوی یک الکترون ولانسی خود را با اتوم

دیگر کاربن غرض تشکیل رابطه به مصرف رسانیده باشد، به نام کاربن اولی (primary carbon) یاد می‌شود، در صورتی که دوالکترون اتوم کاربن با دو اتوم دیگر کاربن غرض تشکیل رابطه به مصرف رسیده باشد، به نام کاربن دومی (secondary carbon) یاد شده و اگر سه الکترون ولانسی کاربن با سه اتوم دیگر غرض تشکیل رابطه به مصرف رسیده باشد، به نام کاربن سومی (Tertiary carbon) یاد می‌شود؛ به طور مثال:



در نامگذاری اشتقاقی کاربنی که با بیشترین اتوم‌های دیگر کاربن رابطه داشته باشد، به حیث مرکز قبول شده و آن را به نام Methane یاد نموده و بقیه‌های که به این کاربن رابطه دارند، به حیث رادیکال‌ها (الکیل‌ها) قبول شده، در این صورت اول نام بقیه‌های کوچک در نامگذاری ذکر گردیده و بعد از آن متوسط و در اخیر بقیه‌های بزرگ و بالاخره کلمه (Methane) تحریر می‌گردد.



۴-۱-۴: خواص فیزیکی الکان‌ها

در جدول ذیل بعضی از خواص‌های فیزیکی الکان‌ها درج گردیده است:
جدول (4 - 3) بعضی از خواص‌های فیزیکی

| نام | فورمول | نقطه ذوبان °C | نقطه غلیان | کثافت مخصوصه |
|---------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Methane | CH ₄ | -182.5 | -161.5 | 0.424 |
| Ethane | C ₂ H ₆ | -183.7 | -88.6 | 0.546 |
| Propane | C ₃ H ₈ | -187.6 | -42.2 | 0.585 |
| Butane | C ₄ H ₁₀ | -138.3 | -0.5 | 0.579 |
| Pentane | C ₅ H ₁₂ | -129.7 | +36.1 | 0.626 |
| Hexane | C ₆ H ₁₄ | -95.3 | 68.8 | 0.659 |
| Heptane | C ₇ H ₁₆ | 90.6 | 98.4 | 0.684 |

| | | | | |
|-------|-------|-------|------------------|--------------|
| 0.730 | 173.0 | -30.0 | $C_{10}H_{22}$ | Decane |
| 0.764 | 253.0 | +5.5 | $C_{13}H_{28}$ | Tetradecane |
| 0.769 | 270.5 | 10.0 | $C_{15}H_{32}$ | Pentadecane |
| 0.775 | 287.5 | 18.1 | $C_{16}H_{34}$ | Hexadecane |
| 0.778 | 344.0 | 36.5 | $C_{20}H_{42}$ | Eicosane |
| 0.942 | 421.0 | 93.0 | $C_{50}H_{102}$ | pentacontane |
| - | - | 115.5 | $C_{100}H_{202}$ | Hectane |

طوری‌که در جدول دیده می‌شود، چهار مرکب اول هومولوگ این خاندان در شرایط استاندارد به حالت گازیافت شده و دارنده 5 الی 16 اتوم کاربن به حالت مایع و بالاتر از آن به حالت جامد یافت می‌شوند. در سلسله هومولوگی الکان‌ها درجه غلیان، ذوبان و کثافت مخصوصه آن‌ها به تدریج ازدیاد می‌یابد. در ایزومیری الکان‌ها نیز درجه غلیان فرق دارد؛ طوری که ایزومیرهای نارمل دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیری‌های دارای انشعابات بیشتر، دارای نقطه غلیان پایین اند؛ زیرا در الکان‌های منشعب قوای واندروالس کمتر بوده و قوه جذب بین ذرات کمتر می‌باشد، از این سبب با حرارت کم غلیان می‌نمایند.

فکر کنید




کدام یکی از الکان‌های نارمل زنجیری مرکباتی دارای فورمول جمعی ذیل به زودی ذوب می‌گردد؟
 $C_{32}H_{66}$ و $C_{45}H_{92}$
 لزوجیت الکان‌های مایع با ازدیاد تعداد اتوم‌های کاربن آن‌ها (کثله مالیکولی نسبتی) زیاده‌تر می‌گردد.

فعالیت: حل کنید.



اشکال ذیل را ملاحظه نموده، بگویید که کدام الکان سریع‌تر از دیگر به کتالی می‌ریزند؟



شکل (4 - 5) الف - سرعت حرکت ب - سرعت حرکت


۴- ۱- ۵: خواص کیمیاوی الکانها

فعالیت کیمیاوی الکانها کمتر بوده؛ ازاین سبب آنها را به نام پارافین (Paraffin)؛ یعنی کم میل یاد می‌نمایند. چون تمام روابط در مالیکولهای الکانها یگانه و از نوع سگما می‌باشد؛ ازاین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام می‌دهند.


الکانها با آکسیجن تعامل نموده مرکبات آکسیجن دار عضوی را تشکیل می‌دهند. در زیر بعضی تعاملات الکانها را مطالعه می‌نماییم:

۴- ۱- ۵- ۱: اکسیدیشن الکانها

الکانها در شرایط عادی در مقابل آکسیجن هوا و اکسیدانتها (عامل اکسیدیشن) مقاوم بوده، در صورتی که پارافینها در هوا محترق گردند، با شعله آبی سوخته، به کاربن دای اکساید، آب و انرژی مبدل می‌گردد:



الکانها مواد خوب سوختی بوده و از احتراق آنها انرژی زیاد تولید می‌گردد؛ به طور مثال:




شکل (4 - 6) سوختن گاز طبیعی

از احتراق یک کیلوگرام گاز میتان 55625 کیلوژول انرژی آزاد می‌گردد. احتراق یکی از عمده‌ترین تعاملات پارافین می‌باشد که در عمل از آن استفاده می‌شود. گاز طبیعی مخلوط هایدروکاربنها بوده 90 فیصد آن را میتان تشکیل نموده است.

از اکسیدیشن الکانها در شرایط مناسب می‌توان الکولها، الدیهاها و تیزابها را به دست آورد که در مورد استحصال مرکبات فوق معلومات داده خواهد شد، در این مبحث احتراق بعضی از مرکبات کیمیاوی

را مطالعه می‌نماییم.


اگر میتان توسط آکسیجن هوا در موجودیت کتلیست اکسیدیشن گردد، میتانول، فارم الدیهاها و فارمیک اسید تولید می‌گردد:



۴- ۱- ۵- ۲: تعامل کرکنگ (Cracking) (انشقاق): هرگاه الکانها تا 400 - 600

درجه سانتی گرید حرارت داده شود، در این صورت قطع متجانس رابطه کاربن- کاربن مالیکولهای الکانها صورت گرفته که این عملیه را به نام انشقاق (Cracking) یاد می‌نمایند. Cracking کلمه





انگلیسی بوده که به معنی چاک کردن است، در این جا نیز به همین مفهوم به کار رفته و عبارت از انشقاق هایدروکاربن های بزرگ به هایدروکاربن های کوچک مشبوع و غیر مشبوع است:



تعامل انشقاق در صنعت رول اساسی را دارا بوده که به کمک آن نفت خام را به درجه های بلند حرارت به اجزای کوچک قیمتی از قبیل پترول، دیزل، تیل خاک و غیره مبدل می سازند.

۴-۱-۵: هلوچینش


هلوچینش از جمله مهم ترین تعاملات الکان ها می باشد، در عملیه هلوچینش علاوه از کلورین، فلورین نیز مورد استفاده قرار می گیرد، آیودین قادر به تعویض مستقیم هایدروجن الکان ها نمی باشد؛ اما فلورین به شدت عمل می نماید که باید در عملیه فلورینیشن احتیاط شود. کلورینیشن الکان ها به حرارت 300 درجه سانتی گراد صورت می گیرد. جریان کلورینیشن میتان را با مراحل آن می توان قرار ذیل ملاحظه کرد:




۴-۱-۶: استحصال الکان ها

الکان ها در نفت به مقدار زیاد به شکل مخلوط موجود است که می توان آن ها را از نفت جدا کرد، همچنان گاز طبیعی مخلوط الکان های گازی می باشد؛ لاکن الکان ها را می توان به طریقه های ذیل نیز به دست آورد:

1 - به طریقه سنتیز ورتس: یکی از طریقه های مهم استحصال الکان ها طریقه ورتس است؛ در این طریقه هالید هایدروکاربن ها را با سودیم فلزی تعامل داده، در نتیجه الکان حاصل می گردد:



Alkylhalide Alkane






Methylchloride Ethane

فعالیت



کدام هالید الکان با سودیم تعامل داده شود تا هگزان تشکیل گردد؟ اگر 2-iodobutane با سودیم تعامل داده شود، کدام الکان حاصل خواهد شد؟ معادله تعامل آن را تحریر دارید


1 - **طریقه گرنیارد:** در سال 1901 عالمی به نام گرنیارد (Victor Grignard) یک مرکب عضوی هالاید مگنیزیم را قرار معادلۀ زیر به دست آورده، آن را هایدرولیز نمود که در نتیجه الکانها و دیگر مرکبات هایدروکاربن را به دست آورد:





فعالیت





به اساس تعامل گرنیارد مرکبات زیر را استحصال و معادله کیمیاوی آنها را تحریر دارید.





3 - از ارجاع نمودن الکیل هالیدها نیز می توان الکانها را به دست آورد؛ طوری که الکیل هالیدها را با جست فلزی تعامل داده، در نتیجه الکان و هالاید جست حاصل می گردد:



4 - از حرارت دادن نمک فلزی کاربوکسلیک اسیدها با سودالایم (مخلوط کلسیم اکساید و سودیم هایدروکساید) می توان الکانها را به دست آورد:



5 - از هایدروجنیشن الکینها والکاینها در موجودیت کتلت نکل، پلاتین و غیره الکانهای ایزولوگ شان حاصل می گردد:



۴- ۱- ۷: میتان (Methane)

ساده ترین هایدروکاربن پارافین، میتان بوده که به نام‌های مختلف نیز یاد می‌گردد و دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن می‌باشد، چون این گاز از گنده شدن مواد عضوی درخندق‌ها حاصل می‌گردد، از این سبب به نام گاز خندق یاد می‌شود، به همین ترتیب این گاز در معادن نیز یافت شده؛ بنابراین به نام گاز معادن نیز یاد می‌گردد. تراکم گاز میتان در معادن سبب انفجارات مهلک و خطرناک شده؛ از این سبب به نام (Firedamp) یعنی بخار آتشرانیز یاد می‌شود.

اتموسفیر سیاره‌های بزرگ (زحل و مشتری) دارای میتان است. این امر دلالت بر آن می‌نماید که میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی نیز تشکیل می‌گردد.

در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آن‌ها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی (ذخایر در داخل قشر ضخیم زمین) و به حالت محلول در نفت و یا آب‌های تحت الارضی به حیث گازات ضمیمه نفت یافت می‌شوند. در گاز طبیعی 98% میتان موجود بوده، و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره نیز موجود می‌باشد. گازهای ضمیمه تیل دارای کمترین مقدار میتان است که 30 الی 80% است؛ اما مرکبات هومولوگ آن؛ یعنی ایتان 4 الی 20 فیصد، پروپان 5 الی 22 فیصد، بیوتان 5 الی 20 فیصد موجود است، دیگر گازات نیز در این گاز موجود است. الکان‌های عالی در ترکیب نفت شامل است.

به طور اوسط از یک متر مکعب گاز طبیعی 46000 کیلو ژول حرارت تولید می‌شود که برای ذوب 30 کیلوگرام چدن کافی می‌باشد.

۴- ۱- ۷: خواص فیزیکی میتان

میتان گاز بی بو، بی ذایقه و بی رنگ بوده و نسبت به هوا سبک می‌باشد. سنگینی آن نسبت به هوای خشک $d = \frac{M}{29} = \frac{16}{29}$ است. مالیکول میتان غیر قطبی بوده و قوه جاذبه بین مالیکول‌های میتان قوه واندروالس ولندن است. این قوه نسبت کوچکی مالیکول‌های میتان بسیار ضعیف بوده، از این سبب نقطه غلیان و ذوبان آن بسیار پایین است. میتان در آب حل نمی‌شود.

فعالیت




1 - کثافت مخصوصه یک الکان نظر به هوا 1.52 است، کثله مالیکولی و فورمول مالیکولی آن را دریافت نمایید.

2 - کثله مالیکولی یک الکان 62 است، کثافت مخصوصه آن را دریافت نمایید.

۴- ۱- ۷: خواص کیمیاوی میتان


گاز طبیعی که 98% آن را میتان تشکیل می‌دهد، آن را به حیث ماده خام کیمیاوی برای استحصال مواد ذیل به کار می‌برند:

1 - استحصال دوده (soot) و هایدروجن به طریقه پیرولیز (Pyrolysis)




دوده به حیث مادهٔ اضافی در مواد خام رابر به کاربرده می‌شود و هم از آن در دباغی (صنعت چرم) به حیث رنگ استفاده به عمل می‌آید.

2 - برای استحصال استلین از میتان استفاده می‌کنند:






3 - میتان را با بخارات آب تعامل داده گاز کاربن مونواکساید و هایدروجن را به دست می‌آورند:




به این اساس از محصولات فوق میتایل الکول را به دست می‌آورند.





4 - از تعامل اکسیدیشن میتان، میتایل الکول، فارم الدیهاید و فارمیک اسید را به دست می‌آورند:



5 - از پیرولیز میتان و امونیا در موجودیت آکسیجن، هایدروجن سیاناید حاصل می‌گردد:



6 - از کلورینیشن میتان، میتایل کلوراید، متلین کلوراید، کلوروفارم و کاربن تتراکلوراید حاصل می‌شود:




میتان را می‌توان قرار طریقه‌های عمومی الکان‌ها استحصال نمود:



مواد مورد ضرورت: تست تیوب دوعدد، پایه همراه گیرا دوعدد، نل زانوخم، کارک سوراخ دار، تشت پر از آب، منبع حرارت، سودا لایم (مخلوط سودیم هایدروکساید و کلسیم اکساید)، سودیم اسیتات.


طرز العمل: قرار شکل (4 - 7) مقدار سودیم اسیتات را با سودا- لایم در یک تست تیوب انداخته دهن تست تیوب را با کارک سوراخ دار بسته نمایید، از سوراخ کارک یک نل زانوخم را به تست تیوب دیگر که در تشت پر از آب سرچپه قرار دارد، داخل نمایید؛ سپس محتویات داخل تست تیوب را حرارت دهید، تغییرات و تعاملاتی را که مشاهده می کنید، تحریر داشته، معادلۀ تعامل محتویات تست تیوب را تحریر نموده و بگویید که گاز جمع شده در تست تیوب سرچپه در تشت پر از آب کدام گاز خواهد بود؟




شکل (4 - 7) دستگاه استحصال میتان

۴-۲: مرکبات حلقوی (سایکلوالکان‌ها)

فورمول عمومی سلسله هومولوگ سایکلو پارافین ها C_nH_{2n} یا $(CH_2)_n$ است که به این ترتیب مالیکول سایکلوپارافین ها نسبت به الکان ایزولوگ شان دو اتوم هایدروجن کمتر را دارند. دریک سلسله از مرکبات مشبوع دواتوم کاربن می توانند بین خود رابطه اشتراکی یگانه (به طور کامل مشابه به رابطه های $sp^3 - hybrid$ دو اتوم کاربن وسطی که بیشتر از یک و یا چندین بقیه $-CH_2-$ بین آنها موجود باشد) در حلقه برقرار نمایند، این نوع مرکبات به نام سایکلوالکان ها (Cycloalkanes) یاد می شوند که اولین مرکب آنها C_3H_6 با فورمول مشرح ذیل می باشد:



مرکبات دیگر آن عبارت از: Cyclo butane، Cyclo pentane، Cyclo hexane و غیره است. سایکلو هکزان دارای فورمول جمعی C_6H_{12} و طبق قانون لیویس به شکل شش ضلعی ساده در یک سطح تحریر می گردد؛ اما در حقیقت اتم های کربن با ساختمان چهاروجهی بوده، مسطح نمی باشد. در شرایط عادی فورمولی که نشان دهنده پایدارترین حالت مالیکول سایکلو هکزان است، به شکل چوکی بوده. (مانند چوکی های که در کنار دریا از آن استفاده می گردد) در شکل (8 - 4) ساختمان فضایی سایکلو هکزان به شکل چوکی نمایش داده شده است:



در شکل (8 - 4) ساختمان فضایی سایکلو هکزان به شکل چوکی

۴-۲-۱: پیدایش سایکلو الکان ها

سایکلو الکان ها به مقدار زیاد در طبیعت منتشر بوده و مرکبات مذکور یکی از اجزای تشکیل دهنده عمده نفت است. (در نفت باکو واکراین زیاد یافت می شود) سایکلو الکان ها را برای اولین بار در نفت عالم روسی به نام مارکوفنیکوف (Markovnikov) کشف کرد، عالم مذکور این هایدروکاربن ها را به نام نفتین (Naphthenes) یاد کرد، موصوف دریافت نمود که در طبیعت سایکلو الکان ها پنج ضلعی و شش ضلعی؛ یعنی سایکلو پنتان، سایکلو هکزان و مشتقات آن ها بیشتر منتشر می باشد. سایکلو الکان ها در روغن های ایستری نباتی یافت می گردد. اسکلیت کاربنی هومولوگ سایکلو هکزان (1-methyl-4- isopropyl cyclohexane) اساس بسیاری از ترپین ها (Terpenes) را تشکیل می دهد که از جمله مرکبات عمده طبیعی است.





بیشتر بیاموزید: ترپین ها (Terpenes) عبارت از هایدروکاربن های مفر و معطر با

فورمول بسیط $C_{10}H_{16}$ و فورمول عمومی آن $(C_5H_8)_n$ است. ترپین ها از اهمیت علمی و صنعتی زیاد تر برخوردار اند و تشکیل دهنده اساسی اکثر نباتات اند. ترپین ها اجزای مواد خوشبوی بوده و در عطر سازی به کار می رود. این مرکبات را می توان از نباتات به دست آورد.

۴-۲-۱-۱: خواص فیزیکی

درجه ذوبان سایکلو الکان ها نسبت به الکان های ایزولوگ آن ها بلند می باشد؛ جدول ذیل را ملاحظه نمایید:

جدول (3 - 4) مقایسه درجه ذوبان سایکلوالکان‌ها با الکان‌های ایزولوگ آن‌ها

| درجه ذوبان | درجه ذوبان | فرمول | نارمل الکان‌ها و سایکلوالکان‌ها |
|------------|--------------|--|------------------------------------|
| -42 -33 | -187 -127 | $CH_3 - CH_2 - CH_3$  | پروپان سایکلو پروپان |
| -0.5 13 | -135 -90 | $CH_3 - (CH_2)_2 - CH_3$  | بیوتان سایکلوبیوتان |
| 36 49 | -130 -94 | $CH_3 - (CH_2)_3 - CH_3$  | پنتان سایکلو پنتان |
| 69 81 | -95 7 | $CH_3 - (CH_2)_4 - CH_3$  | هگزان سایکلو هگزان |


سایکلو پروپان و سایکلو بیوتان به حالت گاز یافت شده و سایکلو الکان‌های دارنده تعداد اتوم‌های کاربن بالاتر از چهار به حالت جامد یافت می‌شوند.

۴-۲-۱: خواص کیمیاوی سایکلوالکان‌ها


سایکلو الکان‌های دارای حلقه کوچکتر تمایل به تعاملات جمعی را دارا بوده که حلقه آن‌ها باز گردیده، الکان‌ها و مشتقات آن‌ها را تشکیل می‌دهند و خاصیت الکین‌ها را از خود نشان می‌دهند. حلقه‌های دارنده 5-7 کاربن دارای ثبات زیاد بوده؛ مانند: هایدروکاربن‌های مشبوع تعاملات تعویضی را انجام می‌دهند:

۱- عمل هلوژنها بالای سایکلوالکان‌ها


سایکلو الکان‌های دارنده حلقه کوچک و مشتقات آن‌ها با برومین به آسانی تعامل نموده، در نتیجه حلقه آن‌ها باز و مشتقات برومینی الکان‌ها (1.3 - di bromo alkanes) را تشکیل می‌دهند:



تعامل فوق نسبت به برومینیشن پروپلین بپی است و تعامل برومینیشن سایکلوپنتان به حرارت بلند صورت گرفته و بپی می باشد و مرکب مذکور به حرارت بلند برومین را آهسته تر در خود نصب نموده و مرکب 1,4-di bromo butan را تولید میکند:





در اثر عمل هلوژنها حلقه سایکلوپنتان و سایکلو هگزان باز نگردیده؛ بلکه تعویض اتوم ها هایدروژن آن ها به هلوژنها صورت می گیرد:



۲- اکسیدیشن سایکلوالکان ها

سایکلو پروپان و مشتقات آن ها به حرارت عادی توسط محلول پوتاشیم پرمنگنات در محیط خنثی و یا القلی به آهسته گی اکسیدی گردیده و به واسطه اکسیدانت های قوی و حرارت زیاد سایکلو الکان های دیگر نیز اکسیدی می گردند، در این صورت حلقه قطع و اسیدهای دوقیمته با عین تعداد کاربن حاصل می گردند:







۴-۲-۲: ساختمان و نامگذاری مرکبات حلقه ای

اتوم های کاربن در مالیکول مرکبات حلقه ای مانند الکان ها توسط رابطه یگانه باهم وصل گردیده که به نام رابطه سگما یاد شده است و اتوم های کاربن های بیرید sp^3 را دارا اند. فورمول عمومی سلسله هومولوگ سایکلو پارافین ها C_nH_{2n} یا $(CH_2)_n$ است؛ به این ترتیب مالیکول سایکلو پارافین ها نسبت به الکان ایزولوگ شان دو اتوم هایدروژن کمتر را دارا اند. نامگذاری سایکلو الکان ها با علاوه نمودن پیشوند (prefix) سایکلو (Cyclo) به نام الکان ایزولوگ آن ها صورت می گیرد.




برای تحریر فورمول های سایکلو الکان ها از فورمول های شرطی آن ها استفاده می نمایند که در آن ها

سمبول‌های عناصر تحریر نمی‌گردد؛ به طور مثال:







فعالیت

در ذیل فورمول‌های شرطی سایکلوالکان‌ها تحریر گردیده است، شما فورمول مشرح آن‌ها را تحریر و نامگذاری نمایید:




۴-۲-۳: ایزومیری سایکلوالکان‌ها


ایزومیری ساختمانی سایکلوالکان‌ها مربوط به جسامت حلقه، ساختمان زنجیرجانبی و موقعیت زنجیر آن‌ها است، در ذیل فورمول پنج ایزومیر مرکب با نام‌های آن‌ها تحریر گردیده است که مطلب فوق را توضیح می‌نماید:



سایکلوپارافین‌ها دارای ایزومیری‌های فضایی نیز بوده و این ایزومیری وقتی به ملاحظه می‌رسد که مواد دارای یک نوع فورمول ساختمانی بوده؛ لاکن موقعیت فضایی اتم‌ها از یکدیگر فرق داشته باشد. ایزومیری فضایی در سایکلوالکان‌ها مربوط به موقعیت فضایی زنجیرجانبی نظر به حلقه می‌باشد، این نوع ایزومیری را به نام ایزومیری هندسی (Geometric isomerism) یا ایزومیری ترانس و سیس (Trans, cis isomerism) یاد می‌کنند. اگر بقیه‌های موجود در سایکلوالکان‌ها به یک سطح حلقه‌ها قرار داشته باشد، این نوع ایزومیری را به نام سیس (Cis) یاد می‌نمایند، در صورتی که بقیه‌ها در سطوح مختلف حلقه قرار داشته باشند، به نام ترانس (Trans) یاد می‌گردد؛ به طور مثال:



Trans-1,2-dimethylcyclopropane



Cis-1,2-dimethylcyclopropane

ایزومیری سیس و ترانس دارای خواص کمیای و فیزیکی مختلف اند.

فعالیت




فرمول ایزومیری‌های ساختمانی و فضایی سایکلوالکان‌های ذیل را تحریر و نام گذاری نمایید:

Di ethylcyclopentane , Dichlorocyclo butane, trimethyl cyclo


hexane

۴-۲-۴: استحصال سایکلوالکان‌ها

طریقه عمومی استحصال سایکلوالکان‌ها عبارت از عمل فلزات بالای مشتقات دای هالیدهای الکان‌ها است؛ به طور مثال: اگر $1,3\text{-diboromopropane}$ با فلز جست تعامل داده شود، سایکلو



از مرکب $1,4\text{-dibromobutane}$ میتوان سایکلوپنتان را به دست آورد:



1,4-di bromo butane

cyclo butane

۴-۲-۵: مرکبات مهم سایکلوالکان‌ها

سایکلوپنتان در نفت یافت شده و آن را در ماده مهم احتراقی موتورهای غرض بلند بردن کیفیت آن علاوه می‌نمایند؛ همچنان مرکبات مذکور را در سنتزهای مختلف استعمال می‌کنند. نفت دارای مشتقات کاربوکسیل دار سایکلوپنتان؛ یعنی سایکلوپنتان کاربوکسیلیک اسید و هومولوگ‌های آن که به نام نفتینیک اسید (Naphthene acid) یاد می‌گردد، نیز موجود است.



- * الکانها مرکباتی اند که بین اتومهای کاربن آنها رابطه ساده (یگانه) موجود بوده و ولانسهای متباقی اتومهای کاربن توسط هایدروجن مشبوع گردیده است.
- * چهار مرکب اول هومولوگ الکانها در شرایط ستنرد به حالت گازیافت شده و دارنده 5 الی 16 کاربن به حالت مایع و بالاتر از آن به حالت جامد یافت می شوند.
- * فعالیت کیمیاوی الکانها کمتر بوده؛ از این سبب آنها را به نام پارافین (Paraffins) یعنی کم میل یاد می نمایند.
- * در یک سلسله از مرکبات مشبوع دو اتوم کاربن می توانند بین خود رابطه اشتراکی یگانه (به طور کامل مشابه به رابطه های $sp^3 - hybrid$ دو اتوم کاربن وسطی که بیشتر از یک و یا چندین بقیه CH_2 بین آنها موجود باشد) به شکل حلقه رابطه برقرار نمایند، این مرکبات به نام سایکوالکانها (Cycloalkanes) یاد می شوند که اولین مرکب آنها سایکلو پروپان است:
- * سایکوالکانها در روغنهای ایتري Ethereal Oil (نباتی) یافت می گردد. اسکلیت کاربنی هومولوگ سایکلو هگزان (1-methyl 4-isopropyl cyclo hexane) اساس بسیاری از ترپینها (Terpenes) را تشکیل می دهد.
- * فورمول عمومی سلسله هومولوگ سایکلو پارافینها C_nH_{2n} یا $(CH_2)_n$ است که به این ترتیب مالیکول سایکلو پارافینها نسبت به الکان ایزولوگ شان دو اتوم هایدروجن کمتر را دارا اند.
- * سایکوالکانهای دارای حلقه کوچکتر تمایل به تعاملات جمعی را دارا بوده که حلقه آنها باز گردیده، الکانها و مشتقات آنها را تشکیل می دهند که خاصیت الکینها را نشان می دهند.
- * حلقه های دارنده 5 - 7 کاربن دارای ثبات زیاد بوده، مانند هایدروکاربنهای مشبوع تعاملات تعویضی را انجام می دهند:


سؤالات فصل چهارم سؤالات چهار جوابه

- 1 - الکانها مرکباتی اند که بین اتومهای کاربن آنها رابطه --- موجود است.
الف - ساده ب - یگانه ج - دوگانه د - الف وب هر دو درست است
- 2 - الکانها دارای کدام یک از فورمول عمومی ذیل اند؟
الف - C_nH_{2n} ب - C_nH_{2n+2} ج - C_nH_{2n-2} د - C_nH_{2n-1}
- 3 - نام مرکب $\begin{array}{c} CH_3 - CH - CH - CH_2 - CH_3 \\ | \quad | \\ CH_3 \quad CH_3 \end{array}$ عبارت است از:
الف - 2,3-di methyl pentane ب - 3,3-di methyl pentane
ج - 4,3-Di methyl pentane د - 1,3-di methyl pentane
- 4 - پسوندane نام الکان (Alkane) مربوط در رادیکال آن به کدام پسوند تعویض می گردد؟
الف - ene ب - yne ج - yl د - al
- 5 - الکانهای دارنده 5 الی 16 انواع کاربن به کدام حالت یافت می شوند؟
الف - جامد ب - گاز ج - مایع د - پلازما

- 6 - فعالیت کیمیای الکانها کمتر بوده؛ از این سبب آنها را به نام ----- یاد می نمایند.
- الف - پارافین ب - Paraffin ج - الف وب هردو درست است د - هیچکدام
- 7 - از احتراق یک کیلوگرام میتان ---- انرژی آزاد می گردد.
- الف - 55625 کیلوژول ب - 57000 ژول ج - 57000 میگا ژول د - هیچکدام
- 8 - نامگذاری سایکلوالکانها با علاوه نمودن پیشوند (prefix) ---- به نام الکان ایزولوگ آنها صورت می گیرد.
- الف - سایکلو ب - Cyclo ج - الکیل د - الف وب هردو درست است.
- 9 - سایکلو الکانها را برای اولین بار درنفت توسط عالم روسی به نام --- کشف کرد،
- الف - مارکوفنیکوف ب - Markovnikov ج - الف وب د - زایتسف
- 10 - در تمام الکانها چرخش آزادانه به دور محور رابطه C-C موجود بوده تا زوایای روابط آنها به --- بالغ گردد.
- الف - 109 درجه و 28 دقیقه ب - 90 درجه ج - 30 دقیقه د - 65 درجه

سوالات تشریحی

- 1 - مفاهیم ذیل را تعریف و توضیح نمایید.
- الف - پارافین ب - هومولوگ ج - ایزومیر د - ایزولوگ
- 2 - در سلسله هایدروکاربنهای مشبوع با ازدیاد تعداد اتومهای کاربن کدام تغییرات در خواص فیزیکی رونما می گردد؟
- 3 - کدام آنها از هایدروکاربنها زیر نوع هایدروکاربن مشبوع است؟
- الف - C_7H_{14} ب - $C_{12}H_{26}$ ج - $C_{10}H_{20}$ د - $C_{24}H_{50}$
- 4 - ایزومیریها را در مرکبات زیر مشخص نمایید.




5 - فورمول مرکبات ذیل را تحریر دارید.

الف - 1,2-Di chloro propane ب - 1-ethyl - 2 - Iso propyl butane

ج - 1,3 - di ethyl nonane د - 1-bromo 3 - chloro decane

6 - کثافت یک هایدروکاربن مشبوع 2.59 گرام فی لیتر است کتله مالیکولی ماده مذکور را با فورمول آن در یافت نمایید. کتله نسبی هوا 29 است.

7 - فورمول میتایل سایکلوپروپان را تحریر و انواع کاربنهای آن را مشخص ساخته، نامگذاری نمایید.




9 - ساختمان فضایی سایکلوالکانهای ذیل را تحریر دارید.

الف - Cis - 1,2 - di chloro cyclo propane ب - Trans - 1 - ethyl - 2 - isopropylcyclobu tan e

ج - Cis - 1,3 - di ethyl cyclo butane د - Trans - 1 - bromo 3 - chloro cyclo pentane

فصل پنجم

الکین ها و الکاین ها




یکی از صنف های مهم هایدروکاربن ها، مرکبات غیر مشبوع فامیل الکین ها و الکاین ها بوده که در حیات روزمره ما رول اساسی را دارا اند، این مرکبات در مالیکول خود دارای رابطه دو گانه و سه گانه بوده؛ طوریکه در الکین ها بین دو اتوم کاربن رابطه اشتراکی دو گانه و در الکاین ها بین دو اتوم کاربن رابطه سه گانه موجود است.

در این فصل راجع به این مرکبات معلومات ارائه می گردد. با مطالعه این فصل خواهید آموخت که الکین ها و الکاین ها چی نوع مرکبات اند؟ طرز روابط در الکین ها و الکاین ها چگونه است؟ در کدام عرصه های حیاتی به کار می روند؟ چگونه و از کدام منابع آن ها را می توان به دست آورد؟ انتشار شان در طبیعت به کدام شکل است؟ با مطالعه این فصل به سؤالات فوق و مانند آن جواب خواهیم داد.


۵- ۱: الکین‌ها

ساده ترین هایدروکاربن غیرمشبوع فامیل الکین عبارت از ایتلین بوده که فورمول آن $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ می باشد، درمالیکول ایتلین بین دو اتوم کاربن رابطه اشتراکی دوگانه موجود است که یک رابطه آن سگما σ و یک رابطه دیگر آن π است. (مشخصات رابطه ایتلین) زاویه و طول رابطه درمبحث ساختمان الکین‌ها ارائه شده است، سلسله هومولوگ مرکبات الکین به اندازه یک گروپ متلین $(-\text{CH}_2-)$ از همدیگر فرق داشته و فورمول عمومی آنها C_nH_{2n} است که دراین فورمول n مساوی به 2 و بالاتر از آن قیمت‌های تام را به خود اختیار کرده می تواند. رابطه دوگانه ایتلین در یک سطح واقع شده است. مرکب دومی آن propene ($\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$) می باشد. موجودیت رابطه دوگانه فعالیت مرکبات الکین‌ها را نسبت به الکان‌ها بیشتر ساخته است؛ ازاین سبب موجودیت آن‌ها درمواد نفتی کمتر است.

الکین‌ها در پتروشیمی از اهمیت خاص برخوردار بوده و در اولین مرحله تبدلات کیمیای محصولات نفتی (الکان‌ها) حاصل شده می تواند، طوری که از الکان‌ها دو اتوم هایدروجن تجرید ساخته شده، الکین ایزولوک آن به دست میاید:



اگر الکایل بروماید‌ها با القلی‌ها در حرارت 55°C تعامل داده شود، الکین‌ها حاصل می گردد:




الکین‌ها را به نام اولفین‌ها (Olefines) به معنی تیل ساز نیز یاد می کنند؛ زیرا در مرکبات تیل نیز موجود می باشند.

۵- ۱- ۱: ساختمان الکین‌ها

یکی از خصوصیات ساده الکین‌ها موجودیت رابطه دوگانه بین دو اتوم کاربن در ترکیب مالیکول آن‌ها است، رابطه دوگانه به کمک دوجوره از الکترون‌های مشترک (رابطه چهار الکترونی) تشکیل می گردد. اتوم‌های کاربنی که بین هم رابطه دوگانه را دارا اند، به حالت sp^2 هایبریدیزیشن قرار داشته و هریک از اتوم مذکور سه رابطه سگما را که در یک سطح تحت زاویه 120° درجه قرار دارند، برقرار می نمایند. اوربیتال‌های غیر هایبرید شده بالای سطح سگما عمود قرار داشته و موازی با یکدیگر می باشند که در نتیجه باهم تداخل جانبی را عملی نموده و رابطه پای (رابطه دومی) را برقرار می نماید. الکترون‌های تشکیل دهنده رابطه پای را به نام الکترون‌های پای (π - electrons) یاد می کنند. ابرالکترونی π در قسمت بالا و پایین سطح رابطه سگما (σ) قرار داشته و به این اساس دوجوره الکترون رابطه جفته (یک رابطه سگما و یک رابطه پای) را تشکیل می دهند. رابطه جفته عبارت از مجموعه رابطه سگما و رابطه پای (σ bond + π bond) است. پوشش و تداخل جانبی ابرهای الکترونی p ، اوربیتال‌های غیر هایبرید شده که رابطه π را به وجود می آورند، اتوم‌های کاربن را باهم نزدیک می سازد و فاصله بین


آن‌ها را کوتاه می‌سازد؛ یعنی طول رابطه دوگانه $C=C$ به اندازه 133pm تقرب نموده، در حالی که طول رابطه ساده $C-C$ 154pm است. شکل (5-1) را ملاحظه نمایید:
 یک رابطه π [one π bond]




شکل (5-1) نمای رابطه درایتلین، زاویه و طول روابط آن

۵-۱-۲: نامگذاری الکین‌ها


در نامگذاری الکین‌ها پسوند ene را به عوض پسوند ane نام الکان ایزولوگ آن علاوه می‌نمایند. در مرکبات الکین‌ها نیز طویل‌ترین زنجیر را مشخص می‌سازند، در این صورت اول نمبر کاربن‌های که بقیه و یا انشعابات در آن موجود است، به ارقام 1، 2، 3 و غیره تحریر و بعد از علامه نام بقیه‌ها را به اساس حرف اول نام آن‌ها با در نظر داشت تقدم آن حرف در حروف الفبای انگلیسی تحریر و سپس نام زنجیر طویل را با پسوند ene تحریر و نمبر کاربن را که رابطه جفته در آن موجود است، نیز در ابتدای نام زنجیری طویل تحریر می‌نمایند. ناگفته نباید گذاشت اینکه نمبر گذاری زنجیر طویل از طرف زنجیر آغاز می‌شود که رابطه جفته به آن طرف نزدیک قرار داشته باشد؛ به طور مثال:



2-butene



1-butene



4-methyl-2-heptene

در صورتی که چندین رابطه دوگانه در این مرکبات موجود باشد، قبل از پسوند ene، ارقام di، Tri و غیره ذکر می‌گردد که این ارقام تعداد روابط جفته را افاده می‌کنند؛ به طور مثال:




2,4-hexadiene


۵-۱-۳: ایزومیری الکین‌ها

الف: ایزومیری ساختمانی و موقعیت رابط دوگانه

مرکبات ذیل را در نظر بگیرید: 4



1-butene




2-butene

فورمول جمعی هردو مرکب فوق C_4H_8 بوده؛ اما فورمول ساختمانی هردو مالیکول مرکب ازهم متفاوت بوده، موقعیت رابط دو گانه در این مرکبات از هم فرق دارد، این ایزومیری را به نام ایزومیری ساختمانی از لحاظ موقعیت رابطه دو گانه یاد می کنند.

ب - ایزومیری فضایی (Stereo isomeris)

Stereo کلمه یونانی بوده که به معنی جامد و اجسام سخت می باشد؛ بنابراین Stereo isomeris مربوط به مرکباتی است که ساختمان فضایی مستحکم را دارا بوده و شکل هندسی آن درفضا تغییر نمی کند؛ به طور مثال: مرکب 2-Butene را درنظر می گیریم و به واسطهٔ مدل های چوبی اشکال ممکنهٔ آن را عیار می سازیم، این مرکب قرار شکل (5 - 2) دو حالت ایزومیری را خواهد داشت؛ طوری که ملاحظه می گردد، محل استقرار گروپ های میتایل درمالیکول مرکب 2-Butene به طور کامل مختلف بوده و در حرارت عادی انرژی حرکی مالیکول ها قادر به تعویض و چرخش رادیکال های میتایل در آن نمی باشد؛ زیرا انرژی رابطه π مانع درمقابل تعویض و چرخش رادیکال های مذکور می گردد و غرض ازبین بردن این مانع انرژیکی باید انرژی فعال سازی (activation Energy) موجود باشد؛ بنابراین درحرارت عادی می توان این دونوع ایزومیر را از همدیگر جدا ساخت؛ زیرا نقطه غلیان آن ها از همدیگرفرق دارد.




شکل (5 - 2) دو ساختمان فضایی مالیکول 2 - بیوتین

1 - به طریقهٔ قدیمی نام گذاری Cis و Trans که تنها درمورد این حالت خاص؛ یعنی 2-Butene و اشکال مشابه هندسی آن صدق نموده که یک خط مستقیم را از مرکز دواتوم کاربن با رابطهٔ دو گانه آن ها رسم می نمایند، اگر هردوگروپ میتایل به یک طرف خط مستقیم؛ یعنی دریک مستوی قرار گیرند، این ساختمان را به نام Cis یاد نموده و اگر یکی آن در بالا و دیگری آن درپایین خط مستقیم؛ یعنی دردو مستوی مختلف قرار داشته باشند به نام ایزومیری Trans یاد می گردد.

2 - روش جدیدی که برای ایزومیری های فضایی به کار برده می شود، ایزومیری های مذکور را به حروف Z و E مشخص می سازند، این روش ایزومیری را که هر دوگروپ میتایل آن در یک طرف خط مستقیم قرار داشته باشد، این ساختمان را Z گویند (Z کلمه آلمانی Zusammen بوده که معنی

باهم است) ایزومیری که دوگروپ میتایل به دو سمت مختلف خط؛ یعنی در سطوح مختلف و با جهت مختلف باهم قرار داشته باشد به E مشخص می گردد. (E از کلمه آلمانی Entgegen گرفته شده که معنی مخالف باهمدیگر را دارد)؛ به طور مثال:





ساختمان Cis z

ساختمان E (ترانس)

(z) 2-butene

(E) 2-butene



۵-۱-۴ : خواص الکین ها

۵-۱-۴-۱ : خواص فیزیکی الکین ها

خواص فیزیکی الکین ها به خواص فیزیکی الکان های ایزولوگ شان مشابهت دارد؛ اما درجه غلیان الکین ها نظر به الکان های ایزولوگ شان پایین تر و کثافت شان بیشتر است.

سه عضواول این مرکبات ($C_2 \cdots C_4$) به حالت گاز، الکین های دارنده ($C_5 \cdots C_{18}$) حالت مایع و بالاتر از آن حالت موم یا جامد را دارا اند. ایزومیری ساختمانی، اسکلیت کاربنی و فضایی در خواص فیزیکی الکین ها تأثیر دارد. جدول ذیل را ملاحظه نمایید:

جدول (5 - 1) مشخصات فیزیکی الکین ها

| نام | فورمول | درجه ذوبان به $^{\circ}C$ | درجه غلیان به $^{\circ}C$ | کثافت مخصوصه |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Ethylene | $CH_2 = CH_2$ | -169 | -105 | 0.570 |
| 1-propene | $CH_2 = CH - CH_3$ | -185.2 | -47.8 | 0.610 |
| 1-butene | $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$ | -130.0 | -6.3 | 0.595 |
| 2-butene | $CH_3 - CH = CH - CH_3$ | cis 138.9 | +3.5 | 0.621 |
| | | trans (-105.5) | 0.9 | 0.604 |
| Iso-butene | $CH_2 = \underset{\substack{ \\ CH_3}}{C} - CH_3$ | -140 | -6.9 | 0.594 |

کثافت مخصوصه تمام اولفین ها کمتر از یک بوده و دارای بوی مشخص می باشد. در آب به خوبی


حل نشده؛ ولی انحلالیت شان نسبت به الکان‌های ایزولوگ شان بیشتر است.

۵- ۱- ۴- ۲: خواص کیمیاوی الکین‌ها

خواص کیمیاوی الکین‌ها را رابطه جفته و موقعیت فضایی رابطه سگما و پای تعیین می‌نماید، کثافت ابر الکترونی رابطه سگما در بالای خطی که هسته دواتوم را وصل می‌سازد، متمرکز شده و کثافت ابر الکترونی رابطه پای (π) از این حدود خارج گردیده و ساحت وسیع چارج منفی را تشکیل می‌دهد. تحریک از خصوصیات اساسی رابطه پای بوده و رابطه این الکترون‌ها با هسته نسبت به رابطه الکترون‌های سگما ضعیف است؛ از این سبب به آسانی قطبی شده و زمینه حمله به ذرات الکترون دوست (Electrophilic) میسر شده، به این اساس رابطه پای به شکل هترولیتیکی قطع و تعاملات جمعی صورت می‌گیرد. فرق بین انرژی رابطه پای و سگما 270kJ/mol است. بعضی از تعاملات الکین‌ها قرار ذیل است:

۱- هایدروجنیشن الکین


اگر ایتلین در موجودیت نکل به حیث کتلت هایدروجنیشن گردد، ایتان حاصل می‌گردد.



مالیکول ایتلین در یک سطح قرار داشته، در حالیکه مالیکول ایتان چهار سطحی است.

۲- هلوجنیشن الکین‌ها

اولفین‌ها در شرایط عادی، هلوجن‌ها بخصوص کلورین و برومین را بالای خود نصب نموده و دای هلایدهای پارافین‌ها را تشکیل می‌دهند؛ به طور مثال: تعامل ایتلین را با کلورین و برومین مشاهده می‌نماییم که تعامل اندوترمیک بوده، تعامل آن‌ها قرار ذیل است:




تعامل هلوجن‌ها را با الکین‌ها Halogenation گویند و مرکبات حاصله را به نام الکیل‌هلایدها یاد می‌نمایند.

بیرنگ ساختن آب برومین از جمله تعاملات توصیفی رابطه دوگانه است. برای این منظور از محلول برومین در کاربن تترا کلوراید یا کلوروفارم استفاده می‌نمایند، به اساس این تعامل درجه مشبوعیت تیل‌های مایع تعیین می‌گردد.


۳- اکسیدیشن الکین‌ها

الکین‌ها به آسانی تحت تاثیر اکسیدانت‌های مختلف قرار گرفته و با این خاصیت خود از پارافین‌ها و سایکلو پارافین‌ها فرق می‌شوند. از اکسیدیشن الکین‌ها نظر به شرایط مرکبات مختلف حاصل می‌شود، از احتراق الکین‌ها، کاربن دای اکساید، آب و انرژی حاصل می‌شود:






در شرایط عادی عملیه اکسیدیشن در محل رابطه دوگانه صورت می گیرد.

از اکسیدیشن محتاطانه الکین ها توسط محلول القلی پوتاشیم پر منگنات الکول های دوقیمته حاصل می گردد:



در نتیجه عمل اکسیدانت های قوی (محلول تیزابی پوتاشیم پرمنگنیت و مخلوط کرومیک اسید) بالای الکین ها رابطه جفته الکین ها قطع و مرکبات آکسیجن دار هایدروکاربن ها حاصل می شود؛ به طور مثال: اکسیدیشن سه ایزومیر بیوتین را مشاهده می نمایم:






فعالیت



محصول تعامل اکسیدیشن محتاطانه الکین های ذیل را توسط اکسیدانت های قوی با استفاده از

معادلات کیمیاوی توضیح بدارید:



۴ - پولی مرایزیشن الکین ها

الکین ها تعامل جمعی را با همدیگر انجام داده و به این ترتیب پولی میرها را تشکیل می دهند؛ به طور مثال: یک مالیکول ایتلین با مالیکول دیگر خود رابطه قایم نموده و همین مالیکول ها با مالیکول دیگر آن ها و سرانجام چندین مالیکول ایتلین باهم تعامل جمعی را انجام داده، پولی میر ایتلین را تشکیل می دهد. الکین اولیه را به نام مونومیر (Monomer) یاد می نمایند. (Monomer) کلمه یونانی بوده که مفهوم یک قسمت را دارد. زنجیر تشکیل شده را از روابط مونومیرها به نام پولیمیر (polymer) یاد می کنند که ساده ترین آن ها پولیمیر ایتلین است، فورمول آن $(\text{CH}_2 - \text{CH}_2)_n$ - بوده و زنجیرهای طویل را تشکیل می دهند. در صنعت پلاستیک سازی پولیمیرها را از اتحاد مونومیرهای دارای فورمول عمومی $(\text{CHX} - \text{CH}_2)$ - بدست می آورند، در این مونومیر X هلوژنها را افاده می کند و در این مرکبات می تواند به عوض X گروپ CH_3 - باشد. در صورتی که X عبارت از کلورین باشد؛ پس فورمول عمومی پولیمیر آن عبارت از $(\text{CHCl} - \text{CH}_2)$ - بوده که (Polyvinyl Chloride) (PVC) یاد میشود و فورمول $[\text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2]_n$ - به نام پولی پروپیلین یاد می گردد.


۵-۱-۵: استحصال الکین‌ها

الکین‌ها برخلاف پارافین‌ها در طبیعت کم یافت می‌شوند. اولفین‌های کوچک به مقدار کم در مخلوط گازنفی یافت شده و اولفین‌های بزرگ در نفت یافت می‌شود.



۱- **انشقاق نفت:** اگر نفت انشقاق و پیرولیز گردد، الکین‌ها حاصل می‌شود و میخانیکیت این تعامل طوری است که الکان‌های عالی را تحت حرارت 400-700 درجه سانتی گراد قرار می‌دهند، در نتیجه رادیکال‌های الکان‌ها حاصل گردیده و در تعامل بعدی رادیکال‌ها الکین‌ها حاصل می‌گردد:





رادیکال‌های $(\text{CH}_3 \cdot, \text{CH}_2 \cdot)$ که در مرحله اول در نتیجه قطع رابطه $\text{C} - \text{C}$ حاصل می‌گردد، مالیکول‌های پارافین‌های عالی را مورد حمله قرار داده و هایدروجن کاربن سومی و یا دومی را که از انجام زنجیر دور باشد، از زنجیر جدا می‌سازد:




بعد از آن رابطه کاربن - کاربن در موقعیت اتوم کاربن دارنده الکترون طاقه قطع می‌گردد که در نتیجه الکان کوچک و الکین تشکیل می‌گردد:



به همین ترتیب قطع رابطه در موقعیت (α, β) چندین مرتبه صورت گرفته و مقدار زیاد اولفین‌ها و از جمله ایتلین حاصل می‌گردد:




۲- **دی‌هایدروجنیشن الکان‌ها:** طریقه مهم استحصال اولفین‌ها عبارت از دی‌هایدروجنیشن الکان‌ها می‌باشد، در این عملیه به حیث کنتلست از اکساید کرومیم استفاده شده و تعامل مذکور به حرارت 450 الی 460 درجه سانتی گراد انجام داده می‌شود:



۳- **دی‌هایدریشن الکول:** طریقه مهم استحصال اولفین‌ها در لابر اتوار عبارت از الیمینیشن (Elimination) است، مهمترین این طریقه‌ها عبارت از دی‌هایدریشن الکول‌ها (کشیدن آب) می‌باشد؛ به طور مثال: اگر ایتایل الکول با تیزاب گوگرد و یا فاسفوریک اسید حرارت داده شود، در نتیجه ایتلین و آب حاصل می‌گردد:





فعالیت




استحصال ایتلین

سامان و مواد ضرورت: ایتایل الکول، تیزاب گوگرد، بالون، پایه همراه گیر، منبع حرارت تست تیوب‌ها، نل‌های زانوخم، سه پایه و تشت پر از آب.


طرز العمل: دستگاه را قرار شکل (3 - 5) عیار ساخته، یک مول ایتایل الکول را با تیزاب گوگرد مخلوط نموده در یک بالون علاوه کنید، سپس آن را الی $150-170^\circ\text{C}$ حرارت دهید، مشاهدات خود را تحریر نموده و به سؤالات زیر جواب دهید:

- 1 - تیزاب گوگرد در این تعامل کدام رول را دارا است؟
- 2 - میخانیکیت تعامل را به اساس معادلۀ کیمیاوی توضیح نمایید.



شکل (3 - 5) دستگاه استحصال ایتلین از ایتایل الکول

۴- **دی‌هایدروهلوجنیشن:** از تعامل دی‌هایدروهلوجنیشن (کشیدن هلوجن و هایدروجن) الکایل هالیدها نیز الکین‌های ایزولوگ شان حاصل می‌گردد، در این تعامل از محلول الکولی قلوئی‌ها استفاده می‌گردد؛ به طور مثال:




۵- ۱- ۶: بعضی از الکین‌های مهم

۱- ایتلین

ایتلین یک مرکب گازی بوده، در آب به مقدار کم حل شده و در الکل به مقدار زیاد حل می‌گردد. چون ایتلین نسبت به میتان یک اتوم کاربن زیاده‌تر را دارا است؛ بنابراین به شعله درخشان تر می‌سوزد. مخلوط ایتلین و هوا دارای خاصیت انفلاقی است، باید به آن احتیاط شود. ایتلین از تقطیر خشک مرکبات عضوی حاصل می‌گردد و همیشه گاز روشن دارای گازات ایتلین می‌باشد. ایتلین در گازات موجود در نفت یافت می‌شود. در صنعت ایتلین به پیمانۀ وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد.


۲- پروپلین (C_3H_6)

پروپلین به حالت گاز یافت شده و در صنعت آن را به طریقه کرکنگ (انشقاق) از گازات نفت و دی هایدروجنیشن پروپان به دست می‌آورند.





۳- بیوتلین (C_4H_6)

بیوتین دارای سه ایزومیر بوده که عبارت از 1-butene, 2-butene و Isobutene می‌باشد. این مرکب و ایزومیری‌های آن به حالت گاز یافته شده که از فرکشن‌های الکان‌ها حاصل می‌شوند. از فرکشن بیوتان به اساس تعامل کرکنگ، بیوتلین حاصل می‌گردد و از دی هایدروجنیشن بیوتان، 2- بیوتین یا دی میتایل وینایل (Di methyl vinyl) را به دست می‌آورند.



۴- سایکلوپنتین (C_5H_8) (Cyclopentene)

سایکلوپنتین در شرایط عادی مایع بوده و به حرارت 44 درجه سانتی گراد به غلیان می‌آید و آن را می‌توان از سایکلوپنتان قرار ذیل به دست آورد:



فعالیت: خود را آزمایش کنید

از 9.2 گرم ایتایل الکل، ایتلین حاصل گردیده است:

الف - چند مول ایتلین حاصل شده است؟


ب - چند لیتر هایدروجن برای هایدروجنیشن ایتلین حاصل شده ضرورت است.

۵-۲: الکاین‌ها (Alkynes)

الکاین‌ها هایدروکاربن‌های غیر مشبوع اند که بین دواتوم کاربن درمالیکول آن‌ها رابطه اشتراکی سه گانه موجود است، اولین مرکب الکاین‌ها استلین بوده، ازاین سبب آن‌ها را به نام خاندان استلین نیز یاد می‌نمایند. این هایدروکاربن‌ها نیز زنجیری باز بوده که در مالیکول خود یک و یا چندین رابطه سه گانه را دارا اند. اگر دواتوم‌هایدروجن الکین‌ها تجرید گردد، الکاین مربوط آن حاصل می‌شود. الکاین‌های دارای یک رابطه سه گانه با فورمول عمومی C_nH_{2n-2} هستند که دراین فورمول $n \geq 2$ است و کوچکترین آن‌ها استلین بوده که نام سیستماتیک آن Ethyne می‌باشد؛ بنابراین اگر پسوند yne به ارقام لاتین که تعداد اتوم‌های کاربن الکاین‌ها را افاده می‌کند، علاوه گردد، نام الکاین مربوطه آن حاصل می‌شود.

۵-۲-۱: ساختمان الکاین‌ها

فکتور اساسی در الکاین‌ها موجودیت رابطه سه گانه ($C \equiv C$) در مالیکول آن‌ها می‌باشد، در تشکیل رابطه سه گانه سه جوهر الکترون‌های مشترک (رابطه شش الکترونی) سهم می‌باشد. اتوم‌های کاربنی که رابطه سه گانه را تشکیل می‌دهند، به حالت sp - هایبریدیزیشن قرار دارند. هرکدام آن‌ها یک رابطه سگما را که به زاویه 180° درجه مواجه می‌باشد، تشکیل می‌دهند. دو اوربیتال p غیر هایبرید شده هر یک از اتوم‌های کاربن به زاویه 90° یکی بالای دیگر قرار داشته و با اوربیتال مربوطه اتوم کاربن دومی موازی قراردارند، هر جفت ازاین اوربیتال‌ها باهم تداخل جانبی نموده و دو رابطه پای (π) را تولید می‌نماید. رابطه سه گانه متشکل از یک رابطه سگما و دو رابطه پای می‌باشد. شکل ذیل موقعیت رابطه‌ها را در مالیکول استلین نشان می‌دهد:




شکل (۵ - ۴) موقعیت و چگونگی رابطه‌ها در استیلین

۵-۲-۲: ایزومیری الکاین‌ها

ایزومیری الکاین‌ها مربوط به ساختمان زنجیر کاربنی و موقعیت رابطه سه گانه در زنجیر آن‌ها می‌باشد و با ایزومیری الکین‌ها تقریباً مشابه است؛ اما ایزومیری سیس و ترانس را دارا نمی‌باشند؛ زیرا دورابطه سگما که توسط دواتوم کاربن تشکیل شده اند، به حالت sp هایبرید تحت زاویه 180° در یک خط مستقیم قرار دارند؛ به این اساس مالیکول استلین خطی است.

استلین و پروپاین دارای ایزومیزی نبوده و ایزومیری‌های بیوتاین قرار ذیل است:



1 - butyne

2 - butyne

فعالیت



مرکباتی دارای فورمول‌های مالیکولی جمعی C_5H_8 , C_6H_{10} , C_7H_{12} بوده، ایزومیری‌های ساختمان و موقعیت رابطه سه گانه آن‌ها را تحریر دارید.


۵ - ۲ - ۳: نامگذاری الکین‌ها

پرنسیپ نامگذاری الکین‌ها مانند الکین‌ها بوده، در نامگذاری اشتقاقی (Rational) گروه الکین مشتق استلین پنداشته شده که مثال‌های ذیل مطلب را واضح می‌سازد:




Ethyl acetylene

Di methyl acetylene



Methyl Propyl acetylene





Methyl isopropyl acetylene

فعالیت



ایزومیری مرکب دارای فورمول جمعی C_8H_{14} را تحریر و به طریقه اشتقاقی نامگذاری نمایید. نامگذاری (IUPAC) الکین‌ها مانند نام گذاری الکان‌ها و الکین‌ها بوده که موقعیت رابطه سه گانه به نمبر اتم‌های کاربن مشخص می‌گردد و نمبر گذاری زنجیر اساسی از آن سمت زنجیر صورت می‌گیرد که رابطه سه گانه در این مرکبات به آن نزدیک باشد؛ به طور مثال:



3 - methyl - 1 - butyne

2 - butyne

فعالیت



الف - مرکباتی دارای فورمول‌های ذیل را به اساس (IUPAC) نامگذاری نمایید:



ب - فورمول‌های شرح مرکبات ذیل را تحریر بدارید:

a. 4,4 - dimethyl 1 - pentyne b. 4 - methyl - 2 - pentyne

c. 3-Methy-2-hexene -5- yne d. 3,3,3-trfluoro -1- butyne

۵-۲-۴ خواص فیزیکی الکاین‌ها

خواص فیزیکی الکاین‌ها مشابه خواص الکان‌ها بوده، الکاین‌های دارنده دو تا چهار اتوم کاربن به حالت گاز از پنج تاشانزده اتوم کاربن حالت مایع وبالاتر از آن حالت جامد را دارا اند. ایتیلین به حرارت 10.3°C - به غلیان آمده واستلین به 83.5°C - غلیان می‌نماید.


قابلیت انحلال الکاین‌های کوچک در آب نسبت به الکین‌ها والکان‌ها ایزولوگک شان بیشتر است؛ اما با آن هم در آب کم حل می‌شوند. جدول ذیل خواص فیزیکی بعضی الکاین‌ها را نشان می‌دهد:

جدول (5 - 2) بعضی الکاین‌ها ومشخصات فیزیکی شان

| نام | تعداد کاربن‌ها | فورمول ساختمانی | درجه ذوبان | درجه غلیان | کثافت g/L |
|-----------|----------------|--|--------------------------|------------------------|-----------|
| Ecetylene | 2 | $\text{CH} \equiv \text{CH}$ | -80.8°C | -75°C | |
| Propyne | 3 | $\text{CH} \equiv \text{CCH}_3$ | -103°C | -23°C | |
| 1-butyne | 4 | $\text{CH} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_3$ | -125.7°C | 8°C | |
| 2-butyne | 4 | $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$ | -32.3°C | 27.0°C | 0.691 |
| 1-pentyne | 5 | $\text{CH} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ | -106°C | 40°C | 0.69 |
| 2-pentyne | 5 | $\text{CH}_3\text{C} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_3$ | -109°C | 56°C | 711.0 |
| 1-hexyne | 6 | $\text{CH} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ | -132°C | 71°C | 716.0 |
| 2-hexyne | 6 | $\text{CH}_3\text{C} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ | -89°C | 84°C | 0.73 |
| 3-hexyne | 6 | $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C} \equiv \text{CCH}_2\text{CH}_3$ | -101°C | 84°C | 0.723 |
| 1-heptyne | 7 | $\text{CH} \equiv \text{C}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$ | -81°C | 100°C | 0.738 |
| 1-ochyne | 8 | $\text{CH} \equiv \text{C}(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$ | -79°C | 126°C | 0.747 |
| 1-nonyne | 9 | $\text{CH} \equiv \text{C}(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$ | -50°C | 151°C | 0.758 |
| 1-decyne | 10 | $\text{CH} \equiv \text{C}(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$ | -44°C | 174°C | 0.767 |

۵-۲-۵: خواص کیمیاوی الکاین‌ها

خواص کیمیاوی الکاین‌ها مربوط به طبیعت رابطه سه گانه و خصوصیات اتم‌های کاربن در حالت sp هایبرید آن‌ها است. تعاملات مشخصه هایدروکاربن‌های غیر مشبوع از جمله الکاین‌ها عبارت از تعامل جمعی بوده؛ لکن تعاملات الکاین‌ها به دو مرحله صورت می‌گیرد. در مرحله اول تعامل جمعی در رابطه سه گانه صورت گرفته، اولفین و مشتقات آن‌ها تشکیل می‌گردد. در مرحله دوم اولفین‌ها و مشتقات تشکیل شده آن‌ها به الکاین‌ها و مشتقات آن‌ها تبدیل می‌گردد. میخانیکیت تعامل استلین را با هایدروجن بروماید قرار ذیل مطالعه می‌نماییم:




رابطه سه گانه نسبت به رابطه دو گانه به کندی اکسیدی می‌گردد، به این اساس می‌توان مرکبات الکین‌ها و مشتقات آن‌ها را از الکاین‌ها و مشتقات آن‌ها فرق نمود.

رابطه سه گانه نسبت به رابطه یگانه در مقابل حرارت مقاوم بوده، این مطلب را استحصال استلین از میتان و همولوگ آن توسط انشقاق حرارتی ($1200^\circ\text{C} - 1500^\circ\text{C}$) خوب تر توضیح می‌نماید. ازدیاد سهم اوریتال s در حالت‌های هایبرید اوریتال‌ها، منفیت برقی اتم‌های کاربن بیشتر شده و رابطه بین کاربن و هایدروجن بیشتر قطبی می‌گردد:

جدول (5 - 3) نوع هایبرید کاربن و منفیت برقی آن

| هایبریدیزیشن | سهم s اوریتال در هایبرید اوریتال | منفیت برقی (EN) |
|---------------|----------------------------------|-----------------|
| Sp^3 | $\frac{1}{4}$ | 2.5 |
| Sp^2 | $\frac{1}{3}$ | 2.62 |
| sp | $\frac{1}{2}$ | 2.75 |

علت داشتن خاصیت تیزابی استلین نیز مربوط به قطبیت بارز رابطه C-H در مالیکول آن است. قطع هومولیتیکی رابطه و تشکیل رادیکال مشکل بوده؛ ولی قطع هترولیتیکی رابطه به آسانی صورت می‌گیرد:



در زیر بعضی تعاملات الکاین‌ها را مطالعه می‌نماییم:

۱ - تعاملات جمعی


الف - نصب هلوجن‌ها: نصب هلوجن‌ها بالای الکاین‌ها نسبت به اولفین‌ها به مشکل و بطی صورت

می گیرد، از بین رفتن رنگ آب برومین تعامل توصیفی رابطه چند گانه را نشان می دهد:




1,2 - Di Bromoethene

ب - نصب هایدروجن هالایدها بالای الکاین ها: هایدروجن هالایدها بالای رابطه سه گانه در مقایسه با نصب آن ها بالای رابطه دو گانه به مشکل صورت می گیرد:




Vinyl Fluoride (Fluoro Ethene)

۲- هایدروجنیشن الکاین ها: هایدروجنیشن الکاین ها نسبت به الکین ها به کندی صورت می گیرد:




Ethene

۳- هایدریشن الکاین ها: هایدریشن الکاین ها نسبت به الکین ها به آسانی صورت می گیرد و درموجودیت کتلت ها از قبیل تیزاب گوگرد و نمک سیماب دو ولانسه حتمی می باشد. درمرحله اول مرکب بی ثبات تشکیل شده؛ زیرا موجودیت گروپ هایدروکسیل بالای کاربن دارنده رابطه دو گانه امکان پذیر نبوده؛ از این سبب تغییر شکل؛ یعنی ایزومریشن نموده، الدیهایدها را تشکیل می دهد، در صورت استلین، اسیت الدیهاید تشکیل می گردد:




به اساس تعامل فوق در صنعت اسیت الدیهاید را به دست می آورند.

از هومولوگ های استلین در نتیجه هایدریشن کیتونهای ایزولوگ شان تشکیل می گردد:




۴- اکسیدیشن الکاین ها: الکاین ها به آسانی اکسیدی شده و عملیه اکسیدیشن یکجا با قطع زنجیر از

قسمت رابطه سه گانه است:




الکاین ها محلول آبی پوتاشیم پرمنگنات را بی رنگ می سازد که از این تعامل برای تشخیص توصیفی رابطه سه گانه می توان استفاده کرد. معادله ذیل مطلب فوق را توضیح می نماید:




۵- پولى مرازيشن الكاين ها

الكاين ها مى توانند در موجوديت كتلست ها يكي باديگر تعامل نموده و نظر به شرايط مركبات مختلف را تشكيل دهند ؛ به طور مثال:





اگر استلين در موجوديت حرارت وزغال، ترأى مرازيشن گردد، بنزين حاصل مى گردد:




۶- تعاملات تعويضى الكاين ها



اتوم هاى هايدروجن در ماليكول استلين ومشتقات مونو الكايل آن ($R - C \equiv CH$) قدرت تعويض با فلزات را دارا اند. هايدروجن استلين ومشتقات مونو الكايل آن ($\text{CH} \equiv \text{C} - \text{R}$) در تحت تأثير قلوئى هاى قوى يعنى امائدهاى فلزات القلئى در امونئىاى مائع به فلزات القلئى تعويض گرديده واستلايد (acetylide) حاصل مى شود:



در تعامل فوق الكاين ها به حيث تيزاب عمل نموده و با القلئى هاى قوى پروتون مى دهد. استلايدها مركبات نمك مانند بوده وتوسط آب در معرض هايدروليز قرار مى گيرد. خاصيت تيزابى استلين نسبت به آب ضعيف بوده؛ اما نسبت به ايتلين وايتان بيشتر مى باشد. معرف هاى گرئنارد ($R - \text{MgX}$) با الكاين ها تعامل نموده مگنيزيم استلايدها راتشكيل مى نمايد:





سوديم استلايد ومگنيزيم اسئى تئلايد در سنتئزهاى مختلف به كار مى رود، كلسم كاربايد نئز يك استلايد است. اگر محلول امونئىاى نائترئت نقره ونائترئت مس يك ولانسه با استلين تعامل داده شود، به ترتيب رسوب سفيد رنگ وخرمائى رنگ حاصل مى شوند كه در حالت خشك خاصيت انفلاقئى را دارا مى باشند:



فعائئت




معادلات تعاملات زئر را تكمئل نمائيد:



۵- ۳: استلین


استلین خالص دارای بوی نبوده؛ بوی ناگوار استلین که از کلسیم کارباید استحصال می‌گردد، ناشی از موجودیت هایدروجن سلفاید و فاسفین در آن به شکل مخلوط است. استلین در آب منحل است. مخلوط استلین با هوا خاصیت انفجاری را دارا بوده؛ بنابراین در اثنای کار با استلین باید احتیاط گردد. از احتراق استلین مقدار زیاد حرارت 1300 KJmol تولید می‌گردد. استلین که اولین مرکب الکاین‌ها است، به شعله فوق العاده گرم در هوا احتراق نموده و حرارت را تولید می‌نماید که از آن غرض قطع و ولدنک فلزات استفاده می‌نمایند. این مرکب از تعامل آب با کلسیم کارباید به دست می‌آید:



بعضی از خواص‌های فیزیکی استلین در جدول (5-3) ذکر است.



۵- ۳-۱: خواص کیمیاوی استلین

1- تعامل احتراق استلین: استلین در هوای آزاد احتراق نموده، کاربن دای اکساید، آب و انرژی را تولید می‌نماید:




۲- تعاملات جمعی استلین

الف - استلین با هایدروجن تعامل نموده، در مرحله اول ایتلین و در مرحله دوم ایتان را تشکیل می‌دهد:



ب - استلین با هلوجنها تعامل نموده هالاید الکین‌ها و هالاید الکان‌ها را تشکیل می‌دهد:



تمام تعاملات را که الکاین‌ها انجام داده می‌توانند، استلین نیز انجام می‌دهد.

۵- ۳-۲: استحصال استلین

استلین را به طریقه‌های مختلف استحصال می‌نمایند:

1- هایدرولیز کلسیم کارباید (CaC_2):

فعالیت




استحصال استلین از کلسیم کارباید

سامان و مواد مورد ضرورت: سنگ کارباید، آب مقطر، قیف، نل زانوخم شیشه‌یی، تست تیوب، تشت پر از آب، سرپوش کارکی سوراخ دار و ایرلین مایر.


طرز العمل: یک مقدار کم کلسیم کارباید را در یک ایرلین مایر انداخته، دهن آن را توسط

سرپوش کارکی سوراخ دار بسته نمایید؛ سپس از سوراخ‌های سرپوش کارکی یک نل زانوخم و یک قیف را به داخل ایرلین مایر نموده و از طریق قیف بالای کلسیم کارباید آب خالص علاوه نمایید، نل زانوخم را به تست تیوب که در تشت پر از آب سرچپه قرار دارد، رهبری نموده، مشاهدات خود را تحریر بدارید.



شکل (5 - 5) دستگاه استحصال استیلین از کلسیم کارباید

2- اگر دای بروموایتان با محلول الکولی پوتاشیم هایدروکساید در موجودیت حرارت تعامل داده شود، استیلین حاصل می‌گردد:




3- اگر کاربن عنصری با هایدروجن در جریان برق از طریق قوس برقی قرار داده شود، استیلین به دست می‌آید:



مثال اول: اگر 5 گرم کلسیم کارباید در آب علاوه گردد، در شرایط STP به مقدار 1.12L استلین حاصل می گردد، فیصدی کلسیم کارباید را در این تعامل دریافت کنید.

حل: در مرحله اول معادلهٔ کیمیاوی تعامل کلسیم استیلاید را با آب تحریر می داریم:



$$22.4\text{L} \quad - \quad 1\text{mol}$$

$$1.12\text{L} \quad - \quad n$$

$$n = \frac{1.12\text{L} \cdot 1\text{mol}}{22.4\text{L}} = 0.05\text{mol}$$

$$n_{\text{CaC}_2} = \frac{m}{M} \Rightarrow m_{\text{CaC}_2} = n \cdot M = 0.05\text{mol} \cdot 64\text{g/mol}$$

$$m_{\text{CaC}_2} = 3.2\text{g}$$






$$5\text{g} \quad - \quad 3.2\text{g}$$

$$100\text{g} \quad - \quad w\%$$

$$W\%_{\text{CaC}_2} = \frac{3.2\text{g} \cdot 100}{5\text{g}} = 64\%$$

مثال دوم: از شروع تعامل CaCO_3 مرکبات ذیل را به دست آورید؟

الف - استلین ب - ایتلین ج - ایتان



خلاصه فصل پنجم

* سلسله هومولوگ مرکبات الکین به اندازه یک گروپ متیلین ($-\text{CH}_2-$) از همدیگر فرق داشته و فورمول عمومی آنها C_nH_{2n} است.

* اگر از الکانها دو اتوم هایدروجن تجرید ساخته شده، الکین ایزولوک آن به دست میآید.

* ایزومیری فضایی (Stereo isomeris) مربوط به مرکباتی است که ساختمان فضایی مستحکم را دارا بوده و شکل هندسی آن درفضا تغییر نمی کند.

* خواص کیمیاوی الکینها را رابطه جفته و موقعیت فضایی رابطه سگما و پای تعیین می نماید، کثافت ابر الکترونی رابطه سگما در بالای خطی که هسته دواتوم را وصل می سازد، متمرکز شده و کثافت الکترونی رابطه پای از این حدود خارج گردیده وساحه وسیع چارج منفی را تشکیل می دهد. تحریک از خصوصیات اساسی رابطه پای بوده و رابطه این الکترونها با هسته نسبت به رابطه الکترونهای سگما ضعیف است؛ از این سبب به آسانی قطبی شده و زمینه حمله به ذرات الکترون دوست ((Electrophilic میسر شده، به این اساس رابطه پای به شکل هترولیتیکی قطع و تعاملات جمعی صورت می گیرد. فرق بین انرژی رابطه پای و سگما 270KJ mol است.

* الکینها تعامل جمعی را با همدیگر انجام داده و بدین ترتیب پولی میرها را تشکیل می دهند.


* الکانها هایدروکاربنهای غیر مشبوع اند که بین دواتوم کاربن درمالیکول آنها رابطه اشتراکی سه گانه موجود است.

* الکانهای دارای یک رابطه سه گانه با فورمول عمومی $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ هستند که در این فورمول $n \geq 2$ است و کوچکترین آنها استلین بوده که نام سیستماتیک آن Ethyne می باشد.

* اگر پسوند yne به ارقام لاتین که تعداد اتومهای کاربن را افاده می کند، علاوه گردد، نام الکان مربوطه آن حاصل می شود.

* قابلیت انحلال الکانهای کوچک در آب نسبت به الکینها والکانهای ایزولوگ شان بیشتر است؛ اما با آن هم در آب کم حل می شوند.

* علت داشتن خاصیت تیزابی استلین مربوط به قطبیت بارز رابطه $\text{C}-\text{H}$ در مالیکول آن است. قطع هومولیتیکی رابطه و تشکیل رادیکال مشکل بوده ولی قطع هترولیتیکی رابطه به آسانی صورت می گیرد:



* از احتراق استلین مقدار زیاد حرارت (1300KJ/mol) تولید می گردد که از آن غرض قطع و ولدنگ فلزات استفاده می نمایند.

* بر اساس قاعده مارکوف نیکوف در تعامل کیمیاوی الکینها با HX هایدروجن بالای کاربن نصب می شود که دارای هایدروجن بیشتر و هالاید بالای کاربنی نصب می شود که دارای هایدروجن کمتر باشد.

سوالات و تمرین فصل پنجم








سوالات چهار جوابه

- 1 - در مالیکول ایتیلین بین دو اتموم کاربن کدام رابطه موجود است؟
الف - یگانه ب - دو گانه ج - سه گانه د - آیونی
- 2 - رابطه دو گانه متشکل از ----- است
الف - یک رابطه سکما σ و یک رابطه π است ب - دو رابطه سکما ج - دو رابطه سگما د - هیچکدام
- 3 - اتموم های کاربنی که بین هم رابطه دو گانه را دارا اند، به کدام حالت هایبیریدیزیشن قرار دارند؟
الف - sp^3 ب - sp^2 ج - sp د - sp^3d^2
- 4 - نام مرکب $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ عبارت است از:
الف - Iso octane ب - 4-methyl-2-heptene ج - الف و ب د - هیچکدام
- 5 - رابطه سه گانه نسبت به رابطه دو گانه به..... اکسیدی می گردد.
الف - کندی ب - سرعت ج - یک سان د - اکسیدی نمی گردد
- 6 - یکی از محصول تعامل $CH_3-CH_2-OH \xrightarrow{H_2SO_4} + H_2O$ عبارت است از:
الف - $CH_2=CH_2$ ب - $CH \equiv CH$ ج - CH_3-CH_3 د - CO_2
- 7 - الکاین های دارای یک رابطه..... اند.
الف - سه گانه ب - دو گانه ج - یک گانه د - کواردینت
- 8 - فورمول عمومی C_nH_{2n} مربوط به کدام هایدروکاربن های ذیل است؟
الف - الکان ها ب - الکاین ها ج - سایکلو الکان ها د - ب و ج هر دو درست است
- 9 - نصب هلوجن ها بالای الکاین ها نسبت به اولفین ها به..... صورت می گیرد.
الف - مشکل و بطی ب - سرعت ج - به آسانی د - تعامل نمی کنند
- 10 - اگر پسوند yne به ارقام لاتین که تعداد اتموم های کاربن را افاده می کند، علاوه گردد، نام..... مربوطه آن حاصل می شود.
الف - الکان ها ب - الکین ها ج - الکاین ها د - سایکلو الکین ها
- 11 - از بین رفتن رنگ آب برومین تعامل توصیفی رابطه..... را نشان می دهد.
الف - چند گانه ب - یگانه ج - الف و ب هر دو د - هیچکدام
- 12 - محصول تعامل $CH_2-CH_2 + 2KOH \xrightarrow{(Alcohol)}$
الف - $2H_2O$ ب - $2KBr$ ج - $CH \equiv CH$ د - تماماً
- 13 - علت داشتن خاصیت تیزابی استلین مربوط به قطبیت بارز رابطه..... در مالیکول آن است.
الف - $C-C$ ب - $C-H$ ج - $C=C$ د - $C \equiv C$
- 14 - محصول تعامل $CH \equiv CH + H_2 \longrightarrow$ عبارت است از:

الف - $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ ب - $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ ج - $\text{CH} \equiv \text{CH}$ د - هیچکدام
 15 - درجه الکترونیگاتیویته کاربن دارای حالت sp را کدام یکی از ارقام ذیل نشان می دهد؟
 الف - 2.75 ب - 2.5 ج - 2.65 د - 2.3

سوالات تشریحی



- 1 - فورمول مالیکولی الکانی را دریافت نمایید که 0.63 گرم آن حاوی 0.07 گرم هیدروجن باشد.
- 2 - حالت هایبرید تمامی اتوم های کاربن را در مرکب $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH} = \text{CH}_2$ مشخص سازید.
- 3 - مرکبات ذیل را به اساس IUPAC نام گذاری نمایید:




- 4 - فورمول های ساختمانی مرکبات ذیل را تحریر دارید.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a- 1,2 -dichloro ethene | b- 2,3 - dimethyl -2-pentene |
| c - 1,3- dibromo cyclo hexene | d- Cis 3,4 dibromo -3-hexene |
| e- 4 -methyl 2-pentyne | f-2- pentyne |
| g-3-chloro-2-ethyl-1-pentyne | h-1,3-pentadiene |


- 5 - معادلات کیمیاوی ذیل را بادر نظر داشت قاعده مارکوف نیکوف تکمیل و توزین نمایید.



- 6 - در مور تعاملات تعویضی الکانین ها معلومات خود را تحریر دارید.
- 7 - کدام یکی از مرکبات ذیل ایزومیری سیس و ترانس را دارا بوده؟ آن را تحریر دارید.



مرکبات اروماتیک (Arenes)




در آغاز نیمهٔ دوم قرن 19 مرکباتی را اروماتیک می‌نامیدند که از مواد عطری طبیعی به دست می‌آمد. مرکبات اروماتیک با الیفاتیک‌ها خواص متفاوت دارند، در حال حاضر مفهوم اروماتیکی از لحاظ کیمیا هیچ ارتباطی به عطری بودن ندارد، مرکبات این فامیل در مالیکول خود حلقه‌یی کاربونی باثبات را با روابط مخصوص دارا می‌باشند. در این فصل راجع به مرکبات اروماتیک معلومات ارائه شده و با مطالعهٔ آن می‌دانید که ارومات‌ها کدام نوع مرکبات بوده؟ اولین مرکب این فامیل کدام است؟ کدام رول را در حیات ما دارا اند؟ چه طور می‌توان آن‌ها را به دست آورد؟

۶-۱: ساختمان بنزین


اولین مرکب ارومات ها بنزین بوده که در قرن 19 توسط فزیکدان انگلیسی به نام مایکل فارادی (Mycal Farady) از مرکبات عضوی استحصال گردید.

چندی بعد مرکبات مختلف اروماتیک در عطریات کشف گردید و معلوم شد که توسط تعاملات کیمیاوی مناسب می توان آن ها را به بنزین تبدیل کرد. در ابتدا این مرکبات به نام مشتقات بنزین و بعد از آن مرکبات اروماتیک یا معطر نامیده شده اند، زیرا اکثر آن ها بوی قوی و دل پذیر دارند. به اندازه بنزین که یک مرکب ساده اروماتیک است، دیگر مرکبات توجه علما را به طرف خود جلب ننموده بود؛ از این سبب علما برای بنزین فورمول های ساختمانی زیادی را پیشنهاد نموده اند که از جمله فورمول پیشنهادی کیکولی (1865) برای بنزین خیلی مناسب می باشد. مطابق به فورمول کیکولی بنزین عبارت از 1,3,5-سایکلو هگزاترین (1,3,5-cyclohexatriene) است که یک هایدروکاربن شش کاربنه حلقه یی با داشتن سه رابطه مزدوج می باشد:



این ساختمان ارزش یکسان تمامی اتوم های کاربن و هایدروجن و بعضی خصوصیات دیگر بنزین را توضیح می نماید؛ اما این فورمول نمی توانست توضیح نماید که چرا بنزین خواص هایدروکاربن غیر مشبوع را دارا نمی باشد؟ بنزین تعاملات مشخصه مرکبات غیر مشبوع را از خود نشان نمی دهد؛ یعنی آب برومین و محلول القلی پوتاشیم پرمنگنات را بیرنگ ساخته نمی تواند. به عوض تعامل جمعی، تعامل تعویضی را با برومین انجام داده؛ طوری که یک اتوم هایدروجن مالیکول بنزین توسط برومین تعویض گردیده، مرکب C_6H_5Br را تشکیل می دهد.

امکان تعاملات جمعی بنزین در شرایط خاص موجود بوده و از هایدروجنیشن آن در موجودیت کتلتست سایکلو هگزان حاصل می گردد:




از معادله فوق معلوم می شود که بنزین خواص غیر مشبوعی را از خود نشان می دهد؛ لکن در شرایط عادی این خاصیت ضعیف است. مقاومت حرارتی بنزین تا $900^\circ C$ است.

انکشاف نظریات الکترونی و نظریات میخانیک کوانت راجع به روابط کیمیاوی امکان توضیح خصوصیات مرکبات اروماتیکی را میسر ساخت، انرژی مالیکول بنزین را می توان به طریقه های مختلف تعیین کرد، نتایج آن ها نشان می دهد که مالیکول حقیقی بنزین دارای انرژی کمتر نسبت به 1,3,5-سایکلو هگزاترین است که روابط آن نشان داده است. گرمای احتراق مالیکول سایکلو هگزاترین $3453 KJ/mol$ است؛ اما گرمای احتراق مالیکول بنزین که تجربه نشان داده است، $2303 KJ/mol$ می باشد. هایدروجنیشن سایکلو هگزین با آزاد شدن انرژی صورت گرفته، در حالی که هایدروجنیشن

بنزین با جذب انرژی صورت می گیرد.


خواص کیمیاوی بنزین و مرکبات مشابه آن فوق العاده حیرت انگیز است، باوجودی که مرکبات بنزین غیر مشبوع بوده و مشابه به الکین ها و الکاین ها می باشند؛ اما تعاملات جمعی در این مرکبات به ندرت انجام شده و برعکس تعاملات تعویضی را به خوبی انجام می دهند؛ بنابراین مرکبات اروماتیک مستقل از مرکبات غیر مشبوع عادی بوده و خواص خاص آن ها مربوط به حلقه بنزین و مرکبات آن می باشد. فورمول جمعی بنزین (C_6H_6) بوده و نسبت به سایکلو هگزان (C_6H_{12}) 6 اتوم هایدروجن و نسبت به سایکلو هکزین 4 اتوم هایدروجن کمتر را دارا است. طول روابط در بنزین 140 پیکومتر و ساختمان آن دارای روابط در حالت ریزونانس است.

در مالیکول بنزین 6 الکترون اوربیتال های π را اشغال نموده، در اسکلیت کاربنی مالیکول اوربیتال های رابطه σ از تداخل مستقیم sp^2 - hybrid اوربیتال های اتوم های کاربن بایکدیگر و با اتوم های هایدروجن تشکیل گردیده است. شکل (6 - 1) طول رابطه ها؛ زوایای روابط و حالت ریزونانس را در مالیکول بنزین ارائه می دارد:




شکل (6 - 1)، الف - طول و زوایای روابط، ب - نمایش اوربیتال های در مالیکول بنزین:

چون هایدروکاربن های اروماتیک غیر مشبوع بوده؛ از این سبب آن ها را با پسوند ene مشابه الکین ها و پیشوند Ar مشتق از کلمه (Aromate) نامگذاری نموده اند؛ بنابراین نام سیستماتیک آن ها Arene است. مرکبات Arene علاوه بر شکل ساده بنزین، به صورت مرکبات چند حلقه یی نیز موجود بوده؛ به طور مثال: از اتصال دو و یا چندین حلقه بنزین با یکدیگر مرکبات مختلف حاصل می شود. نفتالین $C_{10}H_8$ و انتراسین $C_{14}H_{10}$ دو مرکب چندین حلقه یی بسیار مهم بوده که فورمول آن ها از حلقه بنزین و گروپ های $-C_2H_2-$ (ایتلین) تشکیل گردیده اند. درمورد خواص ارومات ها عالمی به نام هیوکل (Huckel) قاعده ایجاد نمود که قرار این قاعده، حلقه دارای خاصیت اروماتیک است که تعداد الکترون های پای آن به $(4n+2)$ مطابقت داشته باشد، در این فورمول n تعداد حلقه را نشان می دهد. مثال های سیستم اروماتیکی که دارای 10 و 14 الکترون های پای اند، عبارت اند از:













Anthracene



Naphthalene


در جدول (6 - 1) انواع مشتقات بنزین با نام‌های سیستماتیک و مروجه آن‌ها ارائه گردیده است. مرکبات مذکور از تقطیر ذغال سنگ حاصل می‌شوند:

جدول (6 - 1) انواع مشتقات بنزین با نامهای سیستماتیک و مروجه آنها


| موارد استعمال | نام مروجه | نام سیستماتیک | فرمول |
|--|-------------------------|----------------------------|---|
| تهیه پولیمیرها | فینول | هایدروکسی بنزین |  |
| جلای رنگ‌ها تهیه لاک | تولین | متایل بنزین |  |
| جلای رنگ‌ها و مواد حشره کش | اورتو زایلین | 1,2-Dimethyl Benzene |  |
| | میتا زایلین | 1,3- dimethyl Benzene |  |
| | پارا زایلین | 1,4 dimethyl Benzene | $CH_3 - \text{C}_6\text{H}_4 - CH_3$ |
| پولیمیرها را تشکیل می‌دهد | ستایرین | phenyl ethylene |  |
| کشنده کویه | Naphthalene | Naphthalene |  |
| | انتراسین | Antracine |  |
| برای جلوگیری از امراض | Di phenyl | Di phenyl |  |
| پولی میرها و مواد رنگه | انیلین | Amino Benzene | $H_2N - \text{C}_6\text{H}_5$ |
| | بنزویک اسید | Benzoic acid |  |
| | بنزالدیهاید | بنزالدیهاید |  |
| پودرهای رخت شویی در سال 1440 کشف گردید. | الکایل بنزین سلفونات | الکایل بنزسودیم سلفونات | $R - \text{C}_6\text{H}_4 - SO_3Na$ |

۶-۲: نامگذاری مرکبات اروماتیک

اکثر مرکبات اروماتیک نام‌های مروجه خود را حفظ نموده که مربوط به منشأ اصلی آن‌ها است؛ به طور مثال: Toluene ($C_6H_5-CH_3$) سرش درختان از نوع (Baumde Tolu) که در آمریکای جنوبی یافت می‌شود، به دست آمده است و حال آن که نام سیستماتیک آن عبارت از Methyl benzene است؛ زیرا یکی از اتم‌های هیدروجن مالیکول بنزین توسط بقیه $-CH_3$ تعویض گردیده است. در صورتی که چندین بقیه‌ها، اتم‌های هیدروجن مالیکول بنزین را تعویض نموده باشند، مرکبات حاصل شده دارای ایزومیری‌های مختلف بوده که مثال آن را می‌توان دای میتایل بنزین (Di methyl benzene) ارائه کرد:



(O - Xylene)



(M - Xylene)



(P - Xylene)



1,2 - dimethylbenzene

1,3 - dimethylbenzene

1,4 - dimethylbenzene

سه ایزومیری فوق نام‌های مروجه (Xylene) را دارا بوده؛ زیرا این‌ها از تقطیر چوب حاصل شده و نام یونانی چوب (xulon) است و پیشوند‌های، Meta Ortho و Para نیز کلمه‌های یونانی قدیم بوده که به ترتیب به معنی پهلوی با پهلوی، بعد از آن و مقابل می‌باشد. در صورتی که هردو معاوضه‌ها دارای ترکیب مختلف هم باشند همین پیشوند‌ها را در نام آن‌ها علاوه می‌نمایند.


اگر چندین اتم هیدروجن حلقه بنزین به گروپ‌های مختلف تعویض گردیده باشد، نامگذاری سیستماتیک آن مطابق رهنمایی فوق صورت می‌گیرد؛ به طور مثال:



۶-۳: تعاملات هیدروکاربن‌های اروماتیک

۶-۳-۱: تعاملات جمعی


باوجودی که تمام ارین‌ها (Arenes) از نوع هیدروکاربن‌های غیر مشبوع اند؛ اما میل ترکیبی را به صورت جمعی از خود نشان نمی‌دهند. در شرایط خاص، در حرارت $200^\circ C$ و در موجودیت کنتست Pt یا Ni و فشار بلند می‌توان سه مالیکول هیدروجن را به بنزین علاوه و Cyclo Hexane را به دست آورد:



در این صورت سه رابطه π بنزین قطع می گردد. این رابطه ها در شکل (6 - 1) ارائه شده است که به شکل ریزونانس قرار دارند و کثافت ابر الکترونی π بالای تمام اتم های کاربن یک سان پخش می گردد. به همین دلیل تعامل جمعی در حلقه بنزین به مشکل صورت می گیرد. سایکلو هکزان بر خلاف بنزین مسطح نبوده و ساختمان فضایی چوکی مانند را دارا و هر 6 اتم کاربن ساختمان چهاروجهی را دارا اند.


تعاملات جمعی بنزین با کلورین

مطابق به شکل (6 - 2) در بالون پُر از گاز کلورین چند قطره بنزین را علاوه نموده و سپس آن را توسط سرپوش چوبی و پنبه بسته و تکان دهید تا تمام بنزین علاوه شده به بخار تبدیل گردد، در عدم موجودیت نور تعامل صورت نگرفته در صورتی که بالون در معرض نور قرار گیرد، تعامل آغاز یافته و رنگ سبز کلورین از بین رفته و دود سفید رنگ در داخل بالون به ملاحظه می رسد. تجزیه و تحلیل دود حاصل نشان می دهد که تعامل جمعی بنزین با کلورین صورت گرفته و معادله تعامل آن قرار ذیل است:



مرکب حاصله (1,2,3,4,5,6 - Hexa Chloro Cyclohexane) بوده و ساختمان آن مشابه


سایکو هکزان و چوکی مانند می باشد. شکل ذیل پروسه تعامل فوق الذکر را نشان می دهد:



شکل (6 - 2) تعامل بنزین با کلورین

۶-۳-۲: تعاملات تعویضی در ارومات ها

در الکین ها و الکاین ها تعاملات جمعی نسبت به تعاملات تعویضی به آسانی صورت می گیرد؛ به طور مثال: الکین ها به آسانی در دو کاربن دارنده رابطه جفته خود برومین را نصب و به هالاید الکان ها (دای بروموالکان) مبدل می گردد؛ اما در حلقه بنزین، فلورین اتم های هایدروجن را تعویض نموده و این تعویض هم در موجودیت کتلت ها (FeF_3) صورت می گیرد:




تعامل بنزین با فلورین نوع تعامل انفجاری بوده؛ اما کلورینشن بنزین در موجودیت اسید لیویس ($AlCl_3, FeCl_3$) صورت می گیرد.


تعویض اتوم‌های هایدروجن مالیکول بنزین توسط بقیه الکایل و دیگر بقیه‌ها به طریقه عالم کیمیا به نام فریدل چارلیز (friedel Charles) و جمز کرفت (James Craft) در سال 1832 – 1899م صورت می‌گیرد که مثال آن‌ها قرار ذیل است:

۱ – نایتریشن ارومات‌ها

داخل ساختن گروپ نایترو (NO_2) در حلقه‌های اروماتیک را به نام تعامل نایتریشن (Nitration) یاد می‌کنند. تعامل مذکور توسط مخلوط تیزاب گوگرد غلیظ و تیزاب شوره غلیظ انجام می‌گردد، عامل نایتریشن کننده آیون نایترو NO_2^+ است که در این مخلوط قرار ذیل تشکیل می‌گردد:





در مرحله بعدی کتیون نایترو ساحة ابر الکترونی رابطه‌های π حلقه اروماتیک را مورد حمله قرار داده که در نتیجه آن اولاً پای کامپلکس و بعد از آن سگما کامپلکس با داشتن رابطه کوولنت بین گروپ نایترو و اتوم کاربن حلقه بنزین حاصل می‌شود. در مرحله اخیر اتوم هایدروجن حلقه ارومات‌ها جدا شده و با HSO_4^- تعامل نموده، دوباره H_2SO_4 تشکیل می‌گردد:




۲ – هلوژینشن ارومات‌ها


هلوژینشن هسته بنزین را به کمک هلوجن‌ها در موجودیت کتلت‌ها انجام می‌دهند، که بیشتر به حیث کتلت از هالیدهای الومینیم و آهن از قبیل FeBr_3 , FeCl_3 , AlBr_3 , AlCl_3 و غیره استفاده می‌کنند. کتلت‌ها با عمل خود پارچه الکتروفیل را در نتیجه قطبی ساختن رابطه اتوم‌های هلوجن به وجود می‌آورند؛ به طور مثال: در الومینیم کلوراید اتوم الومینیم شش الکترون را در قشر ولانسی خود حاصل نموده؛ لکن اکتیت آن پوره نمی‌باشد، به خاطر تکمیل اکتیت خود دو الکترون اتوم کلورین مالیکول کلورین را به طرف خود کش نموده؛ در نتیجه کشش الکترونی اتوم دومی مالیکول کلورین قسماً مثبت چارج گردیده و خاصیت الکتروفیل را از خود نشان می‌دهد:



سلسله ذیل فعالیت کیمیاوی هلوجن‌ها را نشان می‌دهد:




۳- سلفونیشن (Sulphonation): تعویض اتم‌های دوجن هسته بنزین به گروه سلفونیک را به نام سلفونیشن یاد می‌کنند. تعامل سلفونیشن به گونه معمولی با حرارت دادن هایدروکاربن‌های اروماتیک در موجودیت تیزاب گوگرد غلیظ صورت می‌گیرد:




Benzenesulphonic acid

تعامل سلفونیشن برعکس تعامل هلوژنیشن رجعی بوده و هایدرولیز آن صورت می‌گیرد:




۴- الکیلشن (Alkylation): نصب گروه الکیل را بالای حلقه بنزین و هومولوگ آن به نام الکیلشن یاد می‌گردد: الکیلشن به دو طریق انجام می‌گردد:



الف - توسط عمل الکیل هالیدها بالای بنزین در موجودیت کتلت الومینیم هالیدهای بدون آب، به طریقه Friedel-Crafts:




ب - توسط اولفین‌ها نیز الکیلشن اروماتیک امکان پذیر است؛ این تعامل در موجودیت کتلت الومینیم کلوراید صورت می‌گیرد:



۵- اسایلشن ارومات‌ها: عبارت از داخل نمودن گروه اسایل ($\text{R}-\text{C}(=\text{O})-$) در حلقه ارومات‌ها بوده و در نتیجه این تعاملات کیتون‌ها تشکیل می‌گردد. این سنتیز به نام اسایلشن به طریقه فریدل - کرفت یاد می‌گردد. ماده اسایل کننده‌ها را اسید کلوراید‌ها و یا اسید انهایدراید‌ها در موجودیت الومینیم کلوراید بدون آب تشکیل می‌دهد. میخانیکیت تعامل قرار ذیل است:




۶ - اکسیدیشن ارومات‌ها: ارومات‌ها در مقابل اکسیدانت‌ها مقاوم بوده، اکسیدانت‌های از قبیل نایتریک اسید، محلول کرومیک اسید، محلول پوتاشیم پر منگنات و محلول هیدروجن پر اکساید در شرایط عادی بالای بنزین تأثیر نمی نمایند. ثبات ارومات‌ها در مقابل اکسیدانت‌های قوی نسبت به پارافین‌ها بیشتر است. در اثر عمل آکسیجن هوا در موجودیت کتلتست ونادیم پنتا اکساید (V_2O_5) به حرارت بلند ($400^\circ C$) از بنزین ملیک آن‌هایدراید حاصل می‌گردد:





Maleic anhydride

در اثر عمل اکسیدانت‌ها بالای هومولوگ‌های بنزین، زنجیر جانبی الکیل آن‌ها در معرض اکسیدیشن قرار گرفته، تخریب می‌شود. تنها کاربن نزدیک به حلقه به کاربوکسیل تبدیل می‌شود (تمامی زنجیر مرتبط به حلقه بنزین به کاربوکسیل تبدیل می‌گردد):




نفتالین Naphthalene

فورمول مالیکولی نفتالین $C_{10}H_8$ بوده، این مرکب در سال 1819 در صمغ قیر زغال سنگ کشف گردید و ساختمان آن در سال 1858 توسط وسکرسینسکی (A.A. Voskresensky) مشخص گردید. نفتالین ماده جامد کرسطالی با بوی مشخص بوده، درجه ذوبان آن $80^\circ C$ و درجه غلیان آن $218^\circ C$ است. نفتالین بی‌رنگ بوده و به آسانی متصاعد می‌گردد و حتا به حرارت عادی تبخیر می‌نماید. نفتالین در آب حل نگردیده؛ اما در محلول‌های عضوی به خوبی حل می‌گردد. نفتالین را به حیث ماده ضد کویه استعمال می‌نمایند. اسکلیت کاربنی مالیکول نفتالین متشکل از دو هسته بنزین بوده که توسط دواتوم کاربن مجاور مشترک متراکم شده است. در مالیکول نفتالین مانند بنزین نه رابطه جفته و نه رابطه یگانه مطلق وجود دارد. الکترون‌های پای در حالت دیلوکالیزیشن در تمام حلقه قرار دارد. ساختمان و مودل نفتالین قرارذیل است:



شکل (3-6) مودل نفتالین و فورمول آن

در مالیکول نفتالین تمام اتوم‌های کاربن هم ارزش نبوده، کاربن‌های الفا (α - Carbons)




با موقعیت‌های ۸، ۵، ۴، ۱ و کاربن‌های بیتا (β - Carbons) با موقعیت‌های ۷، ۲، ۳، ۶ از هم فرق دارند.


تحقیقات رادیوگرافی کرسنال‌های نفتالین نشان می‌دهد که مالیکول نفتالین دارای ساختمان مسطح بوده و طول تمامی رابطه‌های کاربن - کاربن یک قیمت بین البینی رابطه یگانه و دوگانه را دارا است.

تعاملات تعویضی نفتالین

سلفونیشن: یکی از مشخصات عمده نفتالین عبارت از تعامل سلفونیشن آن است، نظر به شرایط تعامل می‌تواند الفا - نفتالین سلفونیک اسید و یا بیتا - نفتالین سلفونیک اسید تشکیل می‌گردد:



اکسیدیشن نفتالین: نفتالین نسبت به بنزین به آسانی اکسیدی شده که در این عملیه یکی از حلقه‌های آن تخریب گردیده، کاربن‌های الفای آن به گروپ کاربوکسیل تبدیل می‌گردد و در نتیجه تیزاب دوقیمته فتالیک اسید تشکیل می‌شود:




Naphthalene

Phthalic acid

انتراسین (Anthracene)

فورمول مالیکولی انتراسین $C_{14}H_{10}$ بوده، این مرکب در صمغ قیر و در روغن انتراسین یافت می‌شود که از آن به طریقه تبلور جدا می‌گردد. انتراسین را به طریقه تصعید جدا می‌نمایند، انتراسین خالص یک جسم جامد کرسنالی بی رنگ بوده و دارای فلوروسنس لاجوردی می‌باشد. درجه ذوبان آن $217^{\circ}C$ و درجه غلیان آن $354^{\circ}C$ است. انتراسین در آب غیر منحل بوده و در بنزین داغ به خوبی حل می‌گردد. انتراسین عبارت از هایدروکاربن اروماتیک کثیر الهسته‌یی بوده که دارای سه هسته بنزین متراکم شده خطی بنزین نیز می‌باشد و ساختمان هسته‌ها مسطح است. فورمول ساختمانی اسکلتی آن قرار ذیل است:




درمالیکول انتراسین تمام اتوم‌های کاربن مانند مالیکول نفتالین عین موقعیت را اشغال نمی‌نماید. موقعیت‌های الفا (۱، ۴، ۵، ۸)، بیتا (۲، ۳، ۶، ۷) و میزو (۹، ۱۰) (-9، -10) بوده که در انتراسین این موقعیت‌ها از هم فرق می‌شوند. به این اساس مشتق یک تعویضه انتراسین دارای ایزومیر الفای، بیتا و

میزو است؛ همچنان در فورمول انتراسین تساوی کامل رابطه‌ها موجود نیست.


خواص کیمیاوی انتراسین: خواص کیمیاوی انتراسین مشابه به خواص کیمیاوی نفتالین و بنزین بوده؛ اما نسبت به آن‌ها فعال‌تر می‌باشد. انتراسین در معرض تعاملات تعویضی (هلوژنیشن، نایتریشن، سلفونیشن) قرار گرفته، خواص اروماتیکی را از خود نشان داده و تعاملات جمعی نیز در آن به آسانی صورت می‌گیرد. موقعیت 9- و 10- (meso) با داشتن فعالیت کیمیاوی زیاد از دیگر موقعیت‌ها فرق داشته؛ بنابراین تعامل تعویضی و تعامل جمعی در هسته وسطی صورت می‌گیرد و در نتیجه تعامل جمعی در موقعیت‌های 9- و 10- هر دو حلقه جانبی سیکستیت (Sextet) اروماتیکی را به خود گرفته و ثبات را حاصل می‌نمایند.

تعامل تعویضی انتراسین

۱ - هلوژنیشن: کلورین و برومین به حرارت صفر درجه سانتی گراد ابتدا در موقعیت‌های 9 و 10 نصب گردیده، دای کلورو و یا دای برومو را تولید می‌کند که بعداً در اثر حرارت دادن خفیف هایدروجن هالاید از این محل‌ها جدا شده و محصول تعویضی یعنی 9- کلورو انتراسین تشکیل می‌گردد:




۲ - نایتریشن انتراسین: در اثر عمل تیزاب شوره ابتدا محصول جمعی بی ثبات تولید شده و بعد از جدا شدن آب محصول تعویضی انتراسین یعنی 9- نایترو انتراسین تشکیل می‌گردد:





خلاصه فصل ششم


- * مرکبات فامیل اروماتیک در مالیکول خود کاربن‌های حلقه‌یی باثبات را با روابط مخصوص دارا می‌باشند.
- * اولین مرکب ارومات‌ها بنزین بوده که در قرن 19 توسط فزیکدان انگلیسی به نام مایکل فارادی (Mycal Farady) از مرکبات عضوی استحصال گردید.
- * بنزین تعاملات مشخصه مرکبات غیر مشبوع را از خود نشان نمی‌دهد؛ یعنی آب برومین و محلول القلی پوتاشیم پرمنگنات را بیرنگ ساخته نمی‌تواند. به عوض تعامل جمعی، تعامل تعویضی را با برومین انجام داده طوری که هایدروجن‌های مالیکول بنزین توسط برومین تعویض گردیده، مرکب C_6H_5Br را تشکیل می‌دهد.
- * خواص کیمیاوی بنزین و مرکبات مشابه آن فوق العاده حیرت انگیز است، باوجودی که مرکبات بنزین غیر مشبوع بوده و مشابه به الکین‌ها و الکاین‌ها می‌باشند؛ اما تعاملات جمعی در این مرکبات به ندرت انجام شده و برعکس تعاملات تعویضی را به خوبی انجام می‌دهند.
- * هایدروکاربن‌های اروماتیک غیر مشبوع بوده؛ از این سبب آن‌ها را با پسوند ene مشابه الکین‌ها و پیشوند Ar مشتق از کلمه (Aromate) نامگذاری نموده اند؛ بنابراین نام سیستماتیک آن‌ها Arene است.
- * در مورد کرکتر ارومات‌ها عالمی به نام هیوکل (Huckel) قاعده ایجاد نمود که قرار این قاعده حلقه دارای خاصیت اروماتیک است که تعداد الکترون‌های پای آن به $(4n+2)$ مطابقت داشته باشد.
- * در الکین‌ها و الکاین‌ها تعاملات جمعی نسبت به تعاملات تعویضی به آسانی صورت می‌گیرد؛ به طور مثال: الکین‌ها به آسانی در دو کاربن دارنده رابطه جفته خود برومین را نصب و به هالاید الکان‌ها (دای بروموالکان) مبدل می‌گردد؛ اما در حلقه بنزین، فلورین اتوم‌های هایدروجن را تعویض نموده و این تعویض هم در موجودیت کتلتست ها (FeF_3) صورت گرفته، اتوم‌هایدروجن را در حلقه بنزین تعویض می‌نمایند.
- * ارومات‌ها در مقابل اکسیدانت‌ها مقاوم بوده. اکسیدانت‌ها از قبیل نایتریک اسید، محلول کرومیک اسید، محلول پوتاشیم پرمنگنات و محلول هایدروجن پر اکساید در شرایط عادی بالای بنزین تأثیر نمی‌نمایند. ثبات ارومات‌ها در مقابل اکسیدانت‌های قوی نسبت به پارافین‌ها بیشتر است
- * در مالیکول نفتالین تمام اتوم‌های کاربن هم ارزش نبوده کاربن‌های الفا (α - Carbon) با موقعیت‌های 1، 4، 5، 8 و کاربن‌های بیتا (β - Carbon) با موقعیت‌های 2، 3، 6 از هم فرق دارد.
- * انتراسین عبارت از هایدروکاربن اروماتیک کثیر الهسته‌یی بوده که دارای سه هسته بنزین متراکم شده خطی بنزین نیز می‌باشد و ساختمان هسته‌ها مسطح است. فورمول ساختمانی اسکلتی آن قرار ذیل است:



سؤالات و تمرین فصل ششم

سؤالات چهار جوابه

- 1 - اولین مرکب ارومات ها یعنی بنزین توسط کدام شخص از مرکبات عضوی استحصال گردید؟
الف - مایکل فارادی ب - Mycal Farady ج - کیکولی د - الف وب هردو
- 2 - کدام یکی از مرکبات ذیل اروماتیک است؟



ج



ب



الف

- 3 - کدام یک از مطالب زیر در مورد مالیکول بنزین درست است؟

- الف - حاوی 12 اتوم هایدروجن است ، ب - رابطه اتوهای کاربن - کاربن ساده است
ج - رابطه اتوم های کاربن - کاربن نه یگانه و نه دوگانه است. د - یک ساختمان حلقه ای نیست.
4 - مقاومت حرارتی بنزین چقدر است؟

الف - تا 700°C ب - تا 1900°C ج - تا 900°C د - تا 920°C

- 5 - در مالیکول بنزین چند الکترون اوربیتال های π را اشغال نموده است؟

الف - 62 الکترون ب - 6 الکترون ج - 12 الکترون د - 16 الکترون

- 6 - حلقه دارای خاصیت اروماتیک است که تعداد الکترون های پای آن به مطابقت داشته باشد

الف - $(4n+2)$ ب - $(2n+4)$ ج - $(3n+2)$ د - هیچ کدام

- 7 - در حرارت 200°C و موجودیت کتلست Pt و Ni و فشار بلند می توان سه مالیکول هایدروجن را به بنزین علاوه و را به دست آورد:

الف - Cyclo Hexene ب - Cyclo Hexane ج - Hexane د - هیچ کدام

- 8 - داخل ساختن گروپ نایتر و $(-\text{NO}_2)$ در حلقه های اروماتیک را به نام تعامل یاد می کنند.

الف - نایتریشن ب - Nitration ج - الف وب هردو د - هیچ کدام

- 9 - نصب گروپ الکیل بالای حلقه بنزین و هومولوگ آن به نام یاد می گردد:

الف - هایدریشن ب - الکیلشن ج - Alkyltion د - ب وج هردو

- 10 - کدام یکی از جملات ذیل در مورد نفتالین صحیح است؟

- این مرکب دارای فورمول مالیکولی C_{10}H_8 است.

- مرکب مذکور با هایدروجن به حرارت اطاق تعامل می نماید.


- یک مرکب الیفاتیک است.

الف - تنها جزاول ب - تنها جز دوم ج - تنها جز سوم د - جزاول و دوم

سؤالات تشریحی

1 - در مورد چگونگی روابط در مالیکول بنزین توضیحات دهید.


2 - مرکبات زیر را نامگذاری نمایید:




ج




ب




الف



و



هـ



د

3 - فورمول‌های ساختمانی مرکبات اروماتیک زیر را رسم کنید:

a) nitro benzene

b) m-chlorophenol

c) p-chlorophenol

d) o-ethyl nitro benzene) e) 1-bromo-2-methyl -3- phenyl cyclohexane

4 - فورمول ساختمانی ایزومیری‌های مرکب اروماتیک دارنده فورمول مالیکولی C_8H_{10} را تحریر نمایید.

5 - تعاملات احتراقی (Combustion) مرکبات زیر را تحریر دارید:

الف - بنزین ب - تلوین ج - نفتالین د - انتراسین

6 - کدام یکی از تعاملات زیر بنزین نوع تعاملات ریدوکس است؟ در مورد تشریحات دهید:

الف - نایتریشن ب - سلفونیشن ج - برومینیشن د - الکالیشن

7 - چندلیتر هایدروجن ضرورت است تا 15.6 گرم بنزین را مشبوع سازد؟ (در شرایط STP)

8 - به اساس میتود تعامل فریدل - کرفت 26.5 گرم الکال بنزین از 0.25 مول بنزین حاصل شده

است، ساختمان مشتق حاصل بنزین را تعیین کنید.


9 - بنزین را با مرکباتی تعامل دهید که بیوتایل بنزین والیل بنزین حاصل گردد.

10 - 750 ملی لیتر محلول $NaOH$ همراه با سودیم بنزویت تعامل نموده، به مقدار 23.4 گرم بنزین

تولید می‌گردد، مولاریتی سودیم هایدروکساید را در یافت کنید.

فصل هفتم


الکایل هلايدها



اگر اتوم‌های هایدروجن هایدروکاربن‌ها توسط یک ویاجندین اتوم هلوجن‌ها تعویض گردد، مرکباتی حاصل می‌گردد که به نام هلايدها یادشده ومشتقات هلوجنی هایدوکاربن‌ها می‌باشند. این مرکبات رول اساسی را در حیات انسان‌ها و در عرصهٔ صنعت دارا می‌باشند. فورمول‌های عمومی آن‌ها $R-X$ است. در این فصل این مرکبات را تحت مطالعه قرار داده و می‌آموزید که الکایل هلايدها چه نوع مرکبات عضوی بوده و کدام خواص را دارا می‌باشند؟ چه طور می‌توان آن‌ها را به دست آورد؟ در کدام عرصه‌های طبابت و صنعت به کار برده می‌شوند؟ منابع طبیعی آن‌ها کدام مواد طبیعت اند؟ چطور می‌توان این مرکبات را نامگذاری کرد؟ با مطالعهٔ این فصل با الکایل هلوجنیدها آشنا و کاربرد آن‌ها را در عرصه‌های مختلف خواهید آموخت.

۷-۱: الکیل هالیدها


الکیل هالیدها مشتقات هلوجنی هایدروکاربن ها بوده و از تعویض یک یا چندین اتوم های هایدروجن هایدروکاربن ها حاصل شده اند. تاحال مرکبات هلوجنی فلورین، کلورین، برومین و آیودین شناخته شده اند. هالیدها هایدروکاربن ها می توانند، مونوهالیدها و یا پولی هالیدها باشند. مرکبات عضوی هلوجن دار در طبیعت وافر بوده و در صنعت امروزی استعمال زیاد دارند. در مواد طبیعی یافت شده که به هزارها مرکب عضوی هلوجن دار در الجی ها و و دیگر اجسام حیة بحری موجود اند؛ بطور مثال در الجی های قهوه بی اقیانوس ها موجود بوده و در موقع آتش سوزی جنگلات و در آتش فشان ها نیز تولید می شوند. از این مرکبات به حیث محلول ها در صنعت و به حیث ادویه سرما خورده گی استفاده می گردد. برای کلورو ایتلین در صنایع الکترونیکی استعمال زیاد دارد. بعضی مرکبات الکیل هالیدها قرار ذیل اند:





ترای کلوروایتلین محلول خوب بوده، هلو تان ماده بی هوشی انستیزیک می باشد.

۷-۱-۱: نامگذاری الکیل هالیدها

فورمول عمومی الکیل هالیدها $C_nH_{2n+1}X$ بوده که در این فورمول X ممکن I, Br, Cl, F باشد، نام گذاری اشتقاقی یا رادیکالی الکیل هالیدها طوری است که ابتدا نام رادیکال الکیل ذکر شده و به تعقیب آن هلوجن به شکل صفت با پسوند *ide* تحریر می گردد؛ بطور مثال:




الکیل هالیدها نیز به هالیدهای اولی (primary)، دومی (secondary) و سومی (tertiary) نظر به اینکه هلوجن به کدام نوع اتوم کاربن ارتباط دارد، تقسیمات گردیده و این کلمات را در ابتدای نام آن ها علاوه می کنند؛ به طور مثال:



به اساس سیستم IUPAC نام گذاری الکیل هالیدها طوری است که طولترین زنجیر کاربنی را به حیث زنجیر اصلی قبول می نمایند. در صورت موجودیت رابطه دو گانه یا سه گانه، زنجیر اصلی باید شامل آن باشد.

نمبر گذاری را از همان کاربن انجام زنجیر شروع می نمایند که معاوضه هلوجن به آن نزدیک باشد. باید یادآور گردید که انشعاب زنجیر کاربنی نیز در این مرکبات در نظر گرفته شده و نام بقیه ها و گروپ وظیفوی هالید طوری ذکر می گردند که حروف اول نام معاوضه ها به ترتیب الفبای انگلیسی در نظر گرفته شود؛ بطور مثال:




2-bromo-5-methyl hexane

نباید 5-Bromo-2-methyl hexane نام گذاری شود.


تبصره

در صورتیکه تعداد عین هلوجن بیشتر از یک معاوضه باشند، تعداد ارقام شان با پیشوندهای Tri، Di، Tetra و غیره مشخص می گردند.

اگر ترکیب هلوجن ها در مرکب مختلف باشند، نام آنها به ترتیب حروف الفبای انگلیسی در نامگذاری مرکب شان ذکر می گردند؛ به طور مثال:



1-Bromo-3-Chloro-4-methyl Pentane






2,3-Di Chloro -4-Methyl Hexane

مشق و تمرین کنید



1 - الکیل هالیدهای ذیل را به اساس رادیکالی و آیوپک نام گذاری نمایید:





2 - فورمول ساختمانی مرکبات ذیل را تحریر دارید:

الف - 2-chloro 3,3-dimethyl hexane

ب - 1,1-Di bromo -4-iso propyl cyclo hexane


۷-۱-۲: استحصال الکیل هالیدها

1 - از هلوجنیشن مستقیم الکان‌ها می‌توان الکیل کلوراید والکیل بروماید را به دست آورد، این تعاملات را به نام Chlorination و Bromination یاد می‌کنند که به صورت رادیکالی صورت می‌گیرد و دارای اهمیت صنعتی می‌باشد، مرکبات مختلف الکیل هالیدها از آن تشکیل گردیده و به واسطه تقطیر از هم جدا می‌گردند. Chlorination الکان‌ها به سرعت صورت گرفته و حرارت لازم 300°C است:




در لابراتوار الکیل هالیدها را طور ذیل استحصال می‌نمایند:

2 - الکیل‌ها با هایدروجن هالیدها تعامل نموده در نتیجه الکیل هالید و آب را تشکیل می‌دهند؛ در این عملیه گاز خشک هایدروجن هالید را از الکیل عبور می‌دهد:





مثال‌ها:




n - Propylalcohol

n - Propyl bromide



1 - Phenyl ethanol


1 - Bromo - 1 - Phenyl ethane





Ethyl alcohol

Ethyl iodide


3 - از تعاملات جمعی هایدروجن هالیدها با الکین‌ها و الکاین‌ها نیز الکیل هالیدها حاصل می‌گردند. تعامل هایدروجن هالیدها با الکین‌های با زنجیرهای طویل قاراقاعده مارکوف نیکوف صورت گرفته؛ طوریکه در الکین‌ها هایدروجن بالای آن کاربن دارنده رابطه دوگانه نصب می‌گردد که تعداد هایدروجن آن زیاد باشد:




4 - از تعاملات جمعی هلوجن‌ها با الکین‌ها و الکاین‌ها الکیل هالیدها به دست می‌آیند:



مثال







5- از تعامل ایترها با هیدروجن، الکایل هالیدها و الکول تشکیل می گردد:




مشق و تمرین کنید:

1- معادلات ذیل را تکمیل و توزین نمایید:



2 - تمامی مراحل هلو جانشین میتان را بنویسید:



۷-۱-۳: خواص فیزیکی الکیل هالیدها

الکیل هالیدهای که کتله مالیکولی شان بزرگتر است؛ نسبت به الکیل هالیدهای که عین تعداد کاربن را در بقیه الکیل خود دارند، دارای نقاط غلیان بلندتر اند؛ به این اساس نقطه غلیان الکیل هالیدها از فلورین به طرف آیودین به ترتیب بلند شده می رود؛ به طور مثال: نقطه غلیان میتایل کلوراید $24^\circ C$ ، میتایل بروماید $4^\circ C$ و میتایل آیوداید $43^\circ C$ است.


با وجودی که الکیل هالید مرکبات قطبی اند؛ اما با آن هم در آب غیر منحل هستند؛ زیرا تشکیل رابطه هایدروجنی را کرده نمی توانند. اینها در محلول های عضوی از قبیل هایدروکاربن ها، الکل ها و اتر منحل اند.

اکثر مشتقات هلو جنی هایدروکاربن ها بی رنگ و یا دارای رنگ زرد بوده و دارای بوی مخصوص می باشند.

مشتقات آیودین، برومین و پولی کلورین الکان ها کثافت بلند تر را نسبت به آب دارا اند.


۷-۱-۴: خواص کیمیاوی الکیل هالیدها

اتوم هلو جن در مشتقات هایدروکاربن ها از جمله الکیل هلو جنیدها نسبت به اتوم کاربن الکترونیگاتیف بوده و رابطه کاربن - هلو جن قطبی می باشد:




تعامل کننده دوست دار هسته (Nucleophilic) مشتق هلو جن را در هالیدها مورد حمله قرار داده و با اتوم کاربنی که کثافت ابر الکترونی در آن کم است، رابطه برقرار نموده و از مالیکول هلو جن را بی جا می سازد و در نتیجه اتوم هلو جن به بقیه نوکلئوفیلیک تعویض می گردد. این نوع تعامل را به نام تعاملات تعویضی نوکلئوفیلی (nucleophilic substitution) یاد می کنند. و به S_N افاده می شود.

تعاملات تعویضی نوکلئوفیلی می‌توانند به دو میخانیکیت صورت گیرد که به نام های S_N2 (bimolecular nucleophilic substitution) و تعاملات تعویضی S_N1 (unimolecular nucleophilic substitution) یاد می‌شوند. اعداد مالیکولی بودن تعامل تعداد ذراتی را نشان می‌دهند که در تعامل در مرحله سرعت تعامل شرکت می‌نمایند. شکل عمومی تعامل (bimolecular) را می‌توان چنین ارایه کرد:




در این تعامل مرحله سرعت تعامل هر دو مواد تعامل کننده شرکت می‌ورزد و اگر غلظت‌های آن‌ها نزدیک یکدیگر باشند، تعامل به شکل S_N2 علامه گذاری شده و سرعت تعامل آن متناسب به غلظت هر دو ماده تعامل کننده است.

تعامل بای مالیکولی هایدرولیز الکیل هالیدها عملیه یک مرحله با تشکیل کامپلکس انتقالی (Transtional complex) یا حالت انتقالی (Transtionalstate) است؛ مثال این نوع تعامل را می‌توان هایدرولیز میتایل بروماید ارایه کرد، این تعامل نوع نوکلئوفیلیک بوده؛ زیرا آب جوهره الکترون آزاد دارد:




میخانیکیت تعامل:




نزدیکی آیون هایدروکساید به اتوم کاربن تنها از سمت مخالف اتوم برومین امکان پذیر است. نزدیک شدن آیون هایدروکساید به اتوم کاربن و دور شدن برومین و تبدیل آن به آیون برومین همزمان صورت می‌گیرد. چارج منفی در کامپلکس انتقالی بین گروپ‌های نوکلئوفیل که شامل وجدامی گردند، تقسیم می‌شود.

انجام تعامل S_N2 نزدیک شدن بقیه نوکلئوفیل به مالیکول الکیل هالیدها دارای اهمیت می‌باشد. الکیل هالیدهای اولی دارنده زنجیر نارمل نسبت به الکیل‌های دومی به آسانی تعامل می‌کند. اسکلیت کاربنی منشعب در الکیل هالیدها مانع نزدیک شدن معاوضه نوکلئوفیل می‌گردد. سلسله الکیل هالیدها را که سرعت تعامل تعویضی نوکلئوفیل S_N2 در آن‌ها کم می‌شود، در زیر ملاحظه نماید:




تعامل مونو مالیکولی در دو مرحله صورت می‌گیرد که قرار ذیل است:


مرحله اول آن را آیونایزیشن مواد تعامل کننده و تشکیل کرب کتیون را نشان می‌دهد:




مرحله دوم آن را عمل کرب کتیون بالای بقیه نوکلئوفیل تشکیل می‌دهد:




سرعت تعامل مربوط به غلظت مواد تعامل کننده بوده و به S_N1 افاده می شود. تعامل تعویضی به شکل S_N1 در محلول های قطبی خوبتر صورت می گیرد و در محیط قلیوی زیاد تر امکان پذیر است. این مرحله تعامل را در مثال Tertiary بیوتایل کلوراید سومی قرار ذیل مطالعه می نماییم: مرحله اول تشکیل کرب کتیون بیوتایل سومی:




در مرحله دوم تعامل بین کرب کتیون و آیون هایدروکساید صورت می گیرد:




نظر به قانون عمومی سرعت تعامل چند مرحله ای را آن مرحله تعیین می کند که به کندی صورت گیرد؛ به طور مثال: در تعامل فوق سرعت تعامل را مرحله اول تعیین می کند. هر قدر که بقیه الکایل بالای اتوم کرب کتیون زیاد باشد به همان اندازه کتیون با ثبات بوده و تعامل به میخانیکیت S_N1 امکان پذیر است. در سلسله ذیل سمت تغییر سرعت تعاملات S_N1 و S_N2 نشان داده شده است:



1 - تعامل الکایل هالیدها با امونیا: محصول این تعامل امین ها اولی و هایدروجن هالید است:





مثال:



Ethyl chloride


Ethyl amine

2 - تعامل الکایل هالیدها با نمک های عضوی: الکایل هالیدها با نمک ها عضوی تعامل نموده، ایسترها را تولید می نمایند:





مثال:

3 - دی هایدرو هلو جینشن (Dehydrohalogenation) الکایل هلایده‌ها




مثال:




2-Bromo-2-methylbutane

2-Methyl-2-Butene یا 29%
2-Methyl-1-Butene یا 71%

4 - تعاملات ارجاعی (Reduction) الکایل هلایده‌ها:








مثال:



مشق و تمرین کنید:



معادلات تعاملات زیر را تکمیل نمایید:



۷-۱-۵: الکایل هلایده‌های مهم

میتایل کلوراید (CH_3Cl)

میتایل کلوراید به حرارت $23.7^\circ C$ غلیان نموده و آن را به حرارت $400^\circ C$ از تعامل کلورینیشن میتان به دست می‌آورند، همچنان این مرکب را از تعامل میتایل الکول و هایدروجن کلوراید به فشار بلند نیز

به دست می آورند. میتایل کلوراید را در دستگاه های سرد کننده به حیث عامل سرد کننده استعمال می نمایند.


کلوروفارم ($CHCl_3$)

کلورو فارم یا ترای کلورومیتان یک مایع بی رنگ بوده و دارای بوی خاص شیرین است. این مرکب به حرارت $62^\circ C$ غلیان می نماید، کثافت آن $1.48 g/mL$ است. اگر کلوروفارم هایدرولیز گردد، فارمیک اسید حاصل می گردد که نام کلوروفارم نیز از همین جا اشتقاق یافته است. کلورو فارم محلل خوب مرکبات عضوی، صمغ، چربو و رابر است. این مرکب دارای خاصیت قوی انستیزیکی (بی هوشی) بوده که در سال 1848 در عملیات های جراحی به کار می رفت، در حال حاضر در این عرصه بنابر داشتن عوارض جانبی استعمال کم دارد. کلوروفارم در هوای آزاد اکسیدی گردیده و یکی از محصولات آن ماده زهری فوسیجن (phosgene) ($COCl_2$) است. برای جلوگیری از تشکیل فوسیجن، با کلوروفارم یک فیصد الکول را علاوه می نمایند. در صنعت کلوروفارم را از تعامل کلسیم هاپو کلورایت با ایتایل الکول به دست می آورند.

کاربن تترا کلوراید (CCl_4)

کاربن تتراکلوراید یا تتراکلورو میتان مایع بی رنگ بوده و درجه غلیان آن $76.5^\circ C$ و کثافت آن $1.59 g/mL$ است. محلل خوب مرکبات عضوی، صمغ، چربو و رابر و غیره می باشد. کاربن تترا کلوراید غیر قابل احتراق بوده و در آله های ضد حریق برای خاموش نمودن آتش سوزی در لابراتوارها و گداه ها به کار برده می شود. در موقع استعمال این آله ها فوسیجن نیز تولید گردیده که موجودیت این گاز در محلات بسته استعمال کاربن تترا کلوراید را خطر ناک ساخته است. کاربن تترا کلوراید را در پاک نمودن البسه و در سنتیزهای مختلف به کار می برند.

کاربن تترا کلوراید را از تعامل کاربن دای سلفاید و کلورین قرار ذیل به دست می آورند:





خلاصه فصل هفتم

* الکیل هلایدها مشتقات هلوجنی هایدرو کاربن ها بوده که از تعویض یک یا چندین اتوم هایدروجن هایدرو کاربن ها حاصل شده اند.


* فورمول عمومی الکیل هلایدها $C_nH_{2n+1}X$ بوده که در این فورمول X ممکن I, Br, Cl, F باشد
* الکیل هلایدها نیز به هلایدهای اولی (primary)، دومی (secondary) و سومی (tertiary) نظر به اینکه هلوجن به کدام نوع اتوم کاربن ارتباط دارد، تقسیمات کرده اند.

* از هلوجنیشن مستقیم الکان ها می توان الکیل کلوراید و الکیل بروماید را به دست آورد، این تعاملات را به نام Chlorination و Bromination یاد می کنند و به شکل رادیکالی صورت می گیرد و دارای اهمیت صنعتی می باشد که مرکبات مختلف الکیل هلایدها از آن تشکیل گردیده و به واسطه تقطیر از هم جدا می گردند.

* الکیل هلایدهای که کتله مالیکولی شان بزرگتر است؛ نسبت به الکیل هلایدهای که عین تعداد کاربن را در بقیه الکیل خود دارند، دارای نقاط غلیان بلند تر اند.

* با وجودی که الکیل هلاید مرکبات قطبی اند؛ اما با آن هم در آب غیر منحل هستند؛ زیرا تشکیل رابطه هایدورجنی را کرده نمی توانند.

* اتوم هلوجن در مشتقات هایدرو کاربن ها از جمله الکیل هلوجنیدها نسبت به اتوم کاربن الکترونیگاتیف بوده و رابطه کاربن - هلوجن قطبی می باشد:



* تعامل کننده دوست دار هسته (Nucleophilic) مشتق هلوجن را در هلایدها مورد حمله قرار داده و با اتوم کاربنی که کثافت ابرالکترونی در آن کم است، رابطه برقرار نموده، از مالیکول، هلوجن را بی جا می سازد و در نتیجه اتوم هلوجن به بقیه نوکیوفیلی تعویض می گردد.

سؤالات فصل هفتم

سؤالات چهار جوابه

1 - الکیل هلایدها مشتقات --- هایدرو کاربن ها اند.

الف - هایدروجنی ب - هلوجنی ج - سلفری د - آکسیجنی

2 - فورمول عمومی الکیل هلایدها ---- است.


الف - $C_nH_{2n+1}X$ ب - C_nH_{2n+2} ج - C_nH_{2n+1} د - C_nH_{2n}

3 - قرار قاعده مارکوف نیکوف هایدروجن بالای آن کاربن رابطه دو گانه نصب می گردد که تعداد هایدروجن اولی آن ---- باشد.


- الف- کم ب- یکسان ج- زیاد د- هیچ کدام
- 4 - محصول تعامل در معادله $R-O-R' + HX \longrightarrow$ --- است.
- الف- $R'OH$ ب- $R-X$ ج- الف و ب هر دو د- هیچکدام
- 5 - محصول تعامل کلورین با ایتلین..... می باشد.
- الف- کلورو ایتان ب- دای کلورو ایتلین ج- دای کلورو ایتان د- هیچکدام
- 6 - نام $CH_3-CH_2-CH_2Br$ عبارت است از..... است
- الف- 1-Bromopropapane ب- 2-bromopropa ne ج- 3-bromopropene
- د- هیچکدام
- 7 - محصول تعامل ایتایل بروماید و سودیم استیت عبارت است از:
- الف- ایتایل استیت و سودیم بروماید ب- دای ایتایل ایستر و سودیم بروماید.
- ج- ایتایل متایل ایستر د- الف و ج صحیح است.
- 8 - مشتقات هلو جنی الکانها به کدام نام یاد می شوند؟
- الف- اسایل ها ب- هلو جنیدها ج- الکیل هلایدها د- آرایل هلایدها
- 9 - فورمول برای کلورو ایتلین عبارت است از:
- الف- $CHCl = CHCl$ ب- $CHCl = CCl_2$ ج- $CH_3 - CCl_3$ د- هیچکدام
- 10 - یکی از محصولات --- کلوروفارم ماده زهری فوسیجن (phosgene) است.
- الف- ریدکشن ب- اکسیدیشن ج- تعامل جمعی د- تعامل تجریدی

سوالات تشریحی

1 - مرکبات ذیل را به اساس آیوپک نامگذاری نمایید:



2 - معادله تعامل تعویضی 1-chloro propane را با $NaOH$ تحریر دارید.



4 - محصول تعامل تعویضی 1-Chloro propane با $NaOH$ کدام ماده خواهد بود؟
شیوه حل: هر دو ماده تعامل کننده را تحریر و مواد نوکلیوفیل را در آن مشخص سازید (به طور مثال: (OH^-) و گروپ باقیمانده (به طور مثال: Cl^-) مشخص سازید. گروپ Cl^- را توسط گروپ OH^- تعویض نمود، معادله مکمل آن را تحریر دارید.

5 - مرکبات 1-Bromo pentane و 2-Chloro propane با OH^- تعامل تعویضی S_N2 را انجام داده است، به نظر شما تعامل تعویضی S_N2 کدام یکی از مرکبات مذکور سریع خواهد بود؟

6 - کدام یکی از جوره الکایل هالیدهای ذیل به خوبی و به سرعت با OH^- تعامل تعویضی S_N2 را عملی خواهد کرد:

الف - Bromo benzene یا $(C_6H_5CH_2Br)$ benzyl bromide

ب - CH_3Cl یا $(CH_3)_3CCl$


ج - $CH_3CH = CHBr$ یا $CH_2 = CHCH_2Br$

7 - اگر 3-methyl octan-3-ol با HBr به اساس مخانیکیست تعامل تعویضی S_N1 تعامل نماید، کدام محصول را بدست خواهید آورد؟ فورمولهای مواد تعامل کننده و محصول تعامل را تحریر دارید.

8 - چطور می توانید مواد ذیل را به اساس تعامل تعویضی نوکلیوفیل تهیه نمایید؟

a) $CH_3CH_2CH_2CH_2 - OH$ ، b) $(CH_3)_2CHCH_2CH_2CN$

9 - معادلات ذیل را تکمیل نمایید:



10 - فورمول مشرح مالیکولی مرکبات ذیل را تحریر دارید:

الف - 2,3-dichloro - 4 - methyl hexane

ب - 4-bromo - 4ethyl - 2 - methyl hexane

ج - 3-iodo - 2,2,4,4 - tetramethyl pentane

الکولها و ایترها




اکثر مرکبات عضوی دارای گروپ‌های خاص اند که این گروپ‌ها به نام گروپ‌های وظیفوی (Functional groups) یاد می‌شوند. این گروپ‌ها تعامل تعویضی را با هایدروکاربن‌ها انجام می‌دهند و در نتیجه صنف خاصی از مرکبات عضوی را تشکیل می‌دهند که از جمله گروپ هایدروکسیل ($-OH$) و گروپ ایترا ($-O-$) است. گروپ هایدروکسیل و ایترا توسط رابطه اشتراکی با اتم‌های کاربن هایدروکاربن‌ها متصل می‌گردند، در این فصل راجع به الکول‌ها، خواص، ساختمان، مورد استعمال الکول‌ها و ایترها معلومات آرایه می‌گردد که دارای گروپ‌های فوق بوده وبا مطالعه این فصل خواهید دانست که الکول‌ها و ایترها کدام نوع مرکبات بوده و دارای کدام خواص و ساختمان می‌باشند؟ در کدام عرصه‌های صنعتی به کار رفته و چه طور می‌توان آن‌ها را به دست آورد؟

۸-۱: الکول‌ها (Alcohols)

هر مرکب عضوی که در ترکیب مالیکولی خود دارای گروپ وظیفوی $-OH$ باشد، بنام الکول یاد می‌شوند. الکول کلمه عربی بوده و به معنی جوهر شراب می‌باشد.


فورمول عمومی الکول‌ها $R-OH$ بوده که R می‌تواند بقیه الکایل دارای زنجیر نارمل و یا منشعب، الکیلینل، الکیلینل (دارای رابطه دو گانه و یا سه گانه)، حلقه اروماتیک و غیره باشد؛ بطور مثال:




Ethyle alcohol

2-Methyl-2-Propanol


Allyl alcohol




Cyclohexanol



Benzyl alcohol




Ethylene chlorohydrin





اگر گروپ وظیفوی ($-OH$) به گونه مستقیم با حلقه اروماتیک وصل گردیده باشد، این الکول به نام فینول یاد می‌شود که در مبحث جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.

۸-۱-۱: نامگذاری الکول‌ها (Nomenclature of alcohol)

الکول‌ها را بر حسب تعداد اتم‌های کاربن متصل شده به گروپ کاربینول ($-C-OH$)؛ یعنی به کاربن دارنده گروپ هایدروکسیل به سه دسته تقسیم کرده اند که عبارت از الکول اولی (Primary alcohol)، گروپ $-OH$ به کاربن اولی رابطه دارد، الکول دومی (Secondary alcohol)، گروپ هایدروکسیل به کاربن دومی مربوط است) و الکول سومی (Tertiary alcohol)، گروپ هایدروکسیل $-OH$ به کاربن سومی مربوط است) اند که فورمول‌های عمومی آن‌ها قرار ذیل است:



در فورمول‌های فوق R بقیه‌های مختلف عضوی را افاده نموده؛ یعنی می‌تواند الیفاتیک ($-CH_3$) و یا اروماتیک ($-C_6H_5$) و غیره باشد. ایتایل الکول (ایتانول) و بنزایل الکول نوع الکول اولی بوده؛ اما ایزو پروپایل الکول نوع الکول دومی است:




الکول دومی

الکول اولی

الکول اولی

نام گذاری عمومی الکول‌ها به دو سیستم صورت می‌گیرد، یکی آن سیستم نام گذاری معمولی رادیکالی (Common names) است، الکول‌های ساده که سابق شناخته شده اند، به این طریق نام گذاری می‌گردند؛ بطور مثال:






ethyl alcohol

OH


isopropyl alcohol

iso butyl alcohol






p - nitrobenzyl alcohol

قابل یادآوری است که این نوع نام گذاری محدود بوده، برای زنجیرهای طویل و منشعب قابل تطبیق نمی‌باشد؛ بطور مثال:



2,2,3 - trimethyl pentanol

به همین ترتیب در نام گذاری الکول‌ها نوعیت الکول‌ها (اولی، دومی و سومی) نیز مشخص می‌گردد؛ بطور مثال: ایزوپروپیل الکول یک الکولی دومی بوده و ایزوبیوتیل الکول یک الکول اولی است؛ پس نامگذاری اینها به شکل ذیل نیز صورت می‌گیرد:



Primary Ethyl alcohol

Isopropyl alcohol


Primary Methylpropyl alcohol

مشق و تمرین کنید




الکول دارای فورمول جمعی $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{OH}$ را در نظر داشته، هشت فورمول مختلف ساختمانی را به آن تحریر دارید که در آن انواع الکول اولی، دومی و سومی مشخص گردد.

زیادتر بدانید: بعضی اوقات الکل‌ها را به اساس گروپ $(C-OH)$ Carbinol شان نام گذاری می‌نمایند که آن را سیستم کاربینول گویند. در این طریقه الکل‌ها طوری تصور می‌گردند که از کاربینول به دست آمده باشند؛ لذا CH_3-OH را کاربینول نیز گویند. مثال‌های دیگر آن عبارت اند از:




نام گذاری سیستماتیک الکل‌ها به اساس IUPAC طوری عملی می‌گردد که حرف e پسوند‌های هایدروکاربن‌های مربوطه به (ol) تعویض و در نتیجه نام الکل مطلوب حاصل می‌گردد.



از طرف دیگر برای رفع اشتباهات در نامگذاری کاربن‌های هایدروکاربن‌ها را نمبر گذاری نموده و نمبر گذاری را از آن انجام زنجیر آغاز می‌نمایند که کاربن گروپ کاربینول کوچکترین نمبر را به خود اختیار نماید؛ به طور مثال:



مثال: الکل‌های ذیل را به اساس آیوپک نام گذاری می‌نمایند:
حل:



الکل‌های که حاوی دو گروپ $-OH$ اند، به طور معمول به نام گلیکول‌ها (Glycols) یاد می‌گردند، اینها به هردو نوع نام‌ها (معمولی و آیوپک) نامگذاری می‌شوند:





فعالیت

ده ایزومیر اکتانول را نوشته و به طریقه آیوپک نام گذاری نمایید.

۸ - ۱ - ۲: خواص فیزیکی الکل ها

الکل ها دارنده گروپ الکایل و هایدروکسیل است که رابطه بین کاربن و آکسیجن در مالیکول این مرکبات قطبی بوده و خواص این مرکبات را تعیین می نماید. الکل ها نظر به هایدرو کاربن های دارنده عین تعداد اتوم های کاربن (ایزولوگ) دارای نقطه غلیان بلند اند؛ زیرا بین مالیکول های الکل ها رابطه هایدروجنی برقرار بوده، این رابطه سبب تراکم بیشتر مالیکول های الکل ها می گردند. موجودیت رابطه هایدروجنی در بین الکل ها و آب نیز موجود است که سبب انحلالیت آن ها در آب می گردد، آب هم بین مالیکول های خویش رابطه هایدروجنی دارد:

شکل (8 - 1) رابطه هایدروجنی بین مالیکول های آب و الکل:

نقطه غلیان الکل های غیر منشعب نسبت به منشعب بلند تر است نقاط غلیان به اساس افزایش تعداد اتوم های کاربن و کتله مالیکولی هم بلند می رود. جدول (8 - 1) خواص فیزیکی و نقطه غلیان یکعده الکل ها

| نام | فورمول | درجه غلیان C° | انحلالیت در 100g آب در $20C^{\circ}$ |
|-------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Methanol | CH_3OH | 65 | به هر نسبت منحل |
| ethanol | CH_3CH_2OH | 78,5 | به هر نسبت منحل |
| 1-propanol | $CH_3CH_2CH_2OH$ | 97 | به هر نسبت منحل |
| 1-butanol | $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ | 117.7 | 7,9 |
| 1- pentanol | $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$ | 137.9 | 2.7 |
| 1-hexanol | $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$ | 155.8 | 0.59 |

با افزایش گروپ های وظیفوی درجه غلیان الکل ها هم بلند می رود؛ بطور مثال: ایتلین گلایکول در

197°C° جوش می آید. درمالیکول‌های این مرکب تعداد روابط هایدروجنی زیاد می‌باشد، به این لحاظ انحلالیت آن در آب هم زیاد است. ایتلین گلایکول به حیث ماده ضد یخ در موترها استعمال می‌گردد. نقطه غلیان الکول‌ها در مقایسه با الکان‌های مربوطه شان در گراف شکل ذیل ارائه گردیده است:

(°C) درجه حرارت

الکول‌ها

الکان‌های نارمل

كتله مالیکول
($g.mol^{-1}$)




شکل (8 - 2) گراف نقطه غلیان الکول‌ها در مقایسه به الکان‌ها

۸-۱-۳: خواص و فعالیت‌های کیمیاوی الکول‌ها



الکول‌ها با داشتن كتله مالیکولی کوچک در حالت عادی مایع بوده و فشار بخار آن‌ها به مراتب پایین تر از الکان‌های ایزولوک شان می‌باشد؛ زیرا بین مالیکول‌های آن‌ها رابطه هایدروجنی برقرار گردیده و رابطه هایدروجنی انحلالیت آن‌ها را در آب زیاد ساخته است که در حالت محلول فشار بخار آن نیز پائین تر است.

الکول‌ها مرکبات دوخاصیته (Amphotric) بوده، هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت القلی را از خود نشان می‌دهند، ثابت تفکیک فوق العاده کوچک را دارا اند:



تعامل الکول‌ها با فلزات القلی


الکول‌ها با فلزات القلی تعامل نموده الکل‌یت‌ها را تشکیل می‌دهند؛ به طور مثال: ایتانول با Na تعامل نموده و مرکب Sodium Ethanolate ($C_2H_5 - ONa$) را تولید می‌نماید:




شکل (8 - 3) تعامل ایتانول الکول با سودیم فلزی

سودیم الکولیت‌ها در محلول‌های آبی خاصیت القلی قوی را از خود نشان داده که ضعیف بودن اسید مزدوج خود را توضیح می‌نمایند.


فعالیت کیمیاوی الکول‌ها در تعامل با فلزات القلی با ازدیاد زنجیر کاربونی شان کم شده که تنقیص فعالیت شان را سلسله ذیل نشان می‌دهد:




الکول‌ها می‌توانند خاصیت قلوی را نیز از خود تبارزدند؛ زیرا جوهره الکترون‌های آزاد اتوم آکسیجن گروپ $-OH$ قادر به جذب پروتون تیزاب‌های دیگر می‌باشد:




$C_2H_5-OH_2^+$ اسید مزدوج الکول بوده و مثالی از ایون اکسونیم است، فورمول عمومی آنها $R-OH_2^+$ می‌باشد. تشکیل $R-OH_2^+$ اولین مرحله تعامل متعدد بوده که الکول‌ها در موجودیت کتلت اسیدی انجام می‌دهد؛ به طور مثال: کشیدن آب از الکول در محیط اسیدی (H_2SO_4) توسط ایون اکسونیم (Oxonium) انجام می‌گردد:





به این ترتیب دی‌هیدریشن (Dehydration) ایتایل الکول امکان تبادل انرژی نباتی را با هیدرو کاربن‌ها می‌سازد؛ زیرا تخمر محصولات زراعتی از قبیل غله جات، نیشکر، خرما، انگور و غیره منجر به تشکیل الکول‌ها شده و از Dehydration الکول‌ها، ایتیلین و بعد از آن پولی ایتیلین‌ها حاصل می‌گردند. الکول‌ها با هیدروها لایدها و هالایدها تعامل نموده، الکالیل هالایدها را تشکیل می‌دهند:



در نتیجه عملیه اکسیدیشن الکول‌ها، الیدیها و تیزاب‌ها تشکیل می‌گردند:




ایتایل الکول در ظرف باز، بعد از مدتی با اکسیجن هوا تعامل نموده، الیدیها را تشکیل می‌دهد و بوی معطر را دارا می‌باشد که با بوی الکول فرق دارد و بالاخره در اثر اکسیدیشن قوی به اسید عضوی مبدل می‌گردد که بوی تیز را دارا است. اکسیدیشن الکول‌های اولی منجر به تولید الیدیها و اسیدها می‌گردد:



الیدیها



تیزاب

اگر الکول‌های دومی Oxidation گردند، کیتون‌های مربوط آن‌ها حاصل می‌گردد:




تعامل ساختن ایستر (Esterification)

تعامل الکول و تیزابها را به نام تعامل ایستریفیکیشن یاد می‌کنند. این تعامل در موجودیت تیزاب به حیث کنتست صورت می‌گیرد که در نتیجه آن ایستر و آب تشکیل می‌گردد:




اسایل کلورایدها هم با الکول تعامل نموده، محصول آن نیز ایسترها می‌باشند:




۸-۱-۴: استحصال الکول‌ها

طریقه‌های اقتصادی استحصال الکول‌ها عبارت از هایدریشن الکین‌ها و تخمر قندها می‌باشند:



غرض استحصال الکول‌ها به طریقه تخمر، در صورتیکه ماده اولیه نشایسته باشد از انزایم امایلیز (Amylose) که در آب جو (malt) موجود است، استفاده بعمل می‌آید، این انزایم نشایسته را به قندهای ساده (گلوکوز) تبدیل می‌نماید. در تخمر قند لبلبو یا نیشکر که حاوی سکروز و مالتوز بوده است، از انزایم انورتیز (Invertase) که در خمیر مایه (yeast) موجود است، استفاده به عمل می‌آید، این انزایم عصاره‌های لبلبو، نیشکر و میوه‌های دیگر را به گلوکوز و فرکتوز تبدیل می‌نماید. انزایم زایمیز (Zymase) که در خمیر مایه موجود است، گلوکوز را به ایتانول و CO_2 تبدیل می‌نماید:




جدا کردن ایتانول از آب توسط تقطیر تدریجی صورت می‌گیرد؛ طوری که ایتایل الکول در $78^\circ C$ و آب در $100^\circ C$ به جوش می‌آیند.

طریقه صنعتی و مصنوعی استحصال الکول

۱- از پترولیم می‌توان الکول‌ها را به دست آورد؛ به طور مثال: در امریکا سالانه $7.10^8 Lb$ ایتانول و $10^9 Lb$ ایزوپروپایل الکول را از پترولیم به دست می‌آورند که این نوع الکول‌ها برای مشروبات

الکولی استعمال نمی‌گردند.


میتانول را تا سال 1920 از چوب خشک به دست می‌آوردند، در حال حاضر در امریکا ده میلیون پوند میتانول را از تعامل (CO) و H_2 (ارجاع CO) به دست می‌آورند:



از کمیت استحصال شده فوق، نصف مقدار آن را برای استحصال فارم الدیهای جهت تولید پلاستیک به کار می‌برند.


۲- تعامل ترکیبی معرف گرینارد

الف- تعامل معرف گرینارد با الدیهای:




معرف گرینارد الدیهای



الکول دومی



2-Pr opanol









ب- تعامل معرف گرینارد با کتون ها




۳- ارجاع الدیهای، کتون ها و تیزاب های عضوی

الدیهای، کتون ها و تیزاب های عضوی در موجودیت عامل ارجاع، ارجاع گردیده که از ارجاع الدیهای و تیزاب ها، الکول اولی و از ارجاع کتون ها الکول های دومی حاصل می‌گردد. ارجاع الدیهای، تیزاب ها و کتون ها توسط هایدر و جن در موجودیت پلاتین صورت گرفته، الکول ها حاصل می‌گردد:







بیشتر بدانید: ایسترها نیز ارجاع شده که در نتیجه دو مالیکول الکول حاصل می گردد؛ بطور مثال: دای میتایل ایستر ارجاع و در نتیجه یک مالیکول میتایل الکول و یک مالیکول ایتایل الکول حاصل می شوند:




۴- استحصال الکول ها از هایدرولیز ایترها و ایسترها


از هایدرولیز ایتريهای متناظر دو مالیکول یکنوع الکول و از هایدرولیز ایتري غیر متناظر دو مالیکول الکول مختلف حاصل می گردد:



از هایدرولیز یک مالیکول ایسترها یک مالیکول الکول و یک مالیکول اسید عضوی حاصل می گردد:



5- الکایل هالیدها هایدرولیز شده و در نتیجه الکول ها و هایدروجن هالیدها تشکیل می گردد:




Alkyl halides alcohol hydrogen halides


۸-۱-۵: میتانول یا میتایل الکول (CH_3OH): میتایل الکول مایع بی رنگ بوده و به خوبی مشتعل شده و دارای بوی مخصوص و ذائقه ایتایل الکول را داشته وزه‌ری است. خوردن کم آن سبب کوری و مقدار زیاد آن سبب مرگ می‌گردد. تنفس بخارات آن به طور دوامدار و تماس آن با جلد بدن به طور دوامدار انسان را هلاک می‌نماید. باید از نوشیدن آن جلوگیری گردد. میتانول به حرارت $97^\circ C$ - منجمد گردیده که در موتورها به حیث ماده ضد یخ به کار می‌رود. میتایل الکول به حرارت $64.7^\circ C$ غلیان نموده و در آب به هر نسبت حل می‌گردد، محلل خوب مواد عضوی و شحمیات است. به پیمانه زیاد برای تولید فارم الیهاید به مصرف می‌رسد که فارم الیهاید را برای صنایع تولید پلاستیک‌ها، رنگ‌ها و محلل‌ها مصرف می‌نماید.

خواص کیمیاوی میتانول


خواص تیزابی میتایل الکول نظر به الکول‌های دیگر یک قیمته بیشتر می‌باشد:




به شعله آبی سوخته و به آسانی اکسیدیشن می‌گردد که در مرحله اول فارم الیهاید در مرحله دوم تیزاب مورچه و در مرحله سوم CO_2 و آب را تشکیل می‌نماید:



استحصال میتایل الکول: ساده‌ترین الکول‌ها میتایل الکول بوده که به نام الکول چوب نیز یاد می‌گردد. از تقطیر چوب در حرارت بلند و غیاب هوا میتایل الکول را بدست می‌آورند، لذا به نام الکول چوب یاد می‌گردد. چوب یا سلولوز را به مرکبات ساده از قبیل: استون، تیزاب سرکه و میتایل الکول تبدیل می‌نماید. تا سال 1925 از این طریقه استفاده می‌گردید؛ مگر طریقه ارزانتر دیگر توسط جرمن‌ها در 1920 بوجود آمد. امروز طریقه جرمن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، این طریقه عبارت از تعامل CO و H_2 تحت فشار زیاد، حرارت و موجودیت کتلت‌ها می‌باشد:



اگر ایتلین در محیط تیزابی هایدریشن گردد، ایتایل الکول حاصل می‌گردد:



۸-۱-۶: ایتانول یا ایتایل الکول ($CH_3 - CH_2OH$)


ایتانول خالص بی رنگ و دارای بوی خاص خود است. درجه ذوبان آن $114^\circ C$ -، درجه غلیان و کثافت آن $0.789 g/mL$ است، در آب به هر نسبت حل می‌گردد.



شکل (8 - 4) مودل ایتانول


خواص ایتایل الکول

ایتانول که در لابراتوار به حیث محلل استعمال می گردد، 95% الکول و 5% آب می باشد، این مخلوط را به نام الکول معمولی یاد می کنند که به $78.15^{\circ}C$ درجه حرارت به غلیان می آید. الکول 100% (الکول مطلق) را از الکول معمولی با علاوه کردن چونه در آن که آب به شکل $Ca(OH)_2$ ته نشین می گردد، تهیه می نمایند.



روش دیگری تصفیه ایتانول خالص (الکول مطلق) علاوه کردن بنزین در مخلوط 95% الکول و آب می باشد. بنزین دو نوع ایزومیر مختلف را با آب و الکول می سازد تا ایتانول در $69.9^{\circ}C$ به غلیان بیاید و از آب به طور کامل جدا گردد.

ایتایل الکول محلل خوب عضوی بوده، لذا برای تهیه تینچر آیودین، رنگ ها، عطریات و خوشبو ساختن مواد آرایش استعمال می گردد. به همین ترتیب در تهیه کلونیا، سپری (Spray) و نوشیدنی ها استعمال می شود. در نتیجه سوختن ایتایل الکول انرژی زیاد تولید می گردد:



شکل (8-5) استعمال ایتایل الکول غرض استحصال انرژی و حرارت

سوختن خوب آن باعث گردیده تا مواد سوخت داخلی انجن ها را تشکیل دهد. ایتایل الکول به حیث ماده ضد یخ به کار رفته و محلول 70-85% آن به حیث ماده ضد عفونی استعمال می شود. این مرکب خاصیت تخریبی ارگانیزم های پروتینی را دارا بوده و برای از بین بردن بکتریا، فنجی ها و تعداد زیادی از وایروس ها و سپوره های بکتریا استعمال می گردد.

ایتایل الکول وقتی که از طریق نوشابه های الکولی داخل بدن انسان گردد، تأثیرات منفی را در بدن به جا می گذارد؛ طوری که مالیکول های آب مغز را جذب نموده و موقعیت آب را در مغز تغییر می دهد. این عملیه سبب تغییرات در سیستم عصبی می گردد.

استحصال ایتانول


1- ایتایل الکول به پیمانه زیاد از تخمر بوره حاصل می گردد. دو منبع مهم استحصال ایتایل الکول قرار ذیل است:
الف- از نباتات دارای نشایسته؛ به طور مثال: گندم، جواری، کچالو، جودر و غیره می توان ایتایل الکول را به دست آورد.

ب- از نباتات دارنده قند؛ مانند چغندر (لببو)، نیشکر و میوه ها می توان ایتایل الکول را به دست آورد.
در دروس گذشته در مورد استحصال الکول ها معلومات مفصل ارائه گردیده که می توان به اساس آن ها

ایتایل الکول را نیز به دست آورد، در این جا دو معادله تعامل کیمیاوی استحصال آن را که به اساس تخمر بوره و گلوکوز به دست می آید، تحریر می نماییم:


$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{\text{مالتیز}} 2C_6H_{12}O_6$$

گلوکوز




شکل (8 - 6) تخمر بوره و استحصال ایتایل الکول، شکل (8 - 7) دستگاه تخمر گلوکوز و استحصال ایتایل الکول

2 - در صنعت ایتانول را از هیدریشن ایتلین در موجودیت کتلت H_3PO_4 و حرارت بدست می آورند. این طریقه نظر به تخمر ارزانتر می باشد:



3 - اسیت الیدهاید در موجودیت کتلت (Ni) ارجاع گردیده، ایتانول حاصل می گردد:




۸-۱-۶: الکول های چندین قیمته

اگر در ترکیب مالیکولی الکول ها یک گروپ هایدروکسیل موجود باشد، این نوع الکول را به نام الکول یک قیمته یاد می نمایند و در صورتی که در ترکیب مالیکولی الکول ها چندین گروپ هایدروکسیل موجود باشد، این نوع الکول ها را به نام الکول چندین قیمته یاد می کنند.


گلیکول Glycol

الکول های دارای دو گروپ ($-OH$) به نام گلیکول ها یاد می شوند، مثال عمده آن ایتلین گلیکول (CH_2OHCH_2OH) است. نام آیوپک ایتلین گلیکول، 1 - 2 - ایتان دایول می باشد.


ایتلین گلیکول: مالیکول ایتلین گلیکول که نام سیستماتیک آن 1,2-Ethane di ol است، نوع الکول دو قیمته بوده و فورمول مشرَح آن قرار ذیل است:




ایتلین گلایکول مایع است پی رنگ، پی بو و شربت مانند، با آب به هر نسبت مخلوط شده می تواند. با داشتن نقطه پایین انجماد (-155°C) به حیث ضد یخ (انتی فریز) در موتورها به کار رفته و چون درجه غلیان آن (-197°C) است، لذا در تابستان نیز در آب موتورها علاوه می گردد. در بربیک موتورها به حیث مایع هایدرولیک، در رنگها، تیلها و محلل رنگهای قلم بکار می رود. ایتلین گلایکول الکل اولی دو قیمته بوده از اکسیدیشن آن اگرالیک اسید بدست می آید.



از تعامل ایتلین دای کلوراید (1 - 2 - دای کلوروایتان) با آب ایتلین گلایکول استحصال می گردد:





ایتلین گلایکول دو گروپ $-\text{OH}$ را در ترکیب مالیکولی خود دارا می باشد و از آن به حیث ماده ضد یخ در موتورها استفاده به عمل می آورند و هم برای تهیه الیاف مصنوعی از آن استفاده می نمایند. دلیل عمل کرد خوب گلایکول به حیث ماده ضد یخ به خاطر انحلالیت خوب آن در آب بوده و نسبت موجودیت دو گروپ $-\text{OH}$ ، رابطه هایدروجنی را با مالیکولهای آب برقرار نموده است، همچنان با نایتربیک اسید (HNO_3) تعامل نموده، ماده انفجاری را به نام نایترو گلایکول تشکیل می دهد:




گلیسرین

گلیسرین الکل سه قیمته و دارای سه گروپ $-\text{OH}$ بوده که فورمول آن قرارذیل است:




شکل (8 - 5) مدل گلیسرین

نام سیستماتیک آن 1,2,3-Propantriol است، این مرکب در شرایط عادی مایع بوده و چسبنده می‌باشد که در آب به خوبی حل گردیده و به حیث ماده نرم کننده آب به مصرف می‌رسد. در $18^{\circ}C$ منجمد و در $290^{\circ}C$ به غلیان می‌آید کثافت آن $1.261g/mL$ بوده. با آب مثل میتانول و ایتانول مخلوط می‌گردد. مایعی است شربت مانند و بدون زهر قابلیت جذب خوب را دارا می‌باشد. گلیسرین محصول فرعی هایدرولیز شحمیات حیوانی و روغن‌های نباتی می‌باشد.



در نتیجه تعامل گلیسرین با نایتریک اسید (ایستریفیکیشن)، ایستر غیر عضوی به نام برای نایترو گلیسرین (گلیسرایل برای نایتریت غیر عضوی) حاصل می‌گردد:



نایترو گلیسرین ماده فوق العاده انفجاری بوده و نا پایداری می‌باشد که در سال 1970 کیمیا دان دنمارکی بنام نوبل (Noble) آن را با استفاده از بوره اره تاحدی پایدار ساخت و از آن زمان تاحال به نام دینامیت به مصرف می‌رسد. نوبل از این طریق سرمایه زیادی بدست آورد؛ اما موقع که استعمال آن را به حیث افزار جنگی ملاحظه کرد و دید که برای از بین بردن انسان‌ها به کار برده شد، تمام اندوخته‌های خود را وقف جایزه نوبل و دادن آن به دانشمندان واقعی و انسان دوست نمود. تعامل فوق اکزوترمیک است و زود آن را سرد می‌سازد، زیرا که در $45^{\circ}C$ نایترو گلیسرین انفجار می‌کند. دینامیت از مخلوط نایترو گلیسرین با بوره اره بدست می‌آورد که یک ماده فوق العاده منفجره است، گلیسرین برای جذب رطوبت تنباکو، در صابون حمام و کریم ریش تراشی، کریم‌ها و مواد آرایش و در تولید و تهیه پلاستیک، آب رنگ‌ها، رنگ‌های پرنرها و مطابع، مرهم‌ها، آنتی فریز و دینامیت استعمال می‌گردد.



ب - تعامل گلیسرین با پوتاشیم پرمنگنات

شکل (8 - 6) الف - دینامیت




شکل (8 - 7) خرس قطبی

حیوانات قطبی از جمله خرس قطبی در بدن خویش قدرت تولید ساریتول (Sorbitol) و گلیسرول (glycerol) را دارا بوده که در موقع سردی هوا مقدار آب بدن ایشان کم شده و محلول غلیظ این مرکبات به حرارت‌های پایین منجمد نشده و به حرارت 87°C - هم زنده گی کرده می‌توانند.


گلیسرین را به طریقه‌های عمومی استحصال الکول‌ها می‌توان استحصال کرد؛ اما غیر اقتصادی تمام می‌شود. اقتصادی‌ترین طرق آن عبارت از هایدرولیز شحمیات و روغن‌های نباتی و تخمر بوده است.

تولید گلیسرین در بدن حشرات خون سرد و حیوانات قطبی سبب می‌شود تا مایع داخل بدن آن‌ها الی 87°C - منجمد نگردد. برای نایتر و گلیسرین یا دینامیت طبق تعامل ذیل سبب انفجار می‌گردد.



۸-۲: ایترها (Ethers)

اگر فرض نمائیم که الکول‌ها مشتق از مالیکول آب بوده طوری که یک اتوم هایدروجن آب به بقیه عضوی تعویض و الکول حاصل گردیده است، در صورتی که هایدروجن دیگر آن نیز تعویض گردیده باشد. ایترا حاصل می‌شود:



water

ethanol



Diethylether

فرمول عمومی $R - \text{O} - R$ یا $\text{Ar} - \text{O} - \text{Ar}$ است، اینها مرکباتی اند که دارای واحد $(\text{C} - \text{O} - \text{C})$ می‌باشند، قیمت‌های R و R و $\text{Ar} - \text{Ar}$ می‌تواند مشابه یا مخالف باشند.


نامگذاری

نامگذاری معمولی

چون گروپ وظیفه‌ی ایترها، اتوم آکسیجن $(-\text{O}-)$ است، در نامگذاری معمولی نامی از آن برده نشده و طوری نامگذاری می‌شوند که در اول نام بقیه‌های عضوی مرتبط به گروپ ایترا $(-\text{O}-)$ به اساس کوچکی و بزرگی رادیکال ذکر و کلمه ایترا به آن‌ها علاوه می‌گردد؛ یعنی به اساس گروپ وظیفه‌ی ایترا به نام دای الکایل ایترا نامگذاری می‌گردند، هرگاه معاوضه‌ها با هم یکسان باشند، پیشوند دای (di)، به نام معاوضه‌ها علاوه می‌گردد؛ به طور مثال:




ایترها را به اساس نامگذاری آیوپک (IUPAC) بنام الکا اوکسی (معاوضه کوچک) یاد می کنند و طوری نام گذاری می شوند که بقیه کوچک را Alkoxy قبول و بقیه دیگر متصل به گروپ (-O-) را الکان، الکین یا الکاین و غیره قبول و نامگذاری می نمایند، به طور مثال:



مشق و تمرین



مركبات ذیل را به اساس معمولی و آیوپک نام گذاری کنید:



خواص فیزیکی ایترها

ایترها کمتر در آب حل می گردند، نقاط غلیان ایترها با نسبت قطبیت بسیار کم شان از الکل ایزومیرها و ایزلوگ الکانها آنها کمتر اند؛ به طور مثال:




| نام فورمول | $CH_3CH_2-O-CH_2CH_3$ <i>Di ethylether</i> | $CH_3(CH_2)_3CH_3$ <i>Pentane</i> | $CH_3(CH_2)_3-OH$ <i>1-Butanol</i> |
|----------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| نقطه غلیان | $35^\circ C$ | $36^\circ C$ | $117^\circ C$ |
| انحلالیت در آب | 7.5g/100mL | غیر منحل | 9g/100mL |

بلند بودن درجه غلیان الکلها به اساس موجودیت رابطه هایدروجنی است. رابطه هایدروجنی در ایترها نظر به آب و الکل ضعیف تر بوده و در الکانها رابطه هایدروجنی موجود نیست.



درجه غلیان وانجماد مرکبات ذیل را به اساس تزايد وتنقیص ترتیب کنید و هم فورمول


جمعی آن‌ها را ارایه نمایید:




خواص کیمیاوی ایترها

فعالیت کیمیاوی ایتريهای ساده نسبت به الكولها كمتر است. رابطه کاربن و آكسیجن در ايترها خیلی مستحکم بوده و قطع آن به مشکل صورت می گیرد.



1- ايتريهای ساده با داشتن خواص ضعيف القلی، توسط اكسیدانتها و تیزابها پارچه شده رابطه ايتري، آن‌ها قطع می گردد؛ بطور مثال: با تيزابهای هلو جني قرار معادلۀ ذیل تعامل می نماید:





الكول توليد شده به اساس تعامل فوق با HX اضافی تعامل نموده، آب و $R-X$ را توليد می کند:






در حقيقت محصولات نهايي تعامل ايترها و هاي دروهلو جنيدها عبارت ازالكايل هلايد و آب است:



2- ايتر توسط آب در محيط تيزابي هاي دروليز و رابطه ايتري قطع می گردد:



3- ايترها به آساني در موجوديت O_2 به پر اكسايدها تبديل می گردد. پراكسايد توليد شده توسط آيون فيرس (Fe^{2+}) در موجوديت تيزاب غيلظ گو گرد دوباره تجزيه شده و به ايتر عادي مبدل می شود:







فعالیت

اگر 0.2 mol دای ایتایل اتر با مقدار معین محلول تیزاب غلیظ HBr تعامل نماید، چه مقدار الکول مربوطه از آن حاصل خواهد شد؟ $(CH_3 - CH_2 - OH = 46 \text{ g/mol})$



استحصال اترها

1 - طریقه معمولی استحصال اترها، عبارت از دی هایدریشن دو مالیکول الکول در موجودیت H_2SO_4 (به حیث کاتلیست) می باشد:



۲ - استحصال اترها به طریقه ویلیم سن


توسط این طریقه می توان ایتایل اترهای متناظر و غیر متناظر را استحصال کرد، در این طریقه الکایل هالایدها را با الکو اکساید های فلز (الکولیت ها) تعامل داده، اتر حاصل می گردد:



دای ایتایل اتر

دای ایتایل اتر مایع بی رنگ بوده و خاصیت بی هوش کننده را دارا است، مشتعل شونده و دارای بوی مخصوص می باشد. اتر دارای عمل انستیزی بوده و تنفس آن سبب بی هوشی مریضان تحت عمل جراحی می گردد. این مرکب محلل خوب مواد عضوی بوده و مواد عضوی را در خود حل می کند. در تعاملات ورتس و تهیه معرف گرینارد استعمال می گردد.

دای ایتایل اتر را در لابراتوارها از دی هایدریشن ایتایل الکول در موجودیت آب جذبان بدست می آورند:



نوت: دای ایتایل اتر خاصیت انفجاری قوی را دارا بوده و با هوا تعامل انفلاقی را انجام می دهد، در وقت کار لابراتواری با آن باید احتیاط گردد:



شکل (8 - 8) سوختن اتر به شکل انفلاقی


دای ایتایل اتر (Diethyl ether) را در زمان‌های سابق به حیث ادویه بی‌هوشی استعمال می‌نمودند. ایترها مواد مفر بوده؛ زیرا در این مرکبات رابطه‌های درجانی موجود نمی‌باشد. فعالیت کیمیاوی ایترها بسیار کم بوده و محلول خوبی برای مرکبات عضوی می‌باشند. ایترها مانند الکل‌ها تعاملات تعویضی را انجام می‌دهند (در صورتیکه کتلت‌ها موجود باشد).



خلاصه فصل هشتم

* هر مرکب عضوی که دارای گروپ وظیفوی OH - در ترکیب مالیکولی خود باشد، به نام الکل یاد می‌شوند.

* فورمول عمومی الکل‌ها $R-OH$ بوده که R می‌تواند بقیه‌الکایل دارای زنجیر نارمل و یا منشعب، الکینیل، الکانیل (دارای رابطه‌ی دو گانه و یا سه گانه)، حلقه‌ی اروماتیک و غیره باشند؛
* معرف گرینارد با الدیها و کتون‌ها تعامل نموده الکل‌ها را تشکیل می‌نمایند:



* میتایل الکل خالص بی‌رنگ و دارای بوی خاص خود است. مخلوط آن با آب زهری بوده و تاثیر شدید بالای سیستم عصبی مرکزی دارد.

* اگر در ترکیب مالیکولی الکل‌ها یک گروپ هایدروکسیل موجود باشد، این نوع الکل را به نام الکل یک‌قیمته یاد می‌نمایند و در صورتی که در ترکیب مالیکولی الکل‌ها چندین گروپ هایدروکسیل موجود باشد، این نوع الکل‌ها را به نام الکل چندین‌قیمته یاد می‌کنند

* گلیسرین الکل سه‌قیمته بوده و دارای سه گروپ هایدروکسیل ($-OH$) است که نام سیستماتیک آن $1,2,3-propanetriol$ است، این مرکب در شرایط عادی مایع بوده و چسبنده می‌باشد که در آب به خوبی حل گردیده و به حیث ماده نرم‌کننده‌ی آب به مصرف می‌رسد.

* ایترها دارای فارمول عمومی $R-O-R$ یا $Ar-O-Ar$ اند، اینها مرکباتی اند که دارای واحد $(C-O-C)$ می‌باشند.

* فعالیت کیمیاوی ایتراهای ساده نسبت به الکل‌ها کمتر است. رابطه‌ی کاربن و آکسیجن در ایتراهای خیلی مستحکم بوده و قطع آن به مشکل صورت می‌گیرد

دای ایتایل اتر (Diethyl ether) را در زمان‌های سابق به حیث ادویه بی‌هوشی استعمال می‌نمودند.
* ایترها مواد مفر بوده؛ زیرا در این مرکبات رابطه‌های درجانی موجود نمی‌باشد. فعالیت کیمیاوی ایترها بسیار کم بوده و محلول خوبی برای مرکبات عضوی می‌باشند.

تمرین فصل هشتم

سؤالات چهار جوابه

- 1 - الکل‌ها مشتقات ---- هایدروکاربن‌ها اند:
الف - نایتروجنی ب - آکسیجنی ج - سلفر د - فاسفورس
- 2 - الکل سومی نوع الکولی است که کاربن دارنده گروپ $-OH$ به --- ارتباط دارد.
الف - دو اتوم کاربن ب - سه اتوم کاربن ج - یک اتوم کاربن د - با سه گروپ $-OH$
- 3 - انزایم زایمیز گلوکوز را به ---- و CO_2 تبدیل می‌نماید.
الف - الکل ب - کیتون ج - الدیهاid د - تیزاب
- 4 - فورمول عمومی معرف گرینارد ---- است.
الف - $R-Mg$ ب - $R-MgX$ ج - $R-Mg(OH)$ د - $R-Mg(OH)_2$
- 5 - تعامل الکل و تیزاب را به نام تعامل --- یاد می‌کنند.
الف - صابون سازی ب - ایستریفیکیشن ج - تعامل تجزیوی د - هیجکدام
- 6 - محصول تعامل الکل‌ها با Na عبارت از $R-ONa$ و ---- است.
الف - H_2 ب - $NaOH$ ج - الدیهاidها د - کیتونها
- 7 - محصول اکسیدیشن دومی الکل اولی ---- اند.
الف - الدیهاidها ب - تیزاب‌ها ج - کیتونها د - هیجکدام
- 8 - الکل‌های دارای دو گروپ هایدروکسیل به نام --- یاد می‌شوند.
الف - الکل دومی ب - دو قیمتة ج - گلايکول د - ب و ج هر دو
- 9 - سایکلوپنتانول دارای فورمول جمعی می‌باشد.
الف - $C_6H_{13}OH$ ب - C_5H_9OH ج - $C_4H_{10}OH$ د - C_4H_7OH
- 10 - $C_6H_{13}OH$ فورمول جمعی است.
الف - $Hexanol$ ب - $CycloHexanol$ ج - پنتانول د - $pentanol$
- 11 - در نامگذاری زنجیر اساسی دارنده گروپ کاربینول در الکل‌ها به پسوند ختم می‌گردد.
الف - ol ب - al ج - ane د - one
- 12 - موجودیت در الکل‌ها سبب ازدیاد درجه غلیان آنها گردیده است.
الف - قوه واندروالس ب - رابطه هایدروجنی ج - قوه دای پول - دای پول د - همه
- 13 - از تعامل ایتلین با الکل حاصل می‌شود.
الف - القلی‌ها ب - $NaOH$ ج - آب د - تیزاب
- 14 - فورمول $Isopropyl propylether$ عبارت است از:
الف - $CH_3-CH_2-O-CH_3$ ب - $CH_3-\overset{|}{CH}-O-CH_2-CH_3$ ج - $(CH_3-\overset{|}{CH})_2O$ د - $CH_3-\overset{|}{CH}-O-CH_2-CH_2-CH_3$
- 15 - در تخمر الکولی کدام یکی از مواد ذیل به الکل تبدیل می‌گردد؟

- الف- نشایسته ب- بوره ج- گلوکوز د- نشایسته و بوره.
- 16 - از دی هایدریشن دو مالیکول ایتانول کدام یکی از مرکبات ذیل حاصل می گردد؟
- الف- الدیهاید ب- کیتون ج- دای ایتایل ایتر د- ایتر
- 17 - $(R)_2CHOH$ فورمول کدام یکی از مرکبات ذیل است؟
- الف- الکول سومی ب- الکول اولی ج- ایتر د- هیچکدام
- 18 - $(CH_3)_2CO$ فورمول کدام مرکب است؟
- الف- دای میتایل کیتون ب- الدیهاید ج- استون د- الف و ج هر دو
- 19 - اگر الدیهایدها ارجاع گردند، کدام یکی از مرکبات ذیل حاصل می گردد؟
- الف- الکول ب- تیزابها ج- ایترها د- گلایکولها


سؤالات تشریحی

1 - معادلات ذیل را تکمیل و توزین نمایید:




2 - از 200 گرم کلسیم کارباید 80% خالص چقدر ایتایل الکول حاصل خواهد شد؟ در صورتی که در تعامل مذکور 75% محصول ایتایل الکول باشد. کتله مالیکولی کلسیم کارباید 64 g/mol و از ایتایل الکول 46 g/mol است.

3 - فورمولهای ایتراهای را تحریر دارید که با الکولهای ذیل ایزومیر بوده باشد:



4 - نام سیستماتیک و معمولی ایتراهای ذیل را تحریر دارید:



5 - 0.2 mol دای ایتایل ایترا با محلول غلیظ HBr تعامل داده شده است. چند گرم الکول و چند گرم ایتایل بروماید در این تعامل حاصل خواهد شد؟ کتله مالیکولی ایتایل الکول 46 g/L است.

6 - با استفاده از کتب معتبر و مأخذ، مورد استعمال گلیسرین و ایتلین گلایکول را تحریر دارید که در متن کتاب هذا ذکر نشده باشد.

- 7 - به مقدار 50 گرام نمونه از ایتایل الکول 92% خالص غرض استحصال ایتلین به کار رفته است، که محصول به دست آمده 80% ایتلین را احتوا می نماید:
- الف - چقدر از الکل حاصل خواهد شد؟
- ب - مقدار ایتر حاصله از همین مقدار الکول چقدر خواهد بود؟
- کته مالیکولی ایتایل الکول 46 g/mol و از دای ایتایل ایتر 74 g/mol است.
- 8 - محصول و معادلات کیمیاوی ذیل را تکمیل کنید.
- الف - اگر میتایل الکول در موجودیت $K_2Cr_2O_7$ در محلول H_2SO_4 اکسیدیشن گردد.
- ب - اگر $2 - propanol$ در موجودیت $KMnO_4$ در محلول H_2SO_4 اکسیدیشن گردد.


الدهایدها و کیتونها



مرکبات آکسیجن دار هایدرو کاربن ها زیاد بوده؛ از این سبب به صنوف مختلف تقسیم شده اند، الدهایدها و کیتونها نیز مشتقات دیگر آکسیجن دار هایدرو کاربن ها است که در صنعت رول اساسی را دارا اند، این ها در ساختن رنگ ها، نگهداری اجساد حیوانات و در صنعت رابر، پلاستیک و عطر سازی و غیره مورد استعمال دارند. این مرکبات را در این فصل مطالعه نموده و با مطالعه این فصل خواهید دانست که الدهایدها و کیتونها چه نوع مرکبات بوده و از کدام منابع بدست می آیند؟ دارای کدام خواص بوده و در کدام عرصه ها استعمال می گردند؟



۹: الدیهاید و کتون (مرکبات گروپ کاربونیل)

گروپ کاربونیل ($C=O$) در مرکبات عضوی خاصی موجود بوده که برای همچو مرکبات خواص بخصوص داده است. رابطه دو گانه اکسیجن و کاربن در گروپ کاربونیل متشکل از یک رابطه (π) و یک رابطه سیگما (σ)، از تداخل مستقیم و پوشش اوربیتال SP^2 -hybrid اتوم کاربن با SP^2 -hybrid اتوم اکسیجن به میان آمده و رابطه π از تداخل یک اوربیتال غیر هایبرید شده $2P$ کاربن و اوربیتال غیر هایبرید شده آکسیجن حاصل گردیده است. در شکل ذیل مشخصات گروپ وظیفه‌ی کاربونیل ارائه گردیده است:



شکل (9 - 1) مشخصات روابط در گروپ کاربونیل


ساختمان مرکبات کاربونیل که عبارت از الدیهایدها و کتون‌ها است، باهم مشابه بوده، تنها در تعداد اتوم‌های هایدروجن متصل به کاربن گروپ کاربونیل از همدیگر تفاوت دارند که فورمول عمومی آن‌ها قرار ذیل است.



در این فورمول‌ها R و R' بقیه‌های عضوی بوده و می‌توانند الیفاتیکی یا اروماتیکی باشند.

۹-۱: الدیهایدها Aldehydes

الدیهایدها مشتقات اکسیجنی هایدروکاربن‌ها بوده که گروپ وظیفه‌ی کاربونیل ($C=O$) یک اتوم هایدروجن هایدروکاربن‌ها را تعویضی نموده است. (در فارم الدیهاید هر دو رابطه گروپ کاربونیل به طور استثنایی به دو اتوم هایدروجن متصل است) گروپ وظیفوی در الدیهایدها نیز گروپ کاربونیل بوده که یک الکترون ولانسی آن به هایدروجن و الکترون ولانسی دومی آن به بقیه‌های عضوی مرتبط است. بقیه‌های عضوی می‌توانند الیفاتیکی یا اروماتیکی باشند؛ به طور مثال: $R-CO-H$ فورمول عمومی الدیهاید هابوده (R عبارت از رادیکل‌های CH_3 ، C_2H_5 و غیره می‌باشد). فورمول الدیهایدهای اروماتیکی $Ar-C(=O)-H$ بوده که مثال آن را می‌توان بنزالدیهاید ارایه کرد:



فرمول عمومی الیهای یفاتیک عبارت از $C_nH_{2n}O$ است.

مثال

فرمول مالیکولی الیهید را در یافت کنید که در آن 40% کاربن از لحاظ کتلوی موجود باشد.
(کتله اتوم کاربن 12، هایدروجن 1 و آکسیجن 16 است.)

حل: کتله مالیکولی الیهید عبارت است از:

$$MC_nH_{2n}O = 12n + 1 \cdot 2n + 16 = 12n + 2n + 16 = 14n + 16$$

$$100g \quad \quad \quad 40g, \quad 100g \cdot 12n = (14n + 16) \cdot 40g$$

$$14n + 16 \quad \quad \quad 12n, \quad 12n = \frac{40g(14n + 16)}{100g}$$

$$12n = \frac{2(14n + 16)}{5}, \quad 12n = \frac{28n + 32}{5}, \quad 60n = 28n + 32$$

$$60n - 28n = 32n, \quad 32n = 32, \quad n = \frac{32}{32}, \quad n = 1$$

$$C_nH_{2n}O = C_1H_{2O} \quad , \quad CH_2O \text{ farmaldehyde}$$

مرکب مذکور فارم الیهید است.

حل نمایید




کثافت یک الیهید $1.8g/L$ است. به حرارت اطاق یک مول آن $22.4L$ حجم دارد، فرمول آن را در یافت کنید. (کتله اتومی هایدروجن $1amu$ ، کاربن $12amu$ و آکسیجن $16amu$ است.)

۹-۱-۱: نامگذاری


نامگذاری معمولی الیهیدها از تیزاب مربوطه که از ارجاع آن حاصل گردیده است، اشتقاق یافته، طوریکه کلمه *acid* - به *aldehyde* و پسوند *oic* نام تیزاب مربوطه به *yl* تبدیل می گردد:

مثال: *Propanoic acid* → *Propyl Aldehyde*

در نامگذاری آیوپک درازترین زنجیر دارنده گروپ کاربونیل انتخاب و نمبرگذاری می گردد، طوری که نمبر اول را کاربن گروپ کاربونیل دارا باشد، به اساس نمبرگذاری تعداد کاربن های زنجیر اساسی مشخص شده، در این صورت به عوض حرف *e* - اخیرنام هایدروکاربن مربوطه آنها، پسوند *al* - تحریر می گردد. نام معاوضه ها با نمبر کاربن زنجیر اساسی که در آن نصب است، در ابتدای نام گذاری قبل از نام زنجیر اساسی ذکر می گردد، در زیر مثال های نام گذاری الیهیدها با نام های معمولی و آیوپک ارائه شده است:




علاوه از نمبر گذاری به اعداد که از کاربن گروپ کاربونیل شروع می گردد، نمبر گذاری به حروف یونانی $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ (الف، بیتا، گاما و دلتا) که از کاربن دوم شروع می گردد، نیز صورت می گیرد که معاوضات به همان حروف های مربوطه یاد می گردد؛ به طور مثال:




خود را آزمایش کنید

1 - مرکبات زیر را نامگذاری نمایید:



2 - فورمول ساختمانی مرکبات زیر را بنویسید:




۹-۱-۲: خواص فیزیکی الدیهایها

مالیکول‌های قطبی الدیهاید نسبت به مرکبات غیر قطبی که کتله مالیکولی آنها با هم نزدیک باشند، به استثنای الکل‌ها نقاط غلیان بلند دارند؛ به طور مثال:

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| $CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$ | $CH_3 - CH_2 - \overset{\overset{O}{ }}{C} - H$ | $CH_3 - CH_2 - O - CH_3$ |
| <i>n</i> - propanol | propanal | methoxy ethane |
| <i>b.p.</i> 97.2°C | <i>b.p.</i> 49°C | <i>b.p.</i> 10.8°C |
| 60 | 58 | 60 |

فارم الدیهاید در حرارت اتاق (25°C) حالت گاز را دارا والدیهایدهای دارای 2 الی 12 کاربن حالت مایع و بلند تر از آن حالت جامد را دارند، الدیهایدهای پائین با مالیکول‌های آب رابطه هایدروجنی را برقرار می‌نمایند؛ لذا قابلیت خوب انحلال را در آب دارا اند. با افزایش کتله مولی قطبیت مالیکول‌ها کم گردیده و تاثیرات گروپ هایدروکاربنی بیشتر شده، روی همین اساس قابلیت انحلال آنها در آب کم می‌گردد.

فارم الدیهاید و دیگر الدیهایدها نسبت به فورمول الکل‌های اولی دو اتوم هایدروجن کمتر را دارا بوده، ازین سبب نام الدیهاید ازالکول‌های بدون هایدروجن (Alcohol dehydrogenation = Aldehyd) اشتقاق یافته است.



شکل (9 - 2) روابط هایدروجنی در الدیهایدها

الدیهایدهای که دارای کتله مولی کم بوده، بوی تیز دارد و با ازدیاد کتله مولی بوی آنها خوش آیند می‌گردد؛ لذا برای خوشبویی و هم چنان برای لذیذ شدن غذا استعمال می‌گردد. در جدول صفحه بعدی از خصوصیات الدیهایدها درج گردیده است:

جدول (9 - 1) عده از خصوصیات بعضی الیهایهای مهم

| نام | فورمول | $mp(^{\circ}C)$ | $bp(^{\circ}C)$ | $d_{20}^{\circ}C(g/mL)$ | Solubility (g / 100gH ₂ O) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|--|
| Formol dehyde (methanal) | HCHO | -92 | -21 | 0,815 | زیاد حل می شود |
| Acetaldehyde (ethanal) | CH ₃ CHO | -125 | 21 | 0,783 | زیاد حل می شود |
| Pro pionaldehyde (propanal) | CH ₃ -CH ₂ -CHO | -81 | 49 | 0,806 | زیاد حل می شود |
| n - butyraldehyde (butanal) | CH ₃ (CH ₂) ₂ -CHO | -99 | 76 | 0,817 | حل می شود |
| n - valeraldehyde (pentanal) | CH ₃ (CH ₂) ₃ -CHO | -91,5 | 102 | 0,810 | کمتر قابل حل |
| caproaldehyde (hexanal) | CH ₃ -(CH ₂) ₄ -CHO | -51 | 131 | 0,833 | کمتر قابل حل |
| benzenecarbaldehyd (benzaldehyde) | C ₆ H ₅ CHO | -26 | 178 | 1,42 | کمتر قابل حل |

۹-۱-۳: خواص کیمیای الیهایها


فعالیت کیمیای الیهایها نسبت به کیتونها فرق دارند؛ زیرا موجودیت هایدرجن و رابطه (π) در گروپ کاربونیل الیهایها فعالیت آنها را بیشتر ساخته که تعاملات جمعی را با هایدروجن و دیگر مرکبات انجام داده می تواند، الیهایها تعاملات مشخصه ذیل را انجام می دهند:

- 1 - تعامل جمعی را به اساس رابطه جفته گروپ کاربونیل انجام می دهند.
- 2 - تعامل تعویض اتوم آکسیجن به گروپ های وظیفوی مختلف نایتروجن دار.
- 3 - تعامل تراکم (Condensation reaction).

- 4 - تعاملات اکسیدیشن و ریدکشن.


۱- اکسیدیشن الیهایها

الیهایها توسط اکسیدانت های قوی؛ از قبیل: K_2CrO_4 یا $K_2Cr_2O_7$ ، $KMnO_4$ ، در موجودیت اسیدها، اکسیدی شده و در نتیجه کاربوکسیلیک اسیدها را تشکیل می دهند:



تجربه تولین (Tollen) (جیوه شیشه): مخلوط محلول آبی نایتريت نقره و امونیا را به نام معرف

تولین یاد می کنند، این محلول به شکل $[Ag(NH_3)_2]^+$ تبارز یافته واز آن در اکسیدیشن الیهای استفاده می نمایند. در این صورت نقره دارندهٔ نمبر اکسیدیشن +1 به نقرهٔ فلزی ارجاع شده و الیهای هابه آیون کاربوکسلیتها اکسیدی می گردند:



معرف تولین با بعضی الیهای در موجودیت حرارت و با بعضی دیگر الیهای در حرارت سرد تعامل می نماید. نقرهٔ فلزی محصول تعامل می باشد که بالای شیشه ترسب نموده و باعث جیوهٔ شیشه می گردد





شکل (9 - 3) تست تولین (Tollen test)

- الف- موجودیت محلول آبی سلورنایتریت و امونیا در بیکر پاک
 ب- شما می توانید رنگ محلول را ملاحظه نمایید که از اکسیدیشن ایتانل به اسیتیک اسید به میان آمده است.
 ج- نقرهٔ فلزی بالای جدار بیکر شیشه‌یی ترسب کرده، آن را جیوه نموده است. تمامی الیهای این نوع تعامل را انجام داده می توانند.

مثال: معادلهٔ تعامل معرف تولین را با الیهای ذیل تحریر دارید:

الف - فارم الیهای (formal dehyde) ب- اسیت الیهای (acet aldehyde)

حل:




فعالیت



یک گرام مخلوط گلائیکول و اسیت الیهای با معرف تولین تعامل نموده که به مقدار 1.08g آیون نقره حاصل گردیده است، مقدار اسیت الیهای در این محلول چقدر خواهد بود؟

فهلنگ تست

محلول معرف فهلنگ خاصیت قلوی را دارا بوده و متشکل از آیون Cu^{2+} و نمک پوتاشیم سودیم تارتاریت ($Na_2C_4H_4O_6$) است که به شکل کامپلکس موجود می‌باشد. زمانی که معرف فهلنگ با الدیهایدها تعامل نماید، رنگ آبی خیره آیون Cu^{2+} آن در کامپلکس به رنگ سرخ تیره سیاه اکساید یک ولانسه مس (Cu_2O) مبدل می‌گردد. در این صورت الدیهایدها همزمان به آیون کاربوکسلیت ($R-COO^-$) تبدیل می‌شود:



الدیهایدهای اروماتیک صرف توسط معرف تولین اکسیدی شده؛ اما توسط معرف فهلنگ اکسیدی شده نمی‌توانند.


اگر ایتانل به حرارت ($21^\circ C$) با محلول فهلنگ در یک تست تیوب انداخته شود، در این صورت CuO و اسیتیک اسید تشکیل می‌گردد.



شکل (9 - 4) تعامل ایتانل با معرف فهلنگ

تعامل الدیهایدها با $KMnO_4$

الدیهایدها با پوتاشیم پر منگانیات تعامل نموده، در نتیجه الدیهایدها به کاربوکسلیک اسید اکسیدی می‌گردد و Mn از (+7) به (+2) ارجاع می‌گردد:




تفاعلات جمعی الدیهایدها


تفاعلات عمده مرکبات دارنده گروپ کاربونیل عبارت از تعاملات جمعی است، در این تعاملات رابطه (π) گروپ ($C=O$) قطع گردیده که اتم کاربن چارج مثبت قسمی (δ^+) و اتم آکسیجن چارج منفی قسمی (δ^-) رابنا بر الکترونیگاتیوتی خود حاصل نموده و زمینه تعاملات بعدی میسر می‌گردد؛ در نتیجه اتم کاربن و اتم آکسیجن روابط جدید را با اتم‌های دیگر برقرار ساخته و مرکبات جدید تشکیل می‌گردد.

تفاعلات جمعی الدیهایدها با هایدروجن

هایدروجن با الدیهایدها در موجودیت کتلست Ni و Pt تعامل نموده، در نتیجه الکول‌های اولی را تولید می‌کنند:



H




H
methanal

methanol


تفاعل جمعی الدیهایدها با الکولها

در موجودیت کتلست آنهایدرایت تیزاب (anhydrous acid) الکول‌ها با الدیهایدها تعامل نموده، طوریکه گروپ الکوکسی $R-O-$ به اتم کربن گروپ کاربنیل و H^+ بالای اتم اکسیجن گروپ کاربونیل نصب می‌گردد، در مرحله اول هیمی اسیتال (hemiacetal) و در مرحله دوم Acetal را بوجود می‌آورد:



مرحله اول:



مثال نمونه




مرحله دوم




تفاعل جمعی الدیهایدها با HCN


محصول این تعامل سیانوهایدرینها است. HCN گاز زهری بوده، پس تعامل مستقیم این گاز با الدیهایدها مجاز نیست. نمک ایون CN^- را که با فلزات فعال از قبیل Na و K تشکیل می‌دهند، با تیزاب‌های غیرعضوی H_2SO_4 یا H_3PO_4 تعامل می‌نماید، در نتیجه HCN را به دست می‌آورند که بعد از تشکیل شدن آن را با الدیهایدها تعامل داده، الدیهاید سیانوهایدرینها را به دست می‌آورند:





Aldehyde Cyano hydrine



Benz aldehydde Cyanohydrine





Secondary Alcohol



پولیمیر الیهیدها خواص الیهیدها را نداشته؛ زیرا گروپ الیهیدی در آن موجود نیست. نقاط غلیان پولیمیرها نسبت به الیهیدهای مربوطه بلند تر می باشد.

تعامل سوختن الیهیدها (Combustion reaction)

محصول تعامل سوختن الیهیدها: آب، CO_2 و انرژی می باشد، معادله عمومی تعامل الیهیدها قرار



فعالیت





تعامل جمعی اسیت الیهید را با مرکبات ذیل تحریر دارید:

الف- آب ب- هایدروجن ج- میتایل الکول د- $NaHSO_3$

۹-۱-۴: استحصال الیهیدها


۱- از اکسیدیشن الکول های اولی: اگر الکول اولی اکسیدیشن گردد، الیهیدها حاصل می گردد: حالت وسطی اکسیدیشن الکول اولی الی تیزاب های کاربوکسلیک اسید، الیهیدها می باشند، این تعامل در موجودیت کتلست صورت می گیرد:




عامل اکسیدی کننده این تعامل $K_2Cr_2O_7$ است.

۲- دی هایدروجنیشن الکول اولی


اگر الکول های اولی در موجودیت کتلست مخلوط کاپر (II) اکساید و کرومیم (III) اکساید ($CuO \cdot Cr_2O_3$) دی هایدروجنیشن گردد، الیهیدها حاصل می شود. میتود آن طوری است که بخارات الکول را در درجه حرارت $250-300^\circ C$ از کاپر کرومات داغ عبور می دهد، از هر مالیکول الکول اولی یک مالیکول هایدروجن تجرید می گردد. از الکول های دارای کاربن های کمتر در موجودیت کتلست نیز مالیکول هایدروجن جدا می شود:





استحصال الدیهایدها از ارجاع تیزاب‌های عضوی

اگر تیزاب عضوی ارجاع گردد، در نتیجه الدیهایده حاصل می‌گردد. در این تعامل مخلوط بخارات یک تیزاب عضوی و فارمیک اسید را از کنتلست TiO_2 در حرارت $300-350^\circ C$ عبور می‌دهد، در نتیجه الدیهایده، CO_2 و H_2O تشکیل می‌شود.



۹-۱-۵: بعضی از الدیهایدهای مهم

۱- فارم الدیهایده

اولین مرکب الدیهایدها فارم الدیهایده بوده که توسط بو تلیروف (کیمیادان روسی) در سال 1359 کشف شده است، فارم الدیهایده گاز بی‌رنگ و دارای بوی تیز می‌باشد. ساده‌ترین مرکب الدیهاها، فارم الدیهایده یا میتانل بوده که فارمل نیز نامیده می‌شود. فارم الدیهایده مایع است که به طور عموم به شکل محلول با آب غرض نگهداری اجساد موجودات حیه از آن استفاده می‌شود، دود چوب‌ها نیز دارای مقدار فارم الدیهایده است و این مرکب کشنده می‌باشد. در آب منحل و محلول 40% آن فارملین نامیده شده که استعمال زیاد دارد. فارم الدیهایده در صنایع


مواد ساختمانی و وسایل خانه استعمال می‌شود.

فارم الدیهایده تعاملات جمعی (پولی‌میرایزیشن) را با امونیا انجام داده و مرکب مهم و با ارزش هگزامتیلین تترا امین (یوروتروپین) را تشکیل می‌دهد.

یوروتروپین در طبابت برای شستن و پاک کردن نل ادرار، در صنعت برای سخت کردن سرش و صمغ و به همین ترتیب آن را در مواد غذایی علاوه می‌کند تا از خراب شدن آن جلوگیری شود:




شکل (9 - 5) محلول فارملین




هگزامتیلین تترا امین (یوروتروپین)

$$3\text{H}-\text{C}\begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{H} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \quad \text{O} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{H}-\text{C} \quad \text{C}-\text{H} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{O} \quad \text{C}-\text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array} \quad \text{Trioxo methylene}$$


اگر فارم الیهاید را حرارت دهیم حالت کرسطی سفید را اختیار می نماید. این کرسطی ها در 123°C ذوب می گردد. در این پولیمیر از 50 تا 100 مونومیر الیهاید موجود می باشند. پولیمیر تشکیل شده خطی بوده و در صورت حرارت دادن به آن به فارم الیهاید تجزیه می گردد:




اگر میتانل در موجودیت تیزاب غلیظ گوگرد اکسیدایز گردد، در نتیجه فارم الدیهاید حاصل می شود. در لابراتوارها محلول های تیزابی K_2CrO_4 یا $K_2Cr_2O_7$ ، $KMnO_4$ را به حیث عامل اکسیدیشن به کار می برند:


$$2CH_3OH + O_2 \xrightarrow{Cu, 250C^\circ} 2H - \underset{\substack{| \\ H}}{C} = O + 2H_2O$$

اسیت الدیهاید خالص مایع بی‌رنگ و زهری بوده و در آب منحل می‌باشد. نقطهٔ غلیان آن 21°C است. از اسیت الدیهاید استتیک اسید، اتانول و رابر مصنوعی را استحصال می‌نماید:







اسید الدیهاید

Ethanol


اسیت الدیهاید در حرارت اتاق و موجودیت تیزاب گوگرد پولیمیر حلقوی (پارا الدیهاید) را تشکیل می‌دهد که تراپیر می‌باشد و در حرارت 0°C برای میر دیگری را تشکیل می‌دهد که آن را پارا الدیهاید می‌نامند:



پارا الدیهاید طعم میوه مانند را داشته در 124°C به غلیان می‌آید. مرکب خواب آور بوده، از این سبب از آن در ساینس و طب به حیث ماده خواب آور (خواب مقنطیسی) استفاده به عمل می‌آورند. پارا الدیهاید دوباره در موجودیت تیزاب رقیق گوگرد به اسیت الدیهاید تبدیل می‌گردد. میتا الدیهاید ماده جامد است و در حرارت 122°C تصعید می‌کند. در جنگ جهانی اولی عساکر آن را برای گرم نگهداری خود به عوض ایتانول جامد استعمال می‌کردند و از تترامرایزشن اسیت الدیهاید بدست می‌آید:




وقتی که اسیت الدیهاید در موجودیت محلول غلیظ القلی قوی جوش داده شود، مالیکول‌های شان با هم وصل گردیده، پولیمیرهای خطی را بوجود می‌آورند:



۹-۲: کیتون‌ها (Ketones)


در مرکباتی که گروپ وظیفوی کاربونیل با دو بقیه الکایل مرتبط باشد، این نوع مرکبات به نام کیتون‌ها یاد می‌گردند. فورمول عمومی کیتون‌ها $\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}}-\text{R}'$ است. الدیهاید‌ها و کیتون‌های که عین فورمول جمعی را داشته باشند، ایزومیر یکدیگر اند؛ به طور مثال:



۹-۲-۱: نامگذاری کیتون‌ها


۱- نامگذاری معمولی

در نامگذاری معمولی بقیه‌های R (گروپ‌های الکیل) یا Ar (گروپ ارین) به طور جداگانه ذکر می‌گردد در صورتی که مشابه باشند کلمه دای به شکل پیشوند به آن‌ها علاوه می‌گردد و کلمه کیتون به آن‌ها علاوه می‌گردد:




خود را آزمایش کنید

کیتون‌های ذیل را به طریقه معمولی نامگذاری نمایید:




۲- نامگذاری کیتون‌ها به اساس آیوپک (IUPAC)

در نام گذاری کیتون‌ها زنجیر دراز را که گروپ کاربونیل به آن نصب باشد، انتخاب نموده و نمبر گذاری می‌نمایند، نمبر گذاری را از انجام زنجیر آغاز می‌نمایند که گروپ کاربونیل کوچکترین نمبر را به خود اختیار نماید؛ در این صورت ابتدا نمبر کاربن‌های که معاوضه به آن نصب است تحریر و بعد از آن نام معاوضه‌ها ذکر می‌گردد که با همان کاربن ارتباط دارند؛ سپس نمبر کاربن گروپ کاربونیل قبل از نام زنجیر طویل تحریر و در نام زنجیر دراز که دارنده گروپ کاربونیل است، حرف e اخیر نام هایدرو کاربن مربوطه آن به one تعویض می‌گردد:



فعالیت

مرکبات ذیل را به سیستم IUPAC نامگذاری نمایید:



۹-۲-۲: خواص فیزیکی کیتون‌ها

کیتون‌های دارای کتلهٔ مولی کوچک به حالت مایع بوده و کیتون‌های دارندهٔ ۱۱ کاربن و زیاد تر از آن به حالت جامد می‌باشند. کیتون‌های مایع در آب منحل و با مالیکول‌های آب رابطهٔ هایدروجنی را برقرار می‌نمایند. کیتون‌های مایع به حیث محلل رنگ‌های کیمیای به کاربرده می‌شود. انحلالیت کیتون‌ها در آب با تزايد کتلهٔ مالیکولی شان کم می‌شود و بوی آن‌ها گوارا بوده و به الدیهایدها شباهت دارد. با وجودی که مالیکول کیتون‌ها قطبی بوده؛ اما گروپ کاربونیل آن‌ها رابطهٔ هایدروجنی را برقرار کرده نمی‌توانند؛ زیرا هایدروجن در مالیکول آن‌ها با آکسیجن مرتبط نیست. با تزايد اتم‌های کاربن گروپ‌های الکایل، قطبیت آن‌ها کم می‌شود. کیتون‌های که کتلهٔ مولی مشابه به هایدروکاربن‌ها و ایتراها دارند، نقطهٔ غلیان بلند و نظر به الکول مشابه، نقطهٔ غلیان پایین دارد:

| | | | | |
|---------|--|--|---|---|
| | $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$ | $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ | $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_3 \end{array}$ | $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$ |
| Formula | $\text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3$ | $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ | $\text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_3$ | $\text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3$ |
| Name | isobutane | ethyl methyl ether | di methyl Ketone | iso propanol |
| bp | -120°C | $10,8^\circ\text{C}$ | 56°C | $82,3^\circ\text{C}$ |



جدول (۹ - ۲) خواص فیزیکی کیتون‌های مهم

| Name نام | structure ساختمان | np(°C) | bp(°C) | d20°C (g / mL) | Solubility in water (g/100mLH ₂ O) |
|--------------|--|--------|--------|----------------|---|
| Acetone | $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{CH}_3$ | -95 | 56 | 0,790 | α |
| Butanone | $\text{CH}_3-\text{COCH}_2-\text{CH}_3$ | -86 | 80 | 0,805 | زیات حل |
| 2-Pentanone | $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ | -78 | 102 | 0,812 | قابل حل |
| 3-Pentanone | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ | -39 | 102 | 0,816 | قابل حل |
| 2-Hexanone | $\text{CH}_3-\text{CO}-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}_3$ | -57 | 127 | 0,830 | کمتر منحل |
| Acetophenone | $\text{CH}_3\text{COC}_6\text{H}_5$ | 21 | 202 | 1,028 | غیر منحل |
| Benzophenone | $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_5$ | 48 | 306 | 1,100 | غیر منحل |


۹-۲-۳: خواص کیمیای کیتون‌ها

در گروپ کاربونیل کیتون‌ها اتم‌های هیدروجن موجود نبوده؛ بنابراین به حیث عامل ارجاع فعالیت کرده نمی‌توانند؛ این مرکبات می‌توانند در تعاملات ارجاعی به حیث عامل اکسیدیشن سهمیم گردند. اگر کیتون‌ها مدت زیادی در موجودیت اکسیدانت‌های قوی حرارت داده شود، زنجیر کاربنی آن‌ها قطع و در نتیجه به تیزاب عضوی تبدیل و یا اینکه به طور کامل تجزیه می‌گردد؛ به این اساس کیتون‌های

متناظر به دو تیزاب مختلف و کیتون‌های غیر متناظر به چهار اسید مختلف تجزیه می‌گردد:



اتوم کاربن و اتوم اکسیجن گروپ کاربونیل کیتون بعد از شکستن زنجیر کاربنی فعال شده، با وجودی که در مقایسه با الدیهای کمتر فعال اند؛ اما با آنهم تعاملات جمعی را انجام داده می‌توانند:




۱- تعامل جمعی کیتون‌ها با هایدروجن


کیتون‌ها با هایدروجن در موجودیت کتلست‌های فلزی (Pd و Pt, Ni) تعامل نموده، در نتیجه الکل دومی را تشکیل می‌دهند که در این صورت کیتون‌ها ارجاع می‌گردد:

۲- تعامل جمعی کیتون‌ها با آب

اگر کیتون‌ها در آب حل گردند، حالت بی‌ثبات هیدرایتی کیتون به میان آمده، طوری که اتوم هایدروجن آب بالای اکسیجن گروپ کاربونیل و گروپ -OH آب بالای اتوم کاربن گروپ کاربونیل نصب می‌گردد، کیتون منحل در آب و حالت هیدریتی در یک تعادل قرار می‌داشته باشد:




نوت: در الکل‌های که دو گروپ هایدروکسیل به یک اتوم کاربن نصب باشند بی‌ثبات اند.




۹-۲-۴: استحصال کیتون‌ها

۱- از اکسیدیشن الکل‌های دومی می‌توان کیتون‌ها را به دست آورد، کیتون‌های حاصل شده از الکل مربوطه دارای نقطه غلیان پایین تر اند، از این سبب کیتون‌ها به حالت بخارات استحصال می‌گردند:




بخارات الكول دومى را از بالای ($CuO \cdot Cr_2O_3$) گرم عبور داده، يك ماليكول هايديروجن از الكول

مربوطه جدا و کیتونها حاصل می گردند:



3- از تعامل جمعی آب و فامیل اسیتلین نیز می‌توان کیتون‌ها را به دست آورد:

در موجودیت تیزاب گوگرد و نمک سیماب ($HgSO_4$) بالای الکینها آب علاوه شده، در نتیجه



۹-۲-۵: مرکب مهم کیتون‌ها

اسیتون Acetone

اسیتون به نام پروپانون و یا دای میتایل کیتون هم یاد می شود. این مرکب مایع بی رنگ دارای بوی تیز و مفر بوده، در $56^{\circ}C$ به جوش می آید، در آب، الکل و ایترا به هر نسبت حل شده و محلول خوب مواد عضوی است، رنگ های ورنس، رنگ ناخن، پلاستیک، رنگ های روغنی و مشتقات آن، صمغ و لاک را در خود حل کرده می تواند. اسیتون به مقدار زیاد در ادرار اشخاصی که از مرض شکر رنج می برند موجود می باشد، ادرار این اشخاص بوی اسیتون را دارا است. اسیتون با شعله آبی می سوزد و به مشکل اکسیداز می گردد.



استحصال اسیتون

۱- تقطیر چوب: از محصولات مجموعی تقطیر چوب، 0.5% آن اسیتون است که می‌توان آن را به واسطه تقطیر تدریجی جدا ساخت.

2 - از حرارت دادن کلسیم اسیتات نیز می توان

قرار تجزیہ ذیل اسیتون را بہ دست آورد:

از حرارت دادن کلسیم استیات خشک استیون حاصل می‌گردد.



شکل (9-6) دستگاه استحصال استیون از کلسیم اسیتات

خلاصه فصل نهم



* گروه کاربونیل ($\text{C}=\text{O}$) در مرکبات عضوی خاصی موجود بوده که برای همچو مرکبات خواص به خصوص داده است.

* الیهای مشتقات اکسیجینی هایدروکاربنها بوده که گروه وظیفوی کاربونیل ($\text{C}=\text{O}$) یک اتوم هایدروجن هایدروکاربنها را تعوضی نموده است.

* نامگذاری معمولی الیهای از تیزاب مربوطه که از ارجاع آن حاصل گردیده است، اشتقاق یافته، طوری که کلمه *acid* - به *aldehyde* و پسوند *oic* نام تیزاب مربوطه به *yl* تبدیل می گردد.

* مالیکولهای قطبی الیهای نسبت به مرکبات غیر قطبی که کتله مالیکولی آنها با هم نزدیک باشند به استثنای الکولها نقطه غلیان بلند دارند.

* فعالیت کیمیاوی الیهای نسبت به کیتونها فرق دارند؛ زیرا موجودیت هایدروجن و رابطه (π) در گروه کاربونیل الیهای فعالیت آنها را بیشتر ساخته که تعاملات جمعی را با هایدروجن و دیگر مرکبات انجام داده می تواند.

* فارم الیهای مایع است که به طور عموم به شکل محلول با آب غرض نگهداری اجساد موجودات حیه از آن استفاده می شود و محلول 40% آن فارملین نامیده شده که استعمال زیاد دارد. فارم الیهای در صنایع مواد ساختمانی و وسایل خانه استعمال می شود.

* از ارجاع استیک اسید، اسیت الیهای و از اکسیدیشن الکول دومی استیون بدست می آیند.
* اسیت الیهای خالص مایع بی رنگ و زهری بوده و در آب منحل می باشد. نقطه غلیان آن 21°C است. از اسیت الیهای استیک اسید، ایتانول و رابر مصنوعی را استحصال می نماید.


* فورمول عمومی کیتونها $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$ یا $\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{||}{\text{C}}}-\text{R}$ یا $\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{||}{\text{C}}}-\text{R}'$ است. الیهای و کیتونهای که عین فورمول جمعی را داشته باشند، ایزومیر یکدیگر اند.

* از اکسیدیشن الکول اولی الیهای و از اکسیدیشن الکولی دومی کیتون حاصل می گردد.
* استیون به نام پروپانون و یا دای میتایل کیتون هم یاد می شود. این مرکب مایع بی رنگ دارای بوی تیز و مفر بوده، در 56°C به جوش می آید،

* در مجموع محصولات تقطیر چوب، 0.5% استیون موجود است که می توان آن را به واسطه تقطیر تدریجی جدا ساخت.

سؤالات فصل نهم

سؤالات چهار جوابه

- 1 - فورمول گروپ وظیفوی کاربونیل --- می باشد.
- الف - $(C=S)$ ب - $(C=O)$ ج - $(C-OH)$ د - $(COOH)$
- 2 - محصول تعامل الیهاید با HCN ، ----- می باشد.
- الف - الیهاید سیانو هاید رین ب - سینوهاید رازین ج - الف و ب هر دو د - هیچکدام
- 3 - پاراسیت الیهاید مرکب حلقوی بوده، توسط حرارت به --- تبدیل می گردد.
- الف - فارم الیهاید ب - اسیت الیهاید ج - اسیتون د - اسیتیک اسید
- 4 - فورمول  --- است.
- الف - دای فینایل کیتون ب - نفتالین ج - انتراسین د - فینول
- 5 - از تجزیه کتلستی کیتون غیر متناظر --- نوع تیزاب عضوی تشکیل می گردد.
- الف - دو ب - چهار ج - یک د - سه
- 6 - $R-C(=O)-R'$ فورمول کیتون است.
- الف - متناظر ب - غیر متناظر ج - الیهاید د - اسیتون
- 7 - نام مرکب $CH_2=CH-CH_2-C(=O)-H$ می باشد.
- الف - 1 - al - buten ب - 3 - al - buten ج - 1-propenyl aldehyde د - ب و ج هر دو
- 8 - محصول احتراق فارمیک اسید و تیزاب های دیگر عضوی عبارت ----- است:
- الف - CO_2 و H_2O ب - H_2O, CO_2 و الیهاید ج - $R-C(=O)-H + CO_2 + H_2O$ د - ب و ج صحیح است.
- 9 - محصول نهایی تعامل معرف گرینارد و الیهاید --- است:
- الف - الکل دومی و $Mg(OH)X$ ب - الکل اولی و $Mg(OH)X$ ج - الکل سومی و $Mg(OH)X$ د - هیچکدام
- 10 - سبب فعالیت الیهایدها ----- می باشد.
- الف - گروپ کاربونیل ب - داشتن رابطه (π) ج - داشتن H و رابطه (π) در گروپ کاربونیل د - تمامی فوق
- 11 - در اخیر نام الیهاید حرف اخیر e الکان های مربوطه به ---- پسوند عوض می گردد:
- الف - one - al ج - ene - ol

12 - نام مرکب $C_6H_5-CH_2-\overset{O}{\overset{||}{C}}-H$ عبارت است از:
 الف- فینایل ایتانل ب- فینایل اسیت الدیهاید ج- الف و ب صحیح است
 د- بنز الدیهاید

13 - گروپ الکاوکسی عبارت است از:

الف- $R-H$ ب- RO^- ج- $R-O-R$ د- $-O-$

14 - از ارجاع الدیهاید کدام مواد ذیل حاصل می گردد؟
 الف- الکان ها ب- الکول ها ج- الکول اولی د- کیتون ها

سؤالات تشریحی

1 - معادلات ذیل را تکمیل کنید:

$$CH_3-\overset{O}{\overset{||}{C}}-H + 2KMnO_4 + 6HCl \longrightarrow$$

$$C_6H_5-\overset{O}{\overset{||}{C}}-H + HCN \longrightarrow$$

 2 - نامگذاری الدیهاید و کیتون های ذیل را به اساس IUPAC تحریر دارید:

الف- $C_6H_5-\overset{O}{\overset{||}{C}}-H$ ب- $CH_3-\overset{O}{\overset{||}{C}}-H$ ج- $CH_3-\overset{O}{\overset{||}{C}}-CH_2-CH_2-CH_3$
 3 - فورمول ساختمانی الدیهاید های ذیل را تحریر دارید

الف- 3-pentene-2-al ب- 2-methylbutanal

ج- nitrobenz aldehyde د- 3,3,3-tri chloro propanal

4 - 2.464L اکسیجن در شرایط STP با 1.44g بخارات یک الدیهاید تعامل نموده است، فورمول مالیکولی الدیهاید مذکور چه خواهد بود؟ (C=12g/mol, H=1g/mol, O=16g/mol)

5 - کدام الکول ها باید اکسیدی گردند تا مرکبات ذیل تشکیل گردد؟

الف form aldehyde ب- 2-methyl propanal ج- 2,2-dimethylbutanal

6 - کدام فورمول های ساختمانی را برای کیتون دارای فورمول جمعی $C_5H_{10}O$ تحریر کرده می توانید؟ آن ها را رسم کنید.

7 - کدام فورمول مالیکولی را کیتون دارا خواهد بود؟ در صورتی که به مقدار 0.2mol آن با 22.6g HCN تعامل نموده باشد.

8 - اگر 0.2mol کیتون با 35.2g مرکب $NaHSO_3$ تعامل نموده باشد، کتله مالیکولی کیتون کدام خواهد بود؟ در صورتی که مقدار مرکب حاصل 35.2g می باشد. (C=12g/mol, O=16g/mol, H=1g/mol)

فصل دهم

تیزاب‌های عضوی (کاربوکسیلیک اسیدها)




یکی از مشتقات مهم دیگر اکسیجن‌دار مرکبات عضوی عبارت از کاربوکسیلیک اسیدهای عضوی بوده که گروپ وظیفوی کاربوکسیل ($\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{OH} \end{smallmatrix}$) در ترکیب آن‌ها شامل است، این گروپ به نام گروپ وظیفوی تیزاب‌ها نیز یاد می‌شود.

در مورد تیزاب‌های عضوی؛ از قبیل: تیزاب سرکه، تیزاب شیر و غیره آشنایی دارید، جز اساسی شحمیات تیزاب‌های شحمی می‌باشد. در این فصل در مورد تیزاب‌های عضوی معلومات بدست می‌آورید و می‌آموزید که منابع طبیعی تیزاب‌ها کدام اند؟ در کدام موارد زنده گی انسان‌ها کاربرد دارند؟ کدام فعالیت کیمیاوی را دارا اند؟ با آموزش این فصل به سؤالات فوق و امثال آن‌ها جواب ارائه خواهید کرد.


۱۰- ۱: تیزاب‌های عضوی

گروپ کاربوکسیل (Group Carboxylic)

گروپ کاربوکسیل (-C-O-H) متشکل از گروپ کاربونیل و هایدروکسیل بوده که اکثر شان به شکل COOH - تحریر می‌گردد؛ اما رابطه بین اتم‌های هایدروجن و کاربن در آن هرگز موجود نمی‌باشد. این گروپ می‌تواند به حیث پروتون دهنده (Proton - Donator) عمل نمایند. و به آ یون (COO^-) به نام کاربوکسلات مبدل گردد، در این آ یون هردو اتم آکسیجن عین ارزش را دارا اند؛ زیرا الکترون‌های π در آن در حالت ریزونانس می‌باشد:




تمام مرکباتی که دارای گروپ کاربوکسیل در ترکیب مالیکولی خود باشند، بنام مرکبات کاربوکسیلیک اسید یاد می‌شوند. مشخصات رابطه‌یی در مالیکول فارمیک اسید که در زیر تحریر گردیده است، موجودیت اتم‌های آکسیجن، هایدروجن و کاربن با الکترونیگاتیویته مختلف مالیکول آن‌ها را قطبی می‌سازد:



۱۰- ۱- ۱: نامگذاری اسیدهای عضوی

۱- نامگذاری معمولی

نام معمولی تیزاب‌های عضوی از نام لاتینی یا یونانی منابع تیزاب مربوطه گرفته شده است، به طور مثال: *Formic acid* از نام لاتین مورچه (*Formica*) گرفته شده است که از تقطیر اجساد مورچه سرخ استحصال گردیده است، نام استیتیک اسید (*acetic acid*) از نام لاتین سرکه (*acetum*) گرفته شده است، نام (*butyric acid*) از نام لاتین مسکه (*butyrum*) و نام *stearic acid* از نام لاتین چربی (*Stear*) گرفته شده است؛ به همین ترتیب تمام نام‌های معمولی به اساس منابع استحصال تیزاب مربوطه گذاشته شده اند. اگر در همچو تیزاب‌ها معاوضه‌های مختلف موجود باشند؛ در این صورت کاربن‌ها را از لحاظ رابطه با گروپ کاربوکسیل به حروف یونانی الفبا (α)، بیتا (β)، گاما (γ)، دلتا (δ) و غیره علامه گذاری نموده، طوری که کاربن مرتبط به گروپ کاربوکسیل به الفبا α و غیره مشخص می‌گردند؛ بطور مثال:









جدول (10 - 1) نام‌های معمولی ده (10) اسید عضوی و منابع آنها

| تعداد کاربن | ساختمان | نام معمولی | منابع |
|-------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | $HCOOH$ | فارمیک اسید | مورچه (لاتین-فارمیکا) |
| 2 | CH_3COOH | استیک اسید | سرکه (لاتین-استیوم) |
| 3 | CH_3-CH_2-COOH | پروپوئیک اسید | شیر، مسکه و پنیر (یونانی-پوین، فت) |
| 4 | $CH_3(CH_2)_2COOH$ | بوتریک اسید | مسکه (لاتین-بوتیروم) |
| 5 | $CH_3(CH_2)_3COOH$ | والریک اسید | ریشه گل سنبل (لاتین-والیر) |
| 6 | $CH_3(CH_2)_4COOH$ | کپروئیک اسید | بزها (لاتین-کاپر) |
| 7 | $CH_3(CH_2)_5COOH$ | اینان توئیک اسید | خوشه پیچک (لاتین-اوینانت) |
| 8 | $CH_3(CH_2)_6COOH$ | کپریلیک اسید | بزها (لاتین-کاپر) |
| 9 | $CH_3(CH_2)_7COOH$ | پیلارگوئیک اسید | گل شمعدانی (یکنوع نبات افریقایی) |
| 10 | $CH_3(CH_2)_8COOH$ | کپریک | بزها (لاتنی - کاپر) |


۲- نام گذاری تیزاب‌ها به اساس IUPAC

در نامگذاری IUPAC زنجیر طویل دارای گروه کاربوکسیل را دریافت و انتخاب نموده و نمبر گذاری می‌نمایند، نمبر گذاری را از کاربن گروه کاربوکسیل آغاز می‌نمایند. در نامگذاری اول نمبر کاربن مربوط به معاوضه‌ها و بعد از آن نام معاوضه‌ها را تحریر نموده و در اخیر نام زنجیر طویل حاوی کاربوکسیل را تحریر کرده، طوری که حرف e اخیر نام هایدروکاربن مربوطه (الکان، الکین و الکاین) (پساوند -e) را به -oic- تعویض و کلمه اسید (acid) را به آن علاوه می‌نمایند؛ به طور مثال:




2-methyl - 3-chloro propenoic acid


اگر تیزاب‌های عضوی بیشتر از یک گروه کاربوکسیل در ترکیب مالیکولی خود داشته باشند، در این صورت در اخیر نام هایدروکاربن (الکان، الکین و الکاین) مربوطه شان پسوند های Trioic, dioic و غیره ذکر و کلمه اسید به آن علاوه می‌گردد:



2-methyl -1,3- pro panedioic acid






benzoic acid



1,2 - benzenedi carboxylic acid

o - phthalic acid



2 - hydroxypropane





1,2,3 - tricarboxylic acid

(citric acid)

مشق و تمرین نمایید



1 - مرکبات تیزابی ذیل را به طریقه معمولی و سیستماتیک (آیوپک) نامگذاری نمایید:



2 - فورمولهای ساختمانی مرکبات تیزابی ذیل را تحریر نمایید:

a) 2-methyl butanoic acid

b) 5-amino pentanoic acid

c) 2-methyl-3-hydroxy butanoic acid

d) 1,5-pentane dioic acid

e) α-methyl-β-chloropropanoic acid

f) α-oxypropionic acid


۱۰-۱-۲: خواص فیزیکی تیزابهای عضوی

سه مرکب اولی تیزابهای هایدروکاربنهای مشبوع یک قیمته به حالت مایع بی رنگ و دارای بوی تیز اند، تیزابهای هایدروکاربنهای مشبوع یک قیمته که تعداد کاربن شان از 4 - 9 اند، بوی مسکه و روغن بادام را دارا اند. به خاطر بوی گوارای مسکههای مصنوعی و شیرینیها، تیزابهای مذکور را به آنها علاوه می نمایند. تیزابهای هایدروکاربنهای مشبوع که بیشتر از ده اتوم کاربن را دارا اند، بی بو بوده و حالت موم و کریم را دارا اند. تیزابهای که از 14-22 اتوم کاربن را در ترکیب مالیکولی خود دارند، در روغنهای نباتی و حیوانی موجود اند؛ از این سبب به نام تیزابهای شحمی یاد می شوند. چون در مالیکولهای تیزابهای عضوی بین دو مالیکول آن دو رابطه هایدروجنی موجود است؛ لذا قوه جذب بین مالیکولهای آنها به مقایسه با مرکبات آکسیجن دار دیگر که دارای کتلههای مشابه باشند، زیاد تر است؛ از این سبب نقطه غلیان شان بلندتر است:




رابطه هایدروژنی در آب

رابطه هایدروژنی در الکل



رابطه هایدروژنی در تیزاب عضوی




شکل (10 - 1) رابطه هایدروژنی بین دومالیکول تیزاب

جدول (10 - 2) بعضی خواص فیزیکی تیزاب‌های عضوی و انحلالیت آن در 25°C


| نام ایوپیک | نام معمولی | فرمول | mp(°C) | bp(°C) | انحلالیت آب (g/100mL) |
|------------------------|----------------|--|--------|-----------------------|-----------------------|
| Methanoic acid | Formic acid | HCOOH | 8,5 | 100,5 | به هر نسبت |
| Ethanoic acid | Acetic acid | CH ₃ COOH | 16,6 | 118 | به هر نسبت |
| Propanoic acid | Propionic acid | CH ₃ CH ₂ COOH | -12,5 | 141 | به هر نسبت |
| Butanoic acid | n-butyric acid | CH ₃ (CH ₂) ₂ COOH | -8 | 164 | به هر نسبت |
| Pentanoic acid | n-valeric acid | CH ₃ (CH ₂) ₃ COOH | -19 | 187 | 4,97 |
| Hexanoic acid | Caproic acid | CH ₃ (CH ₂) ₄ COOH | -3 | 205 | 1,08 |
| Heptanoic acid | Enanthoic acid | CH ₃ (CH ₂) ₅ COOH | -10,5 | 223 | 0,26 |
| Propenoic acid | Acrylic acid | CH ₂ =CHCOOH | -13 | 141 | کمتر منحل |
| benzenecarboxylic acid | Benzoic acid | C ₆ H ₅ COOH | 122 | 250 | 0,34 |
| 2-hydroxy benzoic acid | Salicylic acid | | 159 | 211 | 0,22 |
| Ethanedioic acid | Oxalic acid | (COOH) ₂ | 189 | 149-160 قابل تصعید | 15,00 |

تیزاب‌های عضوی قرار تیوری ارهینوس در آب حل می‌گردند که در نتیجه تفکیک گردیده و معادله تعادل عمومی آن‌ها قرار ذیل است:




$$K_a = \frac{[R-\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[R-\text{COOH}]}$$

ثابت آیونایزیشن تیزاب‌ها عبارت است از:



شکل (10 - 2) رابطه هایدروژنی بین مالیکول‌های آب و تیزاب‌های عضوی

فارمیک اسید نسبت به تمام تیزاب‌های عضوی بلندترین ثابت آیونایزیشن را در آب است:



formic acid formate ion

$$K_a = 1.8 \cdot 10^{-4}$$



فعالیت: حل کنید

pH محلول 0.5molar اسیتیک اسید را محاسبه نمایید، در صورتیکه $K_a = 1.8 \cdot 10^{-5}$ باشد.

۱۰-۳: خواص کیمیاوی تیزاب‌های عضوی


تفاعلات تیزاب‌های عضوی که به گروپ تیزابی آن‌ها مربوط است، به دو طریقه صورت می‌گیرد: یکی این که رابطه بین هایدروجن و آکسیجن ($O-H$) قطع گردیده و پروتون (H^+) تولید گردد، دیگر این که رابطه بین کاربن و آکسیجن ($C-O$) قطع گردیده و OH - تشکیل می‌گردد. بعضی وقت تعاملات تعویضی زنجیر هایدروکاربن مشبوع قطع شده و تعاملات جمعی زنجیر هایدروکاربن‌های غیر مشبوع با تیزاب‌ها نیز صورت گرفته می‌تواند:

۱- تعاملات به ارتباط قطع رابطه $O-H$


اگر اتم هایدروجن گروپ $COOH$ - به شکل یون H^+ جدا گردد، در نتیجه انیون نمک حاصل می‌گردد که در ترکیب آن انیون تیزابی موجود بوده و پسوند $-oic$ - آنیون تیزابی در انیون آن به پسوند $-ate$ - تعویض گردیده و کلمه تیزاب به کلی حذف می‌شود؛ بطور مثال: آیون (CH_3COO^-) به نام استیت یاد می‌شود.

تشکیل نمک

کاربوکسیلیک اسیدها با فلزات فعال تعامل نموده، در نتیجه نمک تشکیل و H_2 آزاد می‌گردد:



carboxylic acid salt



formic acid + sodium \longrightarrow sodium formate + hydrogen

مثال


در شرایط استاندارد به مقدار 24g یک مونواسید با فلز مگنیزیم تعامل نموده، به مقدار 4.48L گاز هایدروجن آزاد گردیده است، فورمول مالیکولی کاربوکسیلیک اسید کدام است؟

حل: مقدار مول‌های هایدروجن آزاد شده را دریافت می‌نمایم:

$$1\text{mol}H_2 - 22.4\text{L}$$

$$n - 4.48\text{L} \quad n = \frac{1\text{mol} \cdot 4.48\text{L}}{22.4\text{L}} = 0.2\text{mol}$$

معادله تعامل قرار ذیل است:



$$2\text{mol} - 1\text{mol}H_2 \quad n = \frac{0.2\text{mol} \cdot 2\text{mol}}{1\text{mol}} = 0.4\text{mol}$$

$$n - 0.2\text{mol}$$

چون $n = \frac{m}{M}$ است؛ پس داریم که:

$$M = \frac{m}{n} = \frac{24g}{0.4mol}$$

$$M = 60g/mol$$

در این صورت فورمول تیزاب مذکور عبارت است از:

$$C_nH_{2n+1}COOH = 12n + 1 \cdot 2n + 1 + 12 + 32 + 1 = 60$$


$$14n = 60 - 46 = 14 \quad n = \frac{14}{14} = 1$$

$$n = 1 \quad CH_3COOH$$

پس فورمول تیزاب عبارت از CH_3COOH است.

تفاعلات خنثی سازی تیزاب‌های عضوی

کاربوکسیلیک اسیدها مانند تیزاب‌های غیرعضوی با القلی‌ها تعامل نموده، نمک و آب را تشکیل می‌دهند. چون اسیدهای عضوی تیزاب‌های ضعیف‌اند، تعامل آن‌ها با القلی‌ها، نمک و آب را تشکیل می‌دهند که محلول همین نمک و آب خواص القلی را دارا است؛ زیرا با آب هایدرولیز گردیده، تیزاب ضعیف والقلی قوی را تشکیل می‌دهند:







oxalic acid

potassium oxalate

مشق و تمرین کنید



معادلات تعاملات زیر را تکمیل نمایید:




۲- تعاملات تیزاب‌ها به اساس قطع رابطه C-O

گروپ $(-OH)$ از گروپ کاربوکسیل $(-COOH)$ جدا می‌گردد. باقی مانده آن را $(R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-)$ به نام اسایل (acyl) یاد می‌کنند. تجزید گروپ $-OH$ از گروپ کاربوکسیل سبب تولید گروپ‌های مختلف دیگر می‌گردند.

تشکیل اسید آنهیدراید ها



اگر تیزاب عضوی تحت عملیه دی هایدریشن قرار گیرد، اسید آنهیدراید‌ها تشکیل می‌گردد،

گروپ وظیفوی اسید آنهیدراید $(-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-)$ بوده و در ختم نام تیزاب مربوطه کلمه آنهیدراید اضافه می‌گردد:



ایستریفیکشن (تشکیل ایستر)



در تعاملات ایستریفیکشن گروه $-OH$ اسیدها با H^+ الکلها آب را تشکیل نموده و گروه اسایل $(R-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}})$ با گروه الکو کساید $(R-O-)$ ایسترا را تولید می کنند، این تعامل در موجودیت سلفوریک اسید به حیث کتلست صورت می گیرد:



فعالیت





کدام اسید و کدام الکل باهم تعامل نمایند تا ایسترهای ذیل تشکیل گردد؟



تفاعلات ریدکشن تیزابهای عضوی



در موجودیت کتلستهای قوی از قبیل $LiAlH_4$ یا $NaBH_4$ گروه کاربوکسیل تیزابها ارجاع و به الکل تبدیل می گردد:




۱۰-۱-۴: استحصال تیزابهای عضوی

۱- از اکسیدیشن الکل اولی

اگر الکل اولی اکسیدیشن گردند، الدیهاید و در صورتی که الدیهاید اکسیدیشن گردند، تیزاب عضوی حاصل می گردد، در این تعامل محلولهای اسید توسط $KMnO_4$ و $K_2Cr_2O_7$ اکسیدی شده و مرکبات مذکور به حیث اکسیدانتها استعمال می گردند:




به همین ترتیب در موجودیت مقدار کمی از اکسیدانتها بنزایل الکول به بنزویک اسید تبدیل می گردد:





۲- استحصال اسیدهای عضوی از اکسیدیشن الکینها

اگر الکینها با محلول القلی گرم $KMnO_4$ یک جا گردند، تعامل اکسیدیشن آنها صورت گرفته، زنجیر الکینها از قسمت رابطه جفته قطع گردیده و در نتیجه دو مالیکول تیزاب عضوی حاصل می گردد:




۳- استحصال اسیدهای عضوی از کاربونیشن معرف گرینارد

یکی از میتودهای خوب استحصال کاربوکسیلیک اسیدها عبارت از تعامل معرف گرینارد با کاربن دای اکساید است که معادله تعامل آن قرار ذیل است:





تیزاب سرکه را می توان چنین استحصال نمود.



۴- استحصال کاربوکسیلیک اسیدها از هایدرولیز مشتقات کاربوکسیلیک اسیدها

ایسترها در موجودیت کتلت های تیزابی هایدرولیز گردیده، به الکول و تیزاب عضوی پارچه می شوند:



فعالیت



در ذیل مواد تعامل کننده و محصول تعامل آنها ذکر گردیده است، شما معادله کیمیای و کتلت مواد سریع کننده تعامل را مشخص و معادلات تعاملات آن را تحریر نمایید:

a: n-pentanol \longrightarrow n-pentanoic acid

b: cyclopentane \longrightarrow cyclopentanoic acid

c: 1,4 - dibromobutane \longrightarrow 1,4 - hexanedioic acid

d: ethyl formate \longrightarrow formic acid

۱۰-۲: بعضی از کاربوکسیلیک اسیدهای مهم

۱- فارمیک اسید


فرمول مشرق فارمیک اسید ($H-\overset{O}{\parallel}C-OH$) است که ساده ترین کاربوکسیلیک اسید می باشد. درنیش و زهر بسیاری از حشرات وجود دارد، بخصوص در زنبورها و مورچه ها موجود است. نام آن هم از نام لاتین مورچه (فارمیکا) گرفته شده است.



شکل (10 - 3) زنبور منبع فارمیک اسید

خواص فزیک


فارمیک اسید در آب خوبتر حل و در هایدروکاربن ها کمتر منحل است، در محلول های آبی به آیون ها تفکیک می گردد:




فارمیک اسید مایع بی رنگ بوده، تند، دود کننده و تخریب کننده می باشد و نقطه غلیان $100^\circ C$ است.

خواص کیمیاوی

اگر به ساختمان فارمیک اسید ($H-\overset{O}{\parallel}C-OH$) دقت گردد، به آسانی دانسته می شود که در حقیقت از دو گروپ وظیفوی یکی هایدرواکسیل (OH) و دیگر کاربونیل ($-\overset{O}{\parallel}C-$) با هم یکجا شده فرمول فارمیک اسید را تشکیل داده اند، به این اساس فارمیک اسید و نمک های آن نظر به تیزاب های دیگر کاربوکسیلیک و نمک های آن به آسانی اکسیدایز می گردد. در مرحله اول کاربونیکیک اسید ناپایدار حاصل شده و بالاخره به H_2O و CO_2 تجزیه می گردد:




در صورتی که تیزاب گوگرد به حیث کتلست به کاربرده شود، در حرارت پایین به CO و آب تجزیه می گردد:





استحصال فارمیک اسید


1 - فارمیک اسید را زیاده‌تر از اکسیدیشن فارم‌الدهید بدست می‌آورند:



2 - در صنعت ابتدا نمک فارمیک اسید را از تعامل $NaOH$ و CO در فشار و حرارت بلند بدست می‌آورند؛ سپس این نمک را با H_2SO_4 یا H_3PO_4 تعامل می‌دهد، در نتیجه فارمیک اسید حاصل می‌گردد:



3 - در لابراتوارها فارمیک اسید را از حرارت دادن محلول آبی اگزالیک اسید در موجودیت گلیسرین به دست می‌آورند:




فعالیت



استحصال فارمیک اسید

مواد و سامان مورد ضرورت: بالون، ترمومتر، کاندنسر استیند مع پایه‌ها، ایرلین مایر، اگزالیک اسید، گلیسرین و آب

طرز العمل: یک مقدار معین محلول اگزالیک اسید را در یک بالون انداخته، آن را قرار شکل (4 - 10) در استیند محکم نمایید، دهن بالون را توسط سرپوش کارکی دوسوراخه بسته نمایید، در یک سوراخ سرپوش ترمومتر و در دیگر آن نل زانوخم را قرار داده و این نل را به کاندنسر وصل سازید، در نل خروجی کاندنسر ایرلین مایر را به خاطر جمع آوری محصول تعامل قرار دهید؛ سپس محتویات داخل بالون را حرارت دهید، مشاهدات تانرا تحریر داشته معادلۀ تعامل را تحریر دارید.



شکل (4 - 10) استحصال فارمیک اسید

مورد استعمال فارمیک اسید


فارمیک اسید مانند الدیهایدا خواص ضد عفونی خوبی را دارا است، یک مقدار آن در غسل موجود بوده که از گنده شدن و خراب شدن آن جلوگیری می کند. از فارمیک اسید در نگهداری اجساد حیوانی و در دباغی (چرم گری) استفاده به عمل می آورند. به صورت عموم فارمیک اسید به حیث مواد اولیه تولید کودها، را بر و پلاستیک به کار برده می شود. نمک کلسیمی فارمیک اسید نرم کننده خوب آب های سخت می باشد.

۲- استیک اسید

فورمول مشرح استیک اسید $CH_3 - \overset{O}{\parallel} C - OH$ است که یکی از اسیدهای مهم عضوی بوده، در سرکه به غلظت 4-6% موجود است، ذایقه و بوی سرکه را داشته نام آن نیز از نام لاتین سرکه (*acetum*) گرفته شده است، در $16^\circ C$ حالت جامد را دارا بوده و به شکل یخ ظاهر می گردد؛ ازین سبب تیزاب جامد سرکه به نام ایتانویک اسید جامد یاد می گردد.


خواص فیزیکی

تیزاب خالص سرکه کرستل های بیرنگ داشته، در درجه حرارت $16.7^\circ C$ ذوب و در درجه حرارت $118^\circ C$ غلیان می نماید. در آب حل شده، درجه آیونیزیشن آن بسیار پایین است که در حدود 3% است:




خواص کیمیاوی

استیک اسید مانند دیگر اسیدهای عضوی خواص تیزابی را نشان داده، با فلزات و القلی ها تعامل نموده نمک را تشکیل میدهد؛ به طور مثال: با سودیم قرار معادله ذیل تعامل نموده نمک سودیم استات را تشکیل می دهند:



استحصال استیک اسید

1 - استیک اسید را میتوان از اکسیدیشن کتلاستی ایتانول در موجودیت انزایم به دست آورد: تیزاب سرکه را از سرکه آب میوه، انگور و سیب تهیه نموده که آن را تیزاب سرکه طبیعی یاد می نمایند:



2 - تیزاب سرکه بر خلاف فارمیک اسید به آسانی اکسیدایز نمی گردد؛ بنابراین نمک ها استات را با H_2SO_4 تعامل داده، استیک اسید را استحصال می نمایند. در سابق استیک اسید را از چوب قسمی بدست می آوردند که چوب را در غیاب هوا به مایع تبدیل می نمودند، استیک اسید موجود در مایع


چوب را توسط CaO به $(CH_3 - \overset{O}{\parallel} C - O)_2Ca$ تبدیل نموده و بعد از آن جدا می نمودند، نمک استات را

توسط حرارت قرار شکل ذیل به اسیتیک اسید مبدل می ساختند:




شکل (10 - 5) استحصال اسیتیک اسید از حرارت دادن سودیم اسیتات

در این تعامل میتانول و اسیتون نیز تولید شده که آن را تبخیر نموده با علاوه کردن H_2SO_4 تیزاب سرکه 99.5% خالص را تهیه می نمایند:



3 - در صنعت تیزاب سرکه را با علاوه کردن آب بالای اسیتیلین که در نتیجه اسیتیلین اکسیدایز می گردد، استحصال می نمایند:



مشق و تمرین کنید

در شرایط استاندارد چقدر گاز هیدروجن از تعامل 150 گرم محلول 18 % اسیتیک اسید با مگنیزیم حاصل خواهد شد؟


مورد استعمال تیزاب سرکه

تیزاب سرکه محلل خوب مومها، صمغ و تیل است. از نمکهای آن مرکبات با ارزش عضوی حاصل می گردد؛ بطور مثال: متان را از نمک سودیم اسیت و اسیتون را از کلسیم اسیتیت استحصال می نمایند. المونیم اسیت برای جلا دار ساختن رنگ، برای جلای کاغذ، تکه ها و در دوا سازی به حیث انتی سبتیک و دواهای ضد اسهال بکار میبرند. سلولوز اسیتیت که یکی از مشتقات تیزاب سرکه است، برای ساختن لاک، شیشه ناشکن، جلای رنگهای روغنی و در ساختن تارها مورد استفاده قرار می گیرد. به همین ترتیب اسیتیک اسید مواد اولیه ساختن رابر است.

۳- اکزالیک اسید (Oxalic acid)


اکزالیک اسید در برگهای تنباکو، ترشک، بادنجان رومی، نعناع و مارچوبه پیدا می شود. نام آن هم از نام لاتین ترشک (بادنجان رومی) (Oxolis) گرفته شده است.

اگرالیک اسید ماده جامد بلوری سفید بوده، در 175°C تصعید می نماید. این مرکب ماده زهری بوده و نمک کلسیمی آن در گرده ها ترسب می نماید. از نگاه خواص کیمیاوی فعال ترین تیزاب های عضوی دو قیمته می باشد. این مرکب را از حرارت دادن سودیم فارمیت حاصل می دارند:




۴- ملونیک اسید (Malonic acid)

بار اول ملونیک اسید را از اکسیدیشن ملیک اسید (اسید سیب $\text{HOOC}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{COOH}$) بدست آورده؛ از این سبب نام آن هم از آن مشتق گردیده است، این مرکب مایع بی رنگ بوده و در 136°C به جوش می آید. در آب و الکل حل شده و از حرارت دادن آن بالاتر از 140°C استیک اسید حاصل می گردد:



استیک اسید ملونیک اسید

اگر سیانو استیک اسید هایدرو لایز گردد ملونیک اسید حاصل می گردد:



۵- تیزاب های شحمی

اولین مرکب اسید شحمی بیوتاریک اسید است که دارای چهار کاربن بوده و فورمول آن $(\text{C}_3\text{H}_7 - \text{COOH})$ می باشد. اسیدهای شحمی به اسیدهای مشبوع و غیر مشبوع تقسیم شده اند.

الف- تیزاب های شحمی مشبوع

۱- پالمیتیک اسید $(\text{C}_{15}\text{H}_{31} - \text{COOH})$

ماده جامد بلوری سفید با درجه ذوبان 36°C می باشد. از شحمیات حیوانی و تیل نباتی بدست می آیند. در آب غیر منحل و در الکل و ایترا حل می گردد.



شکل (10 - 6) شمع مخلوط ستیاریک اسید و پالمیتیک اسید ، نارایال منبع پالمیتیک اسید

۲- ستیاریک اسید ($C_{17}H_{35}-COOH$)


ستیاریک اسید (Stearic acid) جامد کرسطی است که درجه ذوبان آن $70^{\circ}C$ بوده، در الکول گرم و اتر عادی حل می گردد، یکی از تیزاب های معمولی شحمی است. در گلیسرایدهای شحمی حیوانی و نباتی موجود است. پالمیتیک اسید و ستیاریک اسید را باهم به شکل جامد مخلوط نموده شمع را به دست می آورند.

ب- تیزاب های شحمی غیر مشبوع

در مالیکول های شحمیات بین اتوم های کاربن - کاربن رابطه دوگانه موجود بوده، این نوع شحمیات حالت مایع را دارا است که نسبت به شحمیات مشبوع غیر ثابت اند و در اثر هایدروجنیشن به موم یا جامد تبدیل می گردند، این نوع شحمیات از اسیدهای شحمی غیر مشبوع به دست می آیند که در ذیل مطالعه می گردد:

اولئیک اسید ($C_{17}H_{33}-COOH$)

اولئیک اسید بطور خالص به شکل گلیسیرایدها در تیل های زیتون، بادام، پنبه دانه و گل آفتاب پرست یافت می شود و به حالت مایع: بی رنگ، بی بو و بی ذایقه بوده که به $13^{\circ}C$ - ذوب می گردد. $\frac{1}{3}$ حصه تمامی تیزاب های شحمی که در شیر گاو، رنگ ها، مواد شستشو و غیره را تشکیل داده است، از ارجاع ستیاریک اسید حاصل می گردند:



خلاصه فصل دهم

- یکی از مشتقات مهم دیگر اکسیجن دار هایدروکاربن عبارت از تیزاب ها یا کاربوکسیلیک اسیدهای عضوی بوده که گروپ وظیفوی کاربوکسیل ($\begin{smallmatrix} O \\ || \\ C-OH \end{smallmatrix}$) در ترکیب آنها شامل است.
- در نامگذاری IUPAC تیزاب ها، زنجیر طویل دارای گروپ کاربوکسیل را در یافت و انتخاب نموده و نمبر گذاری می نمایند، نمبر گذاری را از کاربن گروپ کاربوکسیل آغاز می نمایند. در نامگذاری اول نمبر کاربن مربوط به معاوضه ها و بعد از آن نام معاوضه ها را تحریر نموده و در اخیر نام زنجیر طویل حاوی کاربوکسیل را تحریر نموده، طوری که حرف e اخیر نام هایدروکاربن مربوطه (الکان، الکین و الکاین) را به oic- تعویض و کلمه اسید (acid) را به آن علاوه می نمایند.
- سه مرکب اولی تیزاب های هایدروکاربن های مشبوع یک قیمته به حالت مایع بی رنگ و دارای بوی تیز اند، تیزاب های هایدروکاربن های مشبوع یک قیمته که تعداد کاربن شان از 4 - 9 اند بوی مسکه و روغن بادام را دارا اند از این سبب در مسکه های مصنوعی علاوه می گردند.

- تعاملات تیزاب‌های عضوی که به گروپ تیزابی آن‌ها مربوط است، به دو طریقه صورت می‌گیرد، یکی این که رابطه بین هایدروجن و آکسیجن ($O-H$) قطع گردیده و پروتون (H^+) تولید گردد، دیگر این که رابطه بین کاربن و آکسیجن ($C-O$) قطع گردیده و OH - تشکیل می‌گردد.
- کاربوکسلیک اسیدها مانند تیزاب‌های غیر عضوی با القلی‌ها تعامل نموده، نمک و آب را تشکیل می‌دهند.
- در تعاملات ایستریفیکیشن گروپ OH - اسیدها با H^+ الکول‌ها آب را تشکیل نموده و گروپ اسایل ($-C(=O)-$) با گروپ الکا کساید ($R-O-$) ایسترا تولید می‌کند.
- اگر الکول اولی اکسیدیشن گردند، دی‌هاید و در صورتی که دی‌هاید اکسیدیشن گردند، تیزاب عضوی حاصل می‌گردد.
- تیزاب‌های عضوی مشهور عبارت اند از: فارمیک اسید، استیک اسید، اگزالیک اسید، ملونیک اسید، پالمیتیک اسید، ستیاریک اسید و اولئیک اسید است.
- فارمیک اسید؛ مانند: دی‌هاید‌ها خواص ضد عفونی کننده خوبی را دارا است، یک مقدار آن در عسل موجود بوده که از گنده شدن و خراب شدن آن جلوگیری می‌کند.
- تیزاب سرکه محلل خوب موم‌ها، صمغ و تیل است، از نمک‌های آن مرکبات با ارزش عضوی حاصل می‌گردد
- اولین مرکب اسید شحمی بیوتاریک اسید است که دارای چهار کاربن بوده و فورمول آن (C_4H_7-COOH) است. اسیدهای شحمی به اسیدهای مشبوع و غیر مشبوع تقسیم شده اند.

سوالات فصل دهم

سوالات چهار جوابه

- 1 - رابطه هایدروجن در بین مالیکول تیزاب های عضوی نظر به الکول ها --- است.
- الف - مستحکم ب - سست ج - یک سان د - هیچ کدام
- 2 - فورمول پالمیتیک اسید ---- است.
- الف - $C_{15}H_{31}COOH$ ب - C_3H_7COOH ج - $C_{17}H_{35}COOH$ د - $C_{17}H_{33}COOH$
- 3 - کدام فورمول کاربوکسیلیک اسید ذیل را خواهد داشت که در ترکیب آن 40.68% کاربن، 54.234% آکسیجن و 5.06% هایدروجن باشد.
- الف - $HCOOH$ ب - CH_3COOH ج - $HOOC(CH_2)_2COOH$ د - $\begin{array}{c} COOH \\ | \\ COOH \end{array}$
- 4 - نام درست مرکب $CH_3 - \underset{\substack{| \\ CH_3}}{CH} - \underset{\substack{| \\ NH_2}}{CH} - \underset{\substack{| \\ OH}}{CH} - COOH$ عبارت است از:
- الف - 1,2-dihydroxy-3-amino-4-methylpentanol

ب- 2-hydroxy-3-amino-4-methylpentanoic acid

ج- 1-hydroxy-2-amino-3-methylpentanoic acid

د- 1,2-dihydroxy-3-amino-4-methylpentanoic acid

5- محلول $10^{-2} m$ فارمیک اسید دارای کدام pH خواهد بود؟ $K_a = 10^{-4}$

الف- 2 ب- 3 ج- 4 د- 5

6- کدام یک از مرکبات ذیل دارای نقطه غلیان بلند خواهد بود؟

الف- $CH_3CH_2CH_2CH_3$ ب- CH_3COOH ج- CH_3CH_2COOH

د- $HOOC-CH_2CH_2CH_3COOH$

7- کدام یکی از مرکبات ذیل کیتو اسید است؟




الف- $HO-C(=O)OH$ ب- $O=C(OH)-H$ ج- $CH_3-C(=O)-C(=O)-OH$ د- هیچکدام

8- کدام کمیت ذیل کتله مالیکولی ایستر را نشان میدهد؟ در صورتی که در تشکیل آن به مقدار 60g

کاربوکسیلیک اسید و 46g الکل تعامل نموده باشد.

الف- 60 ب- 124 ج- 106 د- 88

9- کدام یکی از تعاملات ذیل نوع ایستریفیکیشن است؟



الف- تعامل 1 ب- تعامل 2 ج- تعامل 3 و 1 د- هیچکدام

10- فورمول 2,2-di methyl propanoic acid عبارت از ---- است:

الف- $(CH_3)_2CH-C(=O)OH$ ب- $(CH_3)_2CCOOH$ ج- $CH_3-\underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{CH}}-CH_2-COOH$ د- $(CH_3)_3C-COOH$

11- نام مرکبی دارای فورمول $HO-\underset{\text{CH}_2-COOH}{\overset{\text{CH}_2-COOH}{|C|}}$ عبارت است از:

الف- ستیاریک اسید ب- ستریک اسید ج- ادیپیک اسید د- هیچکدام

سؤالات تشریحی

1 - نام، فورمول و تمام ایزومیری کاربوکسیلیک اسید دارای فورمول جمعی $C_5H_{10}O_2$ را تحریر دارید.

2 - فورمول عمومی کاربوکسیلیک اسیدها کدام است؟ فرق بین کاربوکسیلیک اسیدها، الدیهایدها و کتون هارا تحریر دارید.

3 - نام IUPAC تیزاب‌های ذیل را با فورمول آن‌ها تحریر دارید:

الف - *Oxalic acid* ب - *Adipic acid* ج - *Malonic acid*

4 - معادله تعامل بنزوئیک اسید را با مواد ذیل تحریر دارید:

الف - Na ب - Ca ج - CH_3-OH د - Br_2

5 - فورمول‌های مالیکولی و شرح اسیدهای عضوی ذیل را تحریر دارید:

الف - *2-oxypropanoic acid* ب - *2,3-dimethylbutanoic acid*

ج - *2-amino-4-bromopentanoic acid*

6 - اسیدهای شحمی چیست؟ چرا به این نام یاد می‌شوند؟ تشریحات لازمه ارائه بدارید.

7 - کدام یکی از تیزاب‌های ذیل نوع تیزاب‌های شحمی اند؟ معلومات دهید.

الف - CH_3COOH ب - C_2H_5COOH ج - C_3H_7COOH د - $C_{15}H_{31}COOH$

8 - در ترکیب تیزاب یک اساسه کاربوکسیلیک اسید 55.8% کاربن، 7% هایدروجن و 37.2% آکسیجن شامل است، فورمول این تیزاب را تحریر دارید.

9 - توضیح دهید که چرا کاربوکسیلیک اسیدها در آب نسبت به الکل‌ها بیشتر حل می‌گردد؟

10 - اسیدهای ذیل را به اساس IUPAC نامگذاری نمایید:

الف - $CH_3CH=CH-CH_2-COOH$

ب - $HOOC-\underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH}-CH_2-CH_2COOH$

ج - $CH_3-\underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH}-CH=CH-COOH$


د - $CH_3-\underset{\begin{array}{c} | \\ CN \end{array}}{CH}-CH=CH-COOH$

علاوه از مشتقات اکسیجنی هایدروکاربن‌ها، مشتقات دیگر این مرکبات نیز موجود است که از جمله مشتقات نایتروجنی آن‌ها است، در پهلوی مشتقات نایتروجن‌دار هایدروکاربن‌ها یک نوع آن‌ها امین‌ها بوده و به نام مشتقات امونیایی (ammonia) نیز یاد می‌شوند، یعنی یک یا دو و یا سه اتوم‌هایدروجن NH_3 را گروپ‌های هایدروکاربن‌ها تعویض نموده و یا این که یک یا چندین اتوم‌هایدروجن هایدروکاربن‌ها توسط گروپ امین تعویض گردیده باشند. در این فصل راجع به امین‌ها معلومات حاصل نموده و می‌آموزید که امین‌ها کدام نوع مرکبات بوده و دارای کدام خواص اند؟ چطور میتوان آن را استحصال نمود و منابع طبیعی آن‌ها کدام مواد است؟ در کدام عرصه‌های حیاتی و صنعتی به کار می‌روند؟


۱۱-۱: ساختمان و صنف بندی آمین‌ها

گروپ وظیفوی آمین‌ها NH_2 - بوده که به نام گروپ آمینو (Amino) یاد می‌شود. نایتروجن این گروپ حالت SP^3 ، هایبرید را دارا بوده که به یک یا چند اتوم کاربن در ارتباط می‌باشد، در صورتیکه با چندین معاوضه‌های عضوی رابطه داشته باشد، نوعیت آمین‌ها را تعیین نموده و به نام‌های آمین اولی، دومی و سومی یاد می‌شوند:

آمین‌های اولی عبارت از آمین‌های اند که نایتروجن آمونیا بایک اتوم کاربن هایدروکاربن‌ها مرتبط است. آمین‌های دومی عبارت از آمین‌های اند که اتوم نایتروجن آمونیا با دو گروپ هایدروکاربن ارتباط داشته باشد. آمین‌های سومی عبارت از آمین‌های اند که اتوم نایتروجن آمونیا با سه گروپ هایدروکاربن‌ها مرتبط است. فورمول‌های عمومی آمین‌ها قرار ذیل است:



R - میتواند بقیه الکایل و یا ارایل باشد. مثال انواع آمین‌ها قرار ذیل است:






شکل (11 - 1) مدل آمونیا، آمین اولی، دومی و سومی (از چپ به راست)




شکل (10 - 2) ساختمان آمونیا


رادیکال‌های عضوی که در ساختمان آمین‌ها با اتوم نایتروجن رابطه دارند، دارای ساختمان نزدیک به چهار وجهی بوده؛ زیرا زاویه چهار وجهی 109.5° و آمونیا 107.3° است. مالیکول آمین‌ها ساختمان هندسی هرم (pyramid) را دارا می‌باشد:

اگر گروپ آمین اتوم‌های هایدروجن اتوم‌های کاربن زنجیر هایدروکاربن‌های مشبوع یا غیر مشبوع راتعویض نموده باشد، این نوع آمین‌ها را به نام آمین‌های الیفاتیکی و اگر به حلقه ارومات ارتباط داشته باشد، به نام آمین‌های اروماتیکی یاد می‌شود.






triphenyl amine



di phenyl amine



phenyl amine (aniline)

مثال: فورمول ساختمانی مرکبات ذیل را تحریر دارید:





a- di methyl ethyl amine

b- 2- amino pentane

c- 1.4- di amino- 1.4-butanediol


d- methyl ethyl iso propyl amine

حل:




معلومات اضافی

امین‌های هترو سیکلیک هم موجود است که در حلقه‌های کاربنی شامل بوده و مرکبات مهم اند این‌ها عبارت اند از پایرولیدین، پایریدین و پایرول‌ها می‌باشند که فورمول‌های ساختمانی آن‌ها قرار ذیل است:



مورفین، کوکائین و نیکوتین نوع امین‌ها است که در کوکنار و تنباکو موجود بوده و فورمول ساختمانی آن‌ها قرار ذیل است:



در حدود 500 نوع الکالوئید (Alkaloide) مهم بیالوجیکی شناخته شده است که مورفین الکالوئید اصلی موجود در تریاک است. الکالوئید مرکب نایتروجن دار القلی است؛ این مرکب در سال‌های قدیم برای تسکین دردها کار می‌رفت و ماده مسکن ساده است که بدون بیهوشی درد مریض را تسکین می‌دهد. در جریان جنگ‌های داخلی آمریکا برای تسکین درد مجروحان از مورفین استفاده می‌نمودند. مورفین عوارض جانبی داشته، فشار خون را پایین آورده و سبب مرگ مریضان می‌گردد.

وهم باعث اعتیاد می گردد؛ از این سبب غرض تنقیص عوارض جانبی آن هیرویین را از آن استحصال نموده اند که هیرویین عوارض جانبی کم داشته؛ اما معتاد کننده خطرناک است که ترک کردن آن برای معتادین مشکل است. کوکائین و غیره مواد نشه اور همه مرکبات نایتروجن دار اند.




شکل (11 - 3) کوکنار منبع مورفین و هیرویین

۱-۱-۱: نامگذاری آمین ها


طوری که در دروس گذشته ارائه شد، آمین ها برحسب تعداد اتوم های کاربن و رابطه آن ها به اتوم نایتروجن، به سه دسته تقسیم شده اند:

آمین اولی ($R-NH_2$)، آمین دومی ($R-\bar{N}-R$) و آمین سومی ($R-\bar{N}-R$) میباشند. نوع چهارم آیون ها به شکل آیون چهاروجهی $[R_4N^+]$ است که مثال آن را می توان تترا میتایل امونیم ($[(CH_3)_4N^+]$) (Tetramethyl amonium) ارائه کرد. بقیه R می تواند الفاتیک، سکلیک، ویا اروماتیک باشند.


در نام گذاری آمین ها بقیه های متصل شده به نایتروجن با پسوندهای yl در آغاز نام با در نظر داشت تقدم حرف اول نام شان از الفبای انگلیسی ذکر گردیده و به تعقیب آن کلمه آمین (amine) علاوه می گردد؛ به طور مثال: نام مرکبی دارای فورمول جمعی $(C_2H_5)_2N-C_3H_7$ که فورمول شرح آن قرار ذیل می باشد، چنین تحریر می گردد:



در بعضی از موارد در نامگذاری آمین ها می توان نمبر گذاری اتوم های کاربن مالیکول مرکبات را عملی کرد؛ به طور مثال:




آمین های اولی را به دو طریقه در سیستم IUPAC نام گذاری می کنند که عبارت از الکایل آمین (alkylamine) امینو الکان (alkaneamine) می باشد؛ به طور مثال:




خود را آزمایش کنید


مركبات زیر را نام گذاری نمایید




امین‌های دومی و سومی را طوری نام گذاری می‌نمایند که زنجیر طویل الکایل را به حیث زنجیر اصلی الکایل قبول نموده و دیگر بقیه‌ها را به حیث معاوضه‌های نصب شده به نایتروجن قبول می‌نمایند و طوری نام گذاری می‌گردند که سمبول نایتروجن (N) را قبل از ذکر نام معاوضه‌ها تحریر و بین سمبول نایتروجن و معاوضه‌ها علامه (-) را تحریر می‌نمایند. در صورتی که معاوضه‌ها هر دو یکسان باشد؛ در این صورت N-N کلمه دای که به معنی دو است، قبل از نام معاوضه‌ها ذکر می‌گردد، اگر زنجیر طویل بدون معاوضه‌ها باشد به نام الکالان یاد شده و حرف e آن به کلمه *amine* تعویض می‌گردد، در صورتی که زنجیر طویل (اصلی) دارای معاوضه‌ها، یعنی منشعب باشد، زنجیر طویل هایدروکاربن مربوطه نمبر گذاری گردیده و نمبر گذاری از کاربن دارنده گروپ امین (*amine*) آغاز می‌شود، قبل از ذکر نام هایدروکاربن و کلمه امین معاوضه‌ها و نمبر کاربن مربوطه آن تحریر می‌گردد؛ بطور مثال:



N-N-di methylethan amine



N-ethyl-N-phenyl-3-methylbutanamine






N-methyl-2-methylpropanamine





N-N-diethylamine

خود را آزمایش کنید

مرکبات زیر را نام گذاری نمایید:



اگر گروه NH_2 - با گروه های وظیفه یی دیگر؛ مانند: گروه وظیفه یی الکل ها، الیهایدها، اسیدها و غیره در عین مرکب هایدروکاربن شامل باشد، در آن صورت نام این گروه در نامگذاری با ذکر نمبر کاربن مربوطه به نام α mino یاد شده و در اول نام الکل، الیهاید یا اسید مربوطه تحریر می گردد؛ به طور مثال:







2 - α mino ethanol

2 - α mino propanoic acid

خود را آزمایش کنید

مرکبات زیر را نام گذاری نمایید:




۱۱-۲: خواص فیزیکی امین ها

امین های دارنده مالیکول های کوچک (میتایل امین، دای میتایل امین، تری میتایل امین و ایتایل امین) به حالت گاز موجود بوده، امین های سنگین با داشتن تعداد زیادی از اتوم های کاربن الی مرکب $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{NH}_2$ حالت مایع و بالاتر از مرکب $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{NH}_2$ حالت جامد را دارا اند، امین های ابتدایی بوی امونیا و یا بوی ماهی های گنده شده را دارا می باشند.


امین های اولی و دومی از لحاظ خواص شان مشابه به امونیا بوده و دارای رابطه هایدروجنی است که مالیکول های آنها قطبی می باشند؛ از این سبب نقطه غلیان این امین ها نظر به هایدروکاربن های دارنده عین اتوم های کاربن وهایدروجن با آنها و امین های سومی بلندتر است، امین های اولی و دومی در آب به خوبی حل شده، در حالی که امین های سومی در آب به آسانی حل نمی گردد؛ همچنان با افزایش

تعداد اتم‌های کاربن انحلالیت آن‌ها در آب کم می‌گردد:




رابطه هایدروجنی در امین

رابطه هایدروجنی بین آب و امین




propylamine

$bp = 40\text{C}^\circ$



Methylethylamine


$bp = 37\text{C}^\circ$




tri methyl amine

$bp = 3\text{C}^\circ$

امین‌های سومی هم می‌توانند با آب رابطه هایدروجنی برقرار نمایند؛ زیرا اتم نایتروجن ($\ddot{\text{N}}$) جوهره الکترون آزاد را دارا بوده و این جوهره الکترون‌ها سبب ایجاد رابطه با مالیکول‌های آب می‌گردد، چون رابطه بین هایدروجن و نایتروجن ($\text{N}-\text{H}$) در امین‌های سومی برقرار نمی‌باشد؛ بنابراین مالیکول‌های امین‌های سومی بین خود رابطه هایدروجنی برقرار کرده نمی‌توانند:




امین‌ها در مقایسه با هایدروکاربن‌ها و ایت‌های ایزولوگ شان نقطه غلیان بلندتر و از الکل‌ها و اسیدهای ایزولوگ شان نقطه غلیان پایین را دارا اند، علت آن این است که در هایدروکاربن‌ها و ایت‌ها رابطه هایدروجنی موجود نیست و قوه جذب بین مالیکول‌های آن‌ها کمتر است. بین مالیکول‌های الکل‌ها و اسیدها رابطه هایدروجنی موجود بوده و در این مرکبات اتم اکسیجن با اتم هایدروجن ($\text{O}-\text{H}$) رابطه داشته که این رابطه نسبت الکترونیگاتیوتی قوی اکسیجن نظر به نایتروجن زیاده قطبی بوده و رابطه هایدروجنی آن‌ها نیز قوی است؛ به طور مثال:



Diethyl eter

$bp = 54.6\text{C}^\circ$



Di ethyl amine

$bp = 55\text{C}^\circ$



1-butyl amine

$bp = 1.18\text{C}^\circ$




n-butane

0.5C°




n-pentane

$bp = 36.1\text{C}^\circ$



propanoic acid

$bp = 141.1\text{C}^\circ$



butanoic acid

$bp = 163.5\text{C}^\circ$


جدول (11 - 1) خواص فیزیکی امین‌های اساسی

| Name | structur | mp by (°C) | bp by (°C) | solubility (g/100L H ₂ O) | Kb | density d ₄ ²⁰ Relative |
|-----------------|--|---------------|---------------|---|-----------------------|---|
| methylamine | CH ₃ NH ₂ | -94 | -6 | زیاد منحل | 4-4.10 ⁻⁴ | 0,769(at - 79 °C) |
| ethylamine | CH ₃ -CH ₂ NH ₂ | -81 | 17 | زیاد منحل | 4-7.10 ⁻⁴ | - |
| propylamine | CH ₃ CH ₂ -CH ₂ NH ₂ | -83 | 49 | زیاد منحل | 4.10 ⁻⁴ | - |
| dimethylamine | (CH ₃) ₂ NH | -92 | 7 | کم منحل | 5.10 ⁻⁴ | 0,680at - O °C |
| trimethylamine | (CH ₃) ₃ N | -117 | 3 | کم منحل | 6.10 ⁻⁵ | - |
| aniline | C ₆ H ₅ NH ₂ | -6 | 184 | منحل | 4-2.10 ⁻¹⁰ | - |
| methylaniline | C ₆ H ₅ NHCH ₃ | - | 196 | - | - | 0,989 |
| dimethylaniline | C ₆ H ₅ N(CH ₃) ₂ | 2,5 | 194 | - | - | 0,956 |
| diphenylaniline | (C ₆ H ₅) ₂ NH | 54 | 302 | - | - | 1,158 |


امین‌های که تعداد کاربن آن‌ها از یک الی چهار اتوم اند، در آب به هر نسبت حل می‌گردند و امین‌های که تعداد کاربن آن‌ها شش و یا زیادتر باشد در آب کمتر منحل اند.

۱۱-۳: خواص کیمیای امین‌ها


امین‌ها با تیزاب‌ها تعامل نموده، نمک‌ها را تشکیل می‌دهند:




نمک الکایل_امونیم کلوراید خاصیت قلوی ضعیف را نسبت به آیون‌های هایدروکساید و الکوآکساید‌ها (OH و OR) دارا بوده و هم نسبت به آب (H-O-H) خاصیت ضعیف قلوی را از خود نشان



تعامل کیمیای زیر خواص القلی امین‌ها را نشان می‌دهند:




نمک‌های امونیم تشکیل شده قرار فوق در موجودیت القلی قوی و حرارت دوباره به امین‌ها، نمک غیر عضوی و آب تجزیه می‌گردند:




الکالیشن امین‌ها

امین‌ها با الکل‌ها تعامل نموده، مرکبات مختلف امین‌ها را تشکیل می‌دهند:



تعامل اسایلیشن امین‌ها



امین‌ها با اسایل تعامل نموده امایدها را تشکیل می‌دهند که تعامل در سه مرحله صورت می‌گیرد:



مشق و تمرین کنید

1 - 500 میلی لیتر محلول آبی ایتایل امین 0.1m دارای کدام pH خواهد بود؟ در صورتی که $Kb = 5.10^{-4}$ باشد.





2 - معادلات ذیل را تکمیل کنید.





۱-۴: استحصال امین‌ها

استحصال امین‌ها توسط عملیه الکالیشن





این طریقه یکی از طریقه‌های است که امین‌های دومی را از امین‌های اولی و امین‌های سومی را از امین‌های دومی، استحصال می‌نماید؛ طوری که الکایل‌های را با امونیا تعامل داده، امین‌های اولی، دومی و سومی را به دست می‌آورند:







امونیا با الکیل هالایدها تعامل نموده، امین های اولی را تشکیل میدهد





امین های اولی، دومی و سومی را میتوان ازالکالایشن امونیا استحصال کرد؛ طوری که الکیل هالایدها را با نمک امونیا تعامل داده، امین اولی حاصل و اگر نسبت مقداری الکیل هالایدها بلند برده شود، در نتیجه امین دومی و سومی نیز حاصل می گردد. اگر امین سومی هم با الکیل هالایدها تعامل نماید، نمک های کواترنری امین حاصل می گردد:




مثال:



به همین ترتیب اگر مرکبات نتریل در موجودیت کتلت ها هیدروجنیشن کردند، امین ها حاصل می گردد:






بهترین روش تهیه امین های اولی اروماتیکی ارجاع مرکبات نایترو مربوطه آن می باشد، مرکبات نایترو را می توان از نایترو دار شدن الکتروفیلی اروماتیک به دست آورد. گروپ نایترو را می توان به صورت کتلتی با هیدروجن یا عوامل ارجاع کننده کیمیاوی، به آسانی ارجاع نمود:





مشق و تمرین کنید


معادلات زیر را تکمیل نمایید:



۱-۱-۵: امین‌های مهم

۱- میتایل امین


اگر میتانول به حرارت 400°C و کاتالست Al_2O_3 با آمونیا حرارت داده شود، میتایل امین حاصل می‌گردد:




به همین ترتیب میتوان دای میتایل امین و ترای میتایل امین را به دست آورد. از دای میتایل امین در انحلالیت مواد استفاده می‌نمایند.

۲- انیلین یا بنزین امین (Aniline or Benzene amine)


انیلین یکی از امین‌های اروماتیکی مهم بوده که خاصیت قلوئی ضعیف را داشته و در مقایسه با سایکلو هگزان امین یک میلیون مرتبه ضعیف تر است، فورمول آن قرار ذیل است:



منبع مهم رنگ اندیگو ($\text{C}_{16}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$) در صنعت، انیلین است و این رنگ را طوری به دست می‌آورند که انیلین را با کلورو اسیتیک اسید تعامل داده و در نتیجه اندیگو را به دست می‌آورند:




رنگ‌های مختلف النوع از اندیگو تهیه می‌گردد؛ بنابراین آن را به نام رنگ اساسی یاد می‌کنند.
انیلین با مایع برومین تعامل نموده برای بروموانیلین را تشکیل می‌دهد:




۱۱-۲: امایدها (Amides)

امین‌های نوع اول و دوم با اسیدها (مشابه به الکل‌ها) تعامل نموده، مرکباتی را تشکیل می‌دهند که به نام امایدها یاد می‌شوند؛ به طور مثال:




امایدها هم در طبیعت موجود بوده و هم در نتیجه سنتز به شکل مصنوعی از مواد اولیه بدست می‌آیند. مطالعه ساختمان گروپ‌های وظیفوی به وسیله روش‌های فزیکیمی (؛ به طور مثال: سپکتر جذبی) مشخص می‌سازد که تمام رابطه‌ها بین نایتروجن و گروپ وظیفوی کاربونیل در یک سطح قرار دارد و علت مسطح بودن آن مربوط به فعل و انفعالات بین الکترون‌های رابط (C - O) و الکترون‌های آزاد اتوم نایتروجن است که باهم یک جابرا الکترونی نامستقر (M.D.B) چهار الکترون بالای سه اتوم N, C, O تشکیل می‌دهند و این عمل جوهره الکترون‌های آزاد اتوم نایتروجن را مقید ساخته و به همین دلیل است که امایدها در محلول آبی چندان خاصیت القلی را از خود نشان نمی‌دهند، این رابطه نامستقر به گروپ امید ثابت کیمیای لازم داده که در مقابل القلی و یا تیزاب‌های رقیق و آب از خود مقاومت نشان می‌دهند:




شکل (۱۱ - ۴) مسطح بودن رابطه‌های نایتروجن با گروپ کاربونیل

۱۱-۲-۱: نامگذاری و استحصال امایدها


امایدها به اساس IUPAC طوری نامگذاری می‌گردد که پسوند oic نام الکان تشکیل دهنده اسید مرکبات امایدها به کلمه اماید amide تعویض گردیده و کلمه اسید ذکر نمی‌گردد؛ به طور مثال:




غرض استحصال امایدها با فورمول عمومی $\text{R} - \text{C}(=\text{O}) - \text{NH}_2$ می‌توان مرکبات کاربوکسیلیک اسید را به گونه مستقیم با اموینا تعامل داد که در نتیجه امونیم کاربوکسلات حاصل می‌گردد:




اگر به کاربوکسلات به دست آمده حرارت داده شود، در نتیجه یک مالیکول آب آن را جدا ساخته، اماید مطلوب حاصل می گردد:




طبق تعاملات فوق، استحصال امایدها بسیار کند و محصولات آن کم است؛ از این سبب روش های دیگری به خاطر استحصال امایدها به کار برده می شود؛ به طور مثال: بنزایل کلوراید را با امونیا تعامل می دهند، طوری که، در یک فلاسک محلول امونیا را انداخته و آن را در یک ظرف پراز آب یخ قرار می دهند و بالای آن قطره قطره بنزایل کلوراید را علاوه می نمایند. در نتیجه بنزامید تشکیل و رسوب می نماید:




HCl حاصل شده با امونیا اضافی ظرف تعامل نموده NH_4Cl تشکیل می گردد:



محلول غلیظ امونیا



شکل (11 - 5) استحصال بنز اماید





خلاصه فصل یازدهم

* گروه وظیفوی امین ها NH_2 بوده که به نام گروه امینو Amino یاد می شود. نایتروجن این گروه حالت SP^3 هایبرید را دارا است.

* امین های اولی عبارت از امین های اند که نایتروجن آمونیا بایک اتوم کاربن هایدرو کاربن ها مرتبط است.

* امین های دومی عبارت از امین های اند که اتوم نایتروجن امونیا با دو گروه هایدرو کاربن ارتباط داشته باشد.

* امین های سومی عبارت از امین های اند که سه اتوم هایدروجن امونیا با سه گروه هایدرو کاربن ها تعویض شده است.

* رادیکال های عضوی که در ساختمان امین ها با اتوم نایتروجن رابطه دارند، دارای ساختمان نزدیک به چهار وجهی بوده؛ زیرا زاویه چهار وجهی 109.5° و امونیا 107.3° است

* در نام گذاری امین ها بقیه های متصل شده به نایتروجن با پسوندهای yl در ابتدا با در نظر داشت حرف اول نام شان مطابق به الفبای انگلیسی ذکر گردیده و به تعقیب آن کلمه امین (amine) علاوه می گردد.

* اگر گروه امین اتوم های هایدروجن اتوم های کاربن زنجیری هایدرو کاربن های مشبوع یا غیر مشبوع را تعویض نموده باشد، این نوع امین ها را به نام امین های الیفاتیکی و اگر به حلقه ارومات ارتباط داشته باشد، به نام امین های اروماتیکی یاد می شود.

* امین ها در مقایسه با هایدرو کاربن ها و اترهای ایزولوگ شان نقطه غلیان بلندتر و از الکل ها و اسیدهای ایزولوگ شان نقطه غلیان پایین را دارا اند.

* اتوم نایتروجن گروه امین مرکبات امین ها دارای یک جوهر الکترون آزاد بوده که این الکترون های آزاد خود را به دسترس اتوم های دارای خلای الکترونی قرار داده؛ پس خاصیت قلوئی لیویس را دارا است.

* مرکبات با ارزش امین عبارت از انیلین، رنگ های مختلف النوع امینو اسیدها، نوکلیک اسیدها، پروتین ها، مورفین و غیره می باشد.

* امین های نوع اول و دوم با اسیدها (مشابه به الکل ها) تعامل نموده مرکباتی را تشکیل می دهند که به نام امایدها یاد می شوند.


* امایدها به اساس IUPAC طوری نامگذاری می گردند که پسوند oic نام الکان تشکیل دهنده اسید امایدها به کلمه اماید amide تعویض گردیده و کلمه اسید ذکر نمی گردد و پسوند (oic) نام اسید نیز حذف می گردد.

تمرین فصل یازدهم

چهارجوابه

1 - گروه و وظیفوی امین ها عبارت از --- می باشد.

الف - NH_2 ب - NH ج - NH_3 د - NH_4^+

2 -  فورمول مرکب --- است

الف - تالوین ب - اندیگو ج - انیلین د - الیهایداها

3 - کدام یکی از مرکبات ذیل خاصیت قلوئی را دارا اند؟

الف - CH_3-NH_2 ب - CH_3-OH ج - NH_3 د - الف وج هردو

4 - محلول آبی مرکب $CH_3-\overset{H}{\underset{CH_3}{C}}-NH_2$ دارای کدام خاصیت های ذیل است؟

الف - $pH > 7$ ب - با جست تعامل نموده هایدروجن را آزاد می نماید

ج - خاصیت قلوئی دارد د - الف وج درست است.

5 - کدام یکی از مرکبات ذیل امین اولی است؟

الف - CH_3-NH_2 ب - $CH_3-CH_2-NH_2$ ج - $CH_3-\underset{CH_3}{CH}-NH_2$ د - همه درست است

6 - اگر کتله مالیکولی امین 45amu باشد، کدام یکی از بقیه های ذیل مربوط به آن است؟

الف - methyl ب - ethyl ج - propyl د - isopropyl ه - Aryl

7 - امین ها در مقایسه با هایدروکاربن ها و ایتروهای ایزولوگ شان نقطه غلیان --- واز

الکول ها و اسیدهای ایزولوگ شان نقطه غلیان --- را دارا اند.

الف - بلندتر، پایین ب - پایین، پایین ج - نزدیک، مساوی د - هیچکدام

8 - از تعامل ایتایل امین و HCl کدام مرکب ذیل حاصل می شود؟


الف - پروپایل امین ب - پروپایل آمونیم کلوراید ج - ایتایل امین کلوراید

د - ایتایل امونیم کلوراید

9 - فورمول $CH_3-\overset{O}{\parallel}C-NHCH_2-CH_3$ به نام یاد می شود



الف - اماید ب - ایتایل اسیت اماید ج - ایستر د - کیتون

10 - کدام یکی از مرکبات ذیل امین دومی نیست؟



سؤالات تشریحی

1 - مرکبات ذیل را نام گذاری و نوع آن را مشخص سازید:



2 - فورمول ساختمانی امین‌های ذیل را تحریر دارید:

الف - cyclopropyl amine ب - dimethylethyl amine ج - ethylhexyl amine

3 - فیصدی نایتروجن در مرکب *cyclopropylamine* چقدر خواهد بود؟

$Cl: 35.5g/mol$, $O: 16g/mol$, $H: 1g/mol$, $C: 12g/mol$, $N: 14g/mol$

4 - $3.4g$ آمونیا با $20.2g$ مرکب CH_3-Cl تعامل نموده امین را تشکیل داده است، فورمول و نام مرکب مطلوب را تحریر دارید.


$O: 16g/mol$, $H: 1g/mol$, $C: 12g/mol$, $N: 14g/mol$

5 - فرق بین امین‌ها و امیدها چیست؟ در این مورد معلومات لازمه ارائه بدارید.

6 - غلظت یون هایدروجن در محلول $0.25molar$ مرکب *propylamine* مساوی به $[H^+] = 10^{-12}$ است، k_b آن را دریافت کنید.

7 - امین چهارمی متشکل از 65.75% کاربن، 19.18% نایتروجن و 15.07% هایدروجن از لحاظ کتلوی است، فورمول مالیکولی آن را دریافت کنید.

8 - امیدهای ذیل را نامگذاری کنید:



9 - آمونیا با اسیت کلوراید (CH_3-COCl) تعامل نموده است، چه مقدار اسیت امید حاصل خواهد شد؟

10 - امین‌ها در محلول‌های آبی خاصیت القلی را از خود نشان می‌دهند، چرا؟ روی دلایل معلومات ارائه بدارید.



مرکباتی که مالیکول‌های آن‌ها از اتصال چندین مالیکول‌های کوچک تشکیل گردیده اند، به نام پلی میر یاد شده و مالیکول‌های کوچکی که پولیمیرها را تشکیل می‌دهند، به نام مونومیرها (Monomers) یاد می‌شوند. پلی میرها به دودسته تقسیم شده اند که عبارت از پولیمیرهای طبیعی و پولیمیرهای مصنوعی اند، در این فصل راجع به پولیمیرهای طبیعی معلومات ارائه شده و در فصل بعدی درمورد پولیمیرهای مصنوعی معلومات ارائه می‌گردد.

تحت عنوان پولیمیرهای طبیعی مرکباتی مطالعه می‌گردد که منشأ طبیعی داشته و عبارت از پروتین‌ها، نوکلئیک اسیدها، امینواسیدها، انزایم‌ها، نشایسته، سلولوز، ابریشم مصنوعی و ابریشم طبیعی اند که در این فصل آن‌ها را مطالعه خواهیم کرد با مطالعه این فصل خواهید دانست که این مرکبات دارای کدام ساختمان و خواص بوده و در حیات روزمره و صنعت کدام نقش را دارا اند؟

۱۲: صنف بندی پولیمرهای طبیعی

پولیمیرها مرکباتی اند که مالیکولهای آنها از اتصال چندین مالیکولهای کوچک تشکیل گردیده اند، مالیکولهای کوچکی که پولیمیرها را تشکیل می دهند، به نام مونومیرها (Monomers) یاد می شوند. پولیمیرها میتوانند از عین مونومیر و یا از مونومیرهای مختلف تشکیل گردند، پولیمیرهای که از عین مونومیر تشکیل گردیده باشند، به نام هوموپولیمیر (Homopolymer) یاد شده و پولیمیرهای که از مونومیرهای مختلف ساخته شده باشند، به نام کو پولیمیر (Copolymer) یاد می شوند. پولی میرها به دودسته تقسیم شده اند که عبارت از پولیمیرهای طبیعی و پولیمیرهای مصنوعی اند، پولیمیرهای طبیعی عبارت از قندهای چندین قیمته (نشایسته و سلولوز)، پروتین ها، نوکلئیک اسیدها، انزایم ها، ابریشم و رابر طبیعی اند که در زیر آنها را مطالعه می نمایم.

۱۲-۱: قندها (Carbohydrates)


کاربوهایدریت ها مرکبات مهم حیاتی بوده که در حیات روزمره ما در عرصه های مختلف به کار می روند. دروازه های منازل، موبیل، مواد غذایی، البسه و غیره از کاربوهایدریت ها تشکیل شده اند. کاربوهایدریت در طبیعت زیاد یافت شده و در تمامی اجسام حیه موجود بوده و مواد غذایی حیوانات از جمله انسان ها می باشند.

کاربوهایدریت ها اکثر شان توسط نباتات سبز تولید می شوند که ماده سبز برگ نباتات (کلروفیل) در موجودیت نور آفتاب، کاربن دای اکساید هوا و آب را که از طریق ریشه جذب نموده اند، به گلوکوز تبدیل می کنند که این عملیه به نام فوتوسنتیز یاد شده است:




شکل (12 - 1) نباتات تولید کننده گلوکوز و آکسیجن

نور آفتاب / کلروفیل



در حقیقت نباتات لابراتوار طبیعی است که مواد غذایی را ترکیب می نمایند. در معادله فوق دیده


می شود که در نباتات به کمک ماده سبز کلروفیل دار عملیه سنتیز گلوگوز صورت گرفته و آکسیجن نیز تولید می گردد، موجودات زنده آکسیجن را تنفس نموده و آن را غرض اکسیدیشن کاربوهایدریت ها و دیگر مواد عضوی به کاربرده و انرژی را در ارگانیزم آزاد می سازند:



عملیه فوتوسنتیز و تنفس حیوانات معکوس یکدیگر بوده؛ بنابراین توازن کاربن دای اکساید و آکسیجن در این دو عملیه کنترل می نماید.

۱۲-۲-۲: ساختمان و نامگذاری کاربوهایدریت ها


کاربوهایدریت ها را به نام هایدریت های کاربن نیز یاد می نمایند، چون فورمول بسیط آنها $C_n(H_2O)_n$ و یا $C_nH_{2n}O_n$ است؛ بنابراین به شکل کاربن آبدار به ملاحظه میرسند. این صنف مرکبات شامل گلوگوز. $C_6H_{12}O_6$ (که گروپ الیهائی را دارا بوده) و فرکتوز $C_6H_{12}O_6$ (دارای گروپ کیتونی است). و غیره بوده که در میوه جات موجود می باشد. فورمول های مشرح این دو قند عبارت است از:



شکل (12 - 2)

الف - توت زمینی منبع فرکتوز ب - انگور منبع گلوگوز ج - عسل منبع مونوسکرایدها


ساده ترین کاربوهایدریت بادر نظر داشت فورمول عمومی آنها، فارم الیهاید (CH_2O) بوده؛ بنابراین کاربوهایدریت ها پولیمیر فارم الیهاید بوده می توانند؛ به طور مثال:




طوری که در فوق ارایه شد، کاربوهیدریت‌ها دارای گروپ کیتونی و یا آلدهیدی بوده؛ بنابراین این مرکبات می‌توانند از پولیمیرایزیشن کیتون‌ها و یا آلدهیدها حاصل شوند که به نام پیرانوز و فورانوز نیز یاد می‌شوند:

اشکال پیرانوز و فورانوز


گلوکوز دارای گروپ وظیفوی الکولی و آلدهیدی بوده و زنجیری نسبتاً بلند و قابلیت انعطاف را دارا است که می‌تواند یک هیمی استیال حلقوی را تشکیل دهد. این حلقه با شش اتم به نام گلوکوز پیرانوز یاد می‌شود؛ زیرا مشابه به اتر حلقوی بنام پیران بوده که فورمول آن قرار ذیل است.



فرکتوز نیز در حالت محلول شکل هیمی استیال حلقوی را دارا بوده و مشابه به حلقه پیرانوز با شش اتم بوده؛ اما به شکل حلقه پنج اتمی می‌باشد که نسبت شباهت آن با فوران به نام Furansoe یاد می‌شود و به صورت مشخص فرکتوز حلقوی را به نام فرکتوز فورانوز یاد می‌نمایند. شکل ذیل فوران را نشان می‌دهد:



کاربوهیدریت‌های پیچیده که در آن گلوکوز و فرکتوز نیز موجود بوده باشد، به نام قندهای چندین قیمته پولی سکرایدها (Polysaccharides) یاد می‌شوند، از جمله یکی آن‌ها بوره (Sacarose) بوده که به نام قند دوقیمته (disaccharides) یاد شده و از اتحاد یک مالیکول گلوکو پیرانوز و یک مالیکول فرکتوفورانوز با کشیدن یک مالیکول آب از آن‌ها حاصل می‌گردد. هریک از این واحدها بنام مونوسکراید (Monosacride) یاد می‌شود. مونوسکرایدها با هم یک جاشده، اولیگوسکرایدها را تشکیل می‌دهد.



مثال: کاربوهایدریت‌های ذیل را نام گذاری نمایید:

حل:

a) aldo pentose b) Keto pentose c) aldo hexose d) Keto hexose e) Keto tetrose

۱۲- ۱- ۲: طبقه بندی کاربوهایدریت‌ها


کاربوهایدریت‌ها به دودسته تقسیم شده اند که عبارت از ساده و مغلق می‌باشند. قندهای ساده را به نام (Simple sugars) یا (Mono sacharides) یاد می‌کنند.

۱ - مونو سکرایدها

مونوسکرایدها نوع کاربوهایدریت‌های اند که هایدرولیز نگردیده و تعداد اتوم‌های کاربن در مالیکول آن‌ها ۳ الی ۹ اتوم می‌باشند. مونو سکرایدهای که در مواد غذایی موجود اند، به نام هگسوز (Hexoses) یاد می‌شوند. گلوکوز ساده‌ترین مونو سکراید است که در تولید انرژی در اورگانیزم موجودات حیه و عملیه میتابولیزم نقش اساسی را بازی می‌نماید، این مرکب در جگر و انساج ذخیره شده و منبع مهم آن انگور و عسل است.

مونوسکرایدها مرکبات سفید رنگ کرسطالی بوده و دارای طعم شیرین می‌باشند، با آب رابطه هایدروجنی برقرار نموده؛ ازاین سبب منحل است؛ لاکن در الکول‌ها کمتر منحل بوده و در محلول‌های غیر قطبی؛ از قبیل هایدروکاربن‌ها وایتراها غیر منحل می‌باشند.

گلوکوز، فرکتوز و منوز قندهای مهم مونو سکرایدها بوده که فورمول مالیکولی آنها $C_6H_{12}O_6$ می‌باشد و ایزومیر یکدیگر اند:




مونوسکرایدهای الدوز در ترکیب مالیکولی خود دارای چهار اتم کربن غیر متناظر بوده که با علامه (*) مشخص گردیده اند. این مرکبات در حالت جامد دارای فعالیت نوری می باشند.

گلوکوز که به نام الدوهکسوز نیز یاد می شود، دارای چهار کربن غیر متناظر بوده و نظر به تعداد کربن های غیر متناظر آن، تعداد ایزومیرهای نوری این مرکب قرار ذیل محاسبه می گردد:

$$2^n = 2^4 = 16 \text{ تعداد ایزومیری الدوهگروز}$$

در معادله فوق n تعداد کربن های غیر متناظر را نشان می دهد.

مونوسکرایدها می توانند دارای مالیکول حلقوی و یا زنجیری باشند، در نتیجه هایدرولیز مونوسکرایدهای زنجیری، مونوسکرایدهای حلقوی به دست می آید که در این حالت تعداد کربن غیر متناظر آنها از چهار به پنج اتم زیاد می گردد. عملیه ازدیاد کربن های غیر متناظر را در اثر تشکیل حلقه های مونوسکرایدها به نام هیمی اسیتال یاد می کنند؛ تشکیل ساختمان حلقوی را در مالیکول گلوکوز ملاحظه می نماییم:





الف - اگر د - گلوکوز (D-glucose) در آب حل گردد، گلوکوز حلقوی آن حاصل می شود.
 ب - در α -D-glucose گروپ های OH- در کاربن اول و چهارم حلقه به حالت Cis قرار دارند و تنها گروپ OH کاربن ۱ اکزیال (axial) استاده بوده و دیگر آن ها اکواتریال (aquatorial) افتاده اند.
 ج - در β -D-glucose گروپ های OH- در کاربن اول و چهارم حلقه در حالت اکواتریال (aquatorial) است.

اسکلت بندی مونوسکرایدها


چون تمامی کاربوهایدریت ها دارای اتوم های کاربن قابل دوران اند؛ از این سبب علما روش های استاندارد را برای توصیف استریو شمی کاربوهایدریت ها ارائه نموده اند و یکی از این روش ها عبارت از روش فیشر بوده که برای نشان دادن مرکز دوران به روی یک صفحه مسطح استفاده می شود:

در دروس گذشته مطالعه نمودید که هر اتوم کاربن - کاربن چهار وجهی، در نمایش فیشر توسط دو خط متقاطع نمایش داده می شود، خط های افقی نشان دهنده روابط سطح بیرونی صفحه و خطوط عمودی نشان دهنده روابط عقب صفحه می باشند. قرار تعامل کاربن گروپ کاربونیل در قسمت بالای فورمول فیشر و یا نزدیک به آن تحریر می گردد؛ بنابراین (R) گلیسرالدهاید، ساده ترین مونو سکرایدها بوده که در شکل ذیل دیده می شود:



شکل (12 - 3) نمایش فیشر برای (R) گلیسرالدها


قابل یادآوری است اینکه: نمایش فیشر را می توان بدون تغییر ساختمان آن، به اندازه 180° (به جز 90° یا 270°) به روی صفحه دوران داد:



[R] - گلیسرالدهاید

کاربوهایدریت های که دارای چهار مرکز دوران اند، طوری نمایش داده می شوند که مراکز دوران بالای همدیگر قرار داشته و کاربن گروپ کاربونیل در بالا و یا پایین آن نشان داده می شود؛ به طور


مثال: گلوکوز دارای چهار مرکز دوران بوده که در نمایش فیشر بالای یکدیگر قرار دارند. البته چنین نمایش‌های تصویری از ساختمان دقیق مالیکول‌های که منکسر و تاب خورده باشد، اطلاع نمی‌دهد:



فعالیت



کدام یکی از نمایش‌های فیشری گلیسرالدهیدهای ذیل بیانگر یک آنانتومیر اند؟



قند های D و L


گلیسرالدهید (Glyceraldehyde) ساده‌ترین الدوز بوده که دارای یک مرکز چرخشی می‌باشد و دارای دو شکل آنانتیومیر (تصویر آینه‌وی) نیز است که تصویر راست آن در طبیعت زیادتر یافت می‌گردد؛ یعنی اگر نمونه از گلیسرالدهید طبیعی در یک پولارو متر قرار داده شود، نور پولارایز شده و مطابق به عقربه ساعت چرخش نموده که به علامه مثبت (+) نشان داده می‌شود. اسکلیت C_2 در (+) - گلیسرالدهید به R نمایش داده شده است.

گلیسرالدهید را به نام D- گلیسرالدهید نیز یاد نموده اند، (D از Dextrorotatory گرفته است که به معنی چرخش به طرف راست می‌باشد). آنانتیومیر دیگر آن یعنی (S) - گلیسرالدهید را به L- گلیسرالدهید یاد می‌نمایند (L از کلمه levorotatory گرفته شده است که به معنی چرخش به طرف چپ می‌باشد).

خواص کیمیاوی مونوسکرایدها


۱ - اکسیدیشن مونوسکرایدها

مونوسکرایدهای الدوز در موجودیت محلول فهلنگ و تولین اکسیدی شده و اکسیدیشن در گروپ کاربونیل آن‌ها صورت می‌گیرد:



در این تعامل مادهٔ رسوب‌کنندهٔ سرخ تشکیل می‌گردد که از این تعامل در تشخیص و اندازه‌گیری شکر خون استفاده می‌نمایند. یک مقدار یوریا را با محلول فهلنگ مخلوط می‌نمایند که آن را به خون علاوه نموده؛ در این صورت رسوب سرخ رنگ تشکیل می‌شود که موجودیت شکر را در خون تثبیت می‌نمایند.


مونوسکرایدها کیتوز توسط معیارهای فهلنگ و تولین در حالت جامد اکسیدی و به تیزاب مبدل نشده؛ اما در حالت محلول با معرف‌های مذکور تعامل نموده، گروپ کیتونی آن‌ها به گروپ کاربوکسیل تبدیل می‌گردد، در این صورت ابتدا گروپ کیتون به گروپ الدیهایدی تبدیل شده و به تعقیب آن گروپ الدیهایدی به گروپ کاربوکسیلیک اسید مبدل می‌گردد:



اکسیدیشن مونوسکرایدها توسط آب برومین


آب برومین گروپ الدیهایدی الدوزها را اکسیدی نموده و به گروپ کاربوکسیل تبدیل و الدونیک

اسیدها را تشکیل می‌دهند:




اکسیدیشن مونوسکرایدها توسط نایتริก اسید

نایتریک اسید نسبت به آب برومین اکسیدی کننده قوی بوده که گروپ دیهیدری ($\text{C}-\text{H}$) و CH_2OH را اکسیدی نموده و به گروپ کاربوکسیلیک مبدل می‌سازد:



مثال: 36 گرم یک الدوز که دارای فورمول عمومی $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_n$ است، با معرف تولوین تعامل نموده و 43.2 گرم نقره را رسوب داده است، فورمول مالیکولی الدوز کدام خواهد بود؟
 کتله اتمی کاربن 12g/mol ، کتله اتمی هایدروجن 1g/mol ، کتله اتمی آکسیجن 16g/mol و کتله اتمی نقره 108g/mol است.

حل:



$$\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_n = 12n + 2n \cdot 1 + 16n = 30n\text{g/mol}$$

$$30n\text{ g aldose} - 216\text{gAg}$$

$$36\text{g aldose} - 43.2\text{gAg}$$

$$n = \frac{36\text{g} \cdot 216\text{g}}{30\text{g} \cdot 43.2\text{g}} = 6$$

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \quad \text{فورمول مالیکولی}$$




فعالیت

500g نمونه از محلول 1.2% کتلوی گلوکوز با محلول معرف فهلنگک تعامل داده شده است، چه مقدار رسوب Cu_2O تشکیل خواهد شد؟ (کتله مالیکولی Cu_2O مساوی 143 و گلوکوز $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ مساوی 180 است).


ارجاع مونوسکرایدها

گروپ الدیهایدی و کیتونی مونوسکرایدها توسط ارجاع کننده‌های قوی ارجاع می‌گردد؛ به طور مثال: $\text{D}-\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ به مرکب *Sorbitol* $\text{D}-\text{glucitol}$ توسط NaBH_4 یا H_2 در موجودیت کتلت ارجاع می‌گردد:



مثال: محصول تعامل D-ribose (an aldopentose) با تولین و NaBH_4 چه خواهد بود؟

حل:



فعالیت

محصول تعامل D-ribose (aketopentose) با تولین و NaBH_4 چه خواهد بود؟

۲: دای سکرایدها


از تراکم و اتحاد دو مالیکول مونوسکرایدها و دی هایدریشن آنها مالیکول دای سکراید حاصل می گردد که در بین دو مونو سکراید یک پل آکسیجنی برقرار می باشد.

خواص عمومی دای سکرایدها

- 1 - فورمول عمومی دای سکرایدها $C_{12}H_{22}O_{11}$ است
- 2 - دای سکرایدها رنگ سفید را دارا بوده و دارای طعم شیرین است.
- 3 - مالیکول تمام دای سکرایدها به طرف راست چرخش نموده و نور را پولاریزیشن می نمایند.
- 4 - دای سکرایدها هایدرولیز شده و از هایدرولیز آنها مونو سکرایدها حاصل می گردد.
- 5 - بوره یکی از دای سکرایدهای مهم بوده و دای سکرایدهای دیگر مهم لکتوز، مالتوز و سلیبوز می باشند.

سکروز (بوره)


شکر در اثر اتصال یک مالیکول گلوکوز و یک مالیکول فرکتوز حاصل می گردد. هردو هگروزهای ذکر شده توسط رابطه گلایکوساید (glycoside) بین اتم کاربن یک گلوکوز و کاربن دوم فرکتوز باهم وصل می گردد. شکر به طور فراوان در نباتات از قبیل لبلبو و نیشکر یافت می گردد که به طریقه اکسترکشن و تصفیه از آن شکر خالص به دست می آید. شکر در آب به آسانی حل شده؛ اما در الکل کمتر حل می گردد. زمانی که بوره هضم می گردد، در این صورت در جگر گلوکوز و فرکتوز تشکیل شده و بعد از تشکیل در خون جذب می گردد:




Glucose

Fructose

Sucrose





چون سکروز دارای گروپ کاربونیل نبوده؛ از این سبب با معرف‌های فهلنگ و تولین تعامل نکرده و هم خاصیت ارجاعی را دارا نمی‌باشد.



شکل (12 - 4) ذوب سکروز و ساختن شیرینی

فعالیت

تعیین مقدار شکر در یورین



بسیاری از نمک‌های عضوی گروپ الدیهایی و یا کیتونی را در ساختمان خود دارا اند؛ از این سبب آن‌ها کمتر می‌توانند تا آیون‌های فلزی از قبیل: Cu^{2+} , Hg^{2+} , Bi^{3+} و Ag^+ تشکیل دهند. زمانی که این نمک‌ها به کاربوکسلیک اسید اکسیدایز می‌گردند، این معلومات برای تعیین مقدار شکر در خون و یورین استعمال شده می‌تواند. گرچه برای تعیین مقدار شکر در خون و یورین می‌تودهای مختلفی به کار برده می‌شود؛ اما مهم‌ترین آن‌ها استعمال محلول فهلنگ است. (ماده که برای تعاملات کیمیایی به کار می‌رود، به خصوص برای دانستن اینکه در ماده مورد نظر ما کدام مواد دیگر موجود است). شیوه کار در این مورد قرار ذیل است:

- 1 - در یک تست تیوب بالای یک مقدار محلول فهلنگ (I)، محلول CuSO_4 70% را علاوه کنید.
- 2 - به مقدار مساوی حجم فهلنگ آماده شده (I)، (مقدار محلول سودیم پوتاشیم تار تاریت و سودیم هایدروکساید) را در تست تیوب بسازید که به حجم 100 میلی لیتر آب آماده شده باشد.
- 3 - محلول‌ها را در یکدیگر الی حاصل شدن رنگ آبی تاریک خوب حل نمایید.

4 - بعد از این محلول را خوب جوش بدهید. (رنگ آبی تاریک نباید غیر قابل دید گردد، در صورتی که غایب گردد، تست تیوب نا پاک است)

5 - بالاخره یورین و یا سیروم خون در محلول حاصل شده علاوه گردد (مقدار یورین نباید از مقدار محلول معرف زیاد باشد). در صورتی که یورین دارای شکر بوده باشد، رسوب سرخ و یا زرد در تست تیوب تشکیل می گردد.


مقدار نورمال گلوکوز در خون باید در حدود 80 تا 120 ملی گرام باشد. توقف احتراق و فعالیت گلوکوز در خون به تولید هارمون انسولین ارتباط دارد:




شکل (۱۲-۵) تعیین اندازه شکر در خون

لکتوز (lactose)

لکتوز به نام قند شیر نیز مشهور است، این قند در شیر حیوانات پستاندار موجود بوده که شیر انسان 6% و شیر گاو از 4 % لکتوز تشکیل شده است.





ساختمان لکتوز قرار ذیل است:



شکل (12 - 5) شیر منبع لکتوز


مالتوز (Maltose)

مالتوز نوع دای سکراید است که در دانه‌های جو و دیگر نباتات یافت می‌شود. این قند را می‌توان از نشایسته و کلایکوجن در اثر عمل انزیم امیلاز (Amylase) به دست آورد. این قند به حرارت $102-103^{\circ}\text{C}$ ذوب شده و از آن در تولید نوشابه‌ها و مواد غذایی استفاده به عمل می‌آید. در مالتوز گروپ الدیهایدی موجود بوده؛ از این سبب محلول فهلنگ را ارجاع و در موجودیت آب برومین به مالتونیک اسید (moltonic acid) مبدل می‌گردد. اگر مالتوز در موجودیت تیزاب‌ها هایدرولیز گردد، به گلوکوز مبدل می‌گردد:




سلویبوز (cellobiose)

سلویبوز در نتیجه هایدرولیز قسمی سلولوز تشکیل می‌گردد، اگر هایدرولیز ادامه داده شود، بالاخره دو مالیکول گلوکوز به دست می‌آید. سلویبوز مشابه مالتوز بوده و ایزومیر هندسی یک دیگر اند. در بعضی ممالک سلویبوز را از حرارت دادن چوب با تیزاب گرم به دست می‌آورند و از آن برای غذای حیوانات استفاده می‌کنند. در صورتی که سلویبوز هایدرولیز گردد، دو مالیکول گلوکوز حاصل می‌گردد:




۳- پولی سکرایدها (polysaccharides)


پولی سکرایدها از اتحاد واحدهای گلوکو پیرانوز با همدیگر در نتیجه دی هایدریشن (Dehydration) آن‌ها تشکیل می‌گردد، در این مرکبات نشایسته نیز شامل بوده که ساختمان انشعابی و قابلیت هضم را دارا است؛ اما سلولوز که آنهم از زنجیر پولی سکرایدها به شکل رشته‌های طویل حاصل می‌گردد و چون این رشته‌ها با روابط هایدروجنی باهم متحد گردیده اند، ماده مقاوم بوده و غیر قابل هضم است. ساقه، ریشه و شاخچه‌های نبات از آن ساخته شده است:



برای تشخیص این قندها از دیگر مرکبات از معرف فهلنگ استفاده به عمل می آورند که با گلوکوز رسوب قرمزی را تشکیل میدهد:



فرکتوز نیز مانند گلوکوز اکسیدی شده؛ اما اکسیدیشن آن در گروپ هایدروکسیل صورت می گیرد. قسمتی از اکسیدیشن آن قرار ذیل است:




خواص عمومی


- 1 - فورمول عمومی پولی سکرایدها عبارت از $(C_6H_{10}O_5)_n$ است.
- 2 - در جوانه ها و تخم های نباتات یافت می گردند.
- 3 - پولی سکرایدها موادی اند که قابلیت کرسٹالیزیشن را دارا نبوده و بدون طعم اند، این مرکبات در آب والکول حل نشده؛ در صورتی که هایدرولیز گردند، به مونو سکرایدها تبدیل می گردند. پولی سکرایدهای مهم عبارت اند از: نشایسته (Starch)، گلیکوژن (Glycogen)، سلولوز (Cellulose) و دکسترین (Dextrin) است.

نشایسته (Starch)

یکی از مهم ترین مرکبات پولی سکرایدها نشایسته بوده که از ترکیب مالیکول های گلوکوز به اساس رابطه گلیکوساید تشکیل می گردد. جواری، کچالو، برنج، ریشه ها و تخم های نباتات منابع مهم نشایسته اند. نشایسته منبع خوب غذایی بوده که یک مالیکول آن از هزارها مالیکول گلوکوز ساخته شده است، قسمتی از فورمول آن قرار ذیل است:



طوری که گفته شد، نشایسته در آب غیر منحل بوده؛ در صورتی که با آب حرارت داده شود، هایدرولیز آن صورت گرفته و به قندهای یک قیمته پارچه می شوند. نشایسته معرف فهلنگ را ارجاع ساخته و اگر با آیودین یک جا گردد، محلول آبی را تشکیل می دهد. نسبت موجودیت زیاد گروپ ها، این مرکب آب جذبان خوب می باشد. در نتیجه حرارت دادن هایدرولیز نشایسته صورت گرفته و محصول هایدرولیز آن گلوکوز است:



شکل (12 - 6) الف - کچالو منبع نشایسته ، ب - نان منبع نشایسته

گلایکوجن (Glycogen)

گلایکوجن نشایسته حیوانی بوده که در جگر حیوانات موجود می باشد و نقش ذخیره انرژی را در حیوانات دارا است. کاربوهایدریت ها غذایی که به انرژی تبدیل نشده باشند، در جگر به گلایکوجن تبدیل شده و ذخیره می گردد. تعداد واحدهای گلوکوز در گلایکوجن به صدها هزار عدد بالغ می گردد. قسمتی از ساختمان پیچیده گلایکوجن با اتصالات 4',1 و 6',1 قرار ذیل است:





شکل (12 - 7). قسمتی از ساختمان پیچیده گلایکوجن با اتصالات 4',1 و 6',1

سلولوز (Cellulose)


یکی از پولی سکرایدهای مهم عبارت از سلولوز بوده که از اتحاد مالیکول های گلوکوز به اساس رابطه گلوکوزید ساخته شده است و دارای 350 واحد مونومیر می باشد که کتله مالیکولی آن به 500000 بالغ می گردد. مقدار سلوز در طبیعت زیاد بوده ، دیوار حشرات نباتات از این مرکب ساخته شده است. منبع مهم سلولوز عبارت از چوب، علف، کتان و کنف است. سلولوز ماده آمورف (Amorph) بوده و در آب غیر منحل است، این مرکب برخلاف پولی سکرایدهای دیگر در مقابل تیزاب ها والقلی ها از

خود مقاومت نشان میدهد؛ اما در موجودیت حرارت و فشار بلند توسط تیزاب رقیق هایدرولیز گردیده و به گلوکوز مبدل می گردد:



شکل (8 - 12) چوب نوعی از پولیمرهای سلولوز

سلولوز و نشایسته هریک از عین مونومیرهای گلوکوز ساخته شده اند؛ اما تفاوت بین آنها از لحاظ نصب واحدهای گلوکوز با یک دیگر می باشند. در نشایسته پل آکسیجینی بین واحدهای گلوکوز در موقعیت الفا (α) قرار داشته و در سلولوز پل آکسیجینی واحدهای گلوکوز در موقعیت بتا (β) قرار دارد.



۱۲-۲ پروتین‌ها

پروتین‌ها نوعی از پولیمرهای طبیعی بوده که به طور تقریبی ۱۵ فیصد بدن انسان‌ها را تشکیل داده و وظایف متعددی را در بدن انجام می دهند. پروتین‌های رشتوی (Fibres proteins) اجزای اساسی انساج و پوست بدن بوده و پروتین‌های دیگر در مایعات و خون موجود بوده که باعث انتقال آکسیجن، شحمیات و دیگر مواد به حجرات شده که در عملیۀ میتابولیزم سهم می گیرند؛ همچنان هارمون‌ها؛ از قبیل: انسولین و انزایم‌ها نوعی از پروتین‌ها می باشند.


پروتین‌ها اجزای اساسی مواد غذایی بوده، اکثر مواد غذایی حاوی پروتین است، گوشت سرخی، سبزیجات، حبوبات؛ مانند: نخود و لوبیا غنی از پروتین‌ها می باشند. پروتین‌های مواد غذایی در عضویت بدن و سیستم هاضمه به اجزای کوچک؛ یعنی امینو اسیدها پارچه شده و این امینو اسیدها در حجرات دوباره به پروتین‌های ضروری اعضای بدن تبدیل می گردد. چون جز اساسی پروتین‌ها امینو اسیدها بوده؛ بنابراین باید در مورد امینو اسیدها معلومات ارائه گردد:

۱۲-۲-۱: آمینواسیدها (Amino acids)


اگر یک و یا چندین اتوم‌هایدروجن، کاربن‌های مالیکول کاربوکسیلیک اسیدها به NH_2 - (امین) تعویض گردد. آمینواسیدهای مربوط آن‌ها حاصل می‌گردد؛ به طور مثال: $\text{NH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ نوعی از آمینواسیدهای است که در نتیجه تعویض یک اتوم‌هایدروجن بقیه میتایل استیک اسید توسط گروپ امین حاصل گردیده است.

نامگذاری آمینواسیدها

با وجودی که بیوشیمی دانان‌ها برای آمینواسیدها نام‌های مروج (Trivial) تعیین نموده اند؛ اما آمینواسیدها را می‌توان به طور سیستماتیک نیز نامگذاری کرد. نام‌های مروج بعضی از آمینواسیدها قرار ذیل ارائه می‌گردد.




نام‌های بین المللی این دو آمینو اسید طبق توضیحات ذیل صورت می‌گیرد. چون الانین مشتق از Propanoic acide است و گروپ NH_2 - بالای کاربن نمبر (2) قرار دارد. (البته همیشه باید کاربن گروپ کاربوکسیل کوچکترین نمبر را به خود اختیار می‌کند)؛ بنابراین نام سیستماتیک الانین عبارت




است از:

2-amino propanoic acid


قابل یاد آوری است که گروپ COOH - همیشه در یک انجام زنجیر قرار دارد. اتوم کاربنی که به گروپ COOH - رابطه دارد، بنام الفا (α) و کاربن دیگر بنام بتا β و γ گاما مسمی می‌باشد.




آمینواسیدهای که گروپ NH_2 - آن‌ها در کاربن α الفاء نصب باشد بنام α -aminoacides - یاد شده و اگر در کاربن β نصب باشد، بنام β -aminoacides - یاد می‌گردد و اگر در کاربن γ قرار داشته باشد بنام γ - آمینواسید (γ -amino acids) یاد می‌شود؛ به طور مثال:



3-methyl 2-aminobutan oicacide
(α -Valine)




α -aminopropanoic acid




α -aminoethanoic acid
Glycine

خواص امینواسیدها


نسبت موجودیت گروپ NH_2 و COOH در ترکیب امینو اسیدها، این مرکبات خاصیت امفوتریک را دارا بوده؛ یعنی هم خواص تیزابی و هم خواص قلوی را از خود نشان می‌دهد. تعامل سودیم هایدروکساید را با گلیسین قرار ذیل ملاحظه می‌نمایم:



در محیط تیزابی امینواسید قرار ذیل به ملاحظه می‌رسد:



امینو اسیدها در حالت جامد به شکل آیون دو قطبی خود را تبارز داده؛ طوری که گروپ کاربوکسیل آن به شکل آیون کاربوکسیلیت (COO^-) و گروپ امین آن به شکل آیون امونیم (NH_3^+) تبارز یافته که به نام امفی آیون (Amph ion) یا سویتر آیون (Zwitter ion) یاد می‌گردد:



شکل (9 - 12) ماهی منبع مهم پروتین

جدول (12 - 1) 20 امينو اسيد مهم بيالوجيكي


| نام | نام معمولی | سمبول | فورمول |
|---------------|-----------------|-------|--|
| کلاسين | Glycine | Gly | $\begin{array}{c} \text{H} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$ |
| الانين | Alanine | Ala | $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$ |
| والين | Valine | Val | $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{NH}_2 \end{array}$ |
| ليوسين | Leucine | Leu | $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{NH}_2 \end{array}$ |
| ايزوليوسين | Isoleucine | Ile | $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{NH}_2 \end{array}$ |
| سيرين | Serine | Ser | $\begin{array}{c} \text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$ |
| ثيريونين | Threo nine | Thr | $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{C} \text{H} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \quad \\ \text{OH} \quad \text{NH}_2 \end{array}$ |
| سسئين | Cysteine | Cys | $\begin{array}{c} \text{HS} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$ |
| ميتونين | Methionine | Met | $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{S} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$ |
| اسيد اسپارتيك | aspartiqueacide | asp | $\begin{array}{c} \text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$ |

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----|---|
| اسپارژین | Asparagine | Asn | $\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ |
| گلو تامیک اسید | Acideglutamiqae | Clu | $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ |
| گلو تامین | Glutamin | Clu | $\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ |
| لیزین | Lysine | Lys | $\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ |
| آرژنین | Arginine | Arg | $\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{NH}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ |
| فنیل آلانین | Phenylalanine | Phe | $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ |
| تیروزین | Tyrosine | Tyr | $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ |
| تریپتوفان | Tryptophane | Try | $\text{Indole ring}-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ |
| هیستیدین | Histidine | His | $\text{Imidazole ring}-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ |
| پرولین | Proline | Pro | $\text{Cyclic secondary amine}-\text{COOH}$ |

۱۲- ۲- ۲: پلی پپتیدها و پروتین‌ها

پروتین‌ها واحدهای ساختمانی مشخص را دارا اند که عبارت از امینواسیدها می‌باشند. پروتین‌های تمام موجودات حیه از امینواسیدها ساخته شده است. در ساختمان پروتین‌ها بیش از بیست نوع امینواسید شامل بوده و نوعی از پولیمیرهای مغلق می‌باشند؛ لاکن نایلون نیز نوع پولیمیر بوده؛ اما در ترکیب آن‌ها

صرف یک نوع مونومیر شامل می‌باشد. اعضای بدن انسان قادر به سنتیز پانزده نوع آمینواسید بوده تا به حیات خود ادامه دهند؛ اما پنج نوع آمینواسید دیگر از طریق خوردن مواد غذایی داخل بدن می‌گردند؛ از این سبب به نام آمینواسیدهای اساسی یاد می‌شوند. مالیکول‌های که حداقل از دو آمینواسید ساخته شده باشند، بنام پپتید یاد می‌گردند.



رابطه $\text{CO}-\text{NH}$ به نام رابطه پپتیدی یاد می‌گردد و آمینو اسید انتهایی را قسمت باقیمانده و یا (Residue) یاد می‌نمایند. زنجیرپولی پپتیدها بیش از صدها انشعاب انتهایی را دارا بوده و توسط روابط پپتیدی انتظام حاصل کرده اند. زنجیر پولی پپتیدی که باقی مانده نداشته باشد، بنام اولیگواسید یاد می‌گردد. آمینواسیدهایی که در انجام‌های شان دو گروه COOH موجود باشد، در محلول‌های آبی خاصیت اسیدی بیشتر را دارا بوده که مثال آن را با در نظر داشت جدول (1-12) میتوان اسپاراتیک اسید و کلوتامیک اسید ارایه کرد. اگر گروه COOH - به اماید

($\text{C}=\text{NH}_2$) تبدیل گردد، این امین اسید به اسپاراکین و کلوتامین تبدیل می‌شود. اگر تعداد گروه NH_2 - نسبت به گروه های COOH - زیاد باشد، چنین نوع آمینواسیدها نوع قلوی است. در محلول‌های آبی این نوع آمینواسیدها دارای pH قلوی می‌باشند که مثال آن‌ها را میتوان لایسین، آرژنین و غیره ارایه کرد. محلول‌های آبی همچو آمینواسیدها خواص قلوی را دارا بوده و $\text{pH} > 7$ است، آرژنین آمینواسید خاصی در سپرم انسان و در مایع سفید رنگ تناسلی ماهیان مذکر موجود است. سیستین (Cysteine) نوعی از آمینواسید سلفردار بوده و زنجیر آن به $\text{S}-\text{H}$ - ختم می‌گردد و میتوین (Methionine) نوع دیگر آمینواسید سلفردار است که سلفردر آن به شکل گروه وظیفوی $\text{S}-\text{CH}_3$ - موجود است، این آمینواسید نقش اساسی و غیر قابل تعویض را در کنترل عمل اکسیدیشن و ریدکشن اعضای بدن موجودات حیه دارا بوده و آن را تأمین می‌نماید. اکثر آمینواسیدها دارای زنجیر کاربنی الیفاتیکی بوده؛ اما آمینواسید میتایل الانین، تایروزین و تربوفان متشکل از یک هسته اروماتیک می‌باشند که به واسطه نایتریک اسید تشخیص آن ممکن است. این آمینواسیدها تعامل تعویضی را با نایتریک اسید انجام داده و مرکبات نایترو را تشکیل میدهد، روی همین علت است که در نتیجه تماس دست‌ها با نایتریک اسید رنگ پوست دست زرد می‌گردد. اگر سفیدی تخم مرغ هایدرولیز گردد، آمینواسیدهای اروماتیک حاصل می‌شود.


تبدیل پپتیدها به پروتین‌ها

گروه COOH - یک دای پپتاید با گروه NH_2 - آمینواسیدهای جدید تعامل نموده، به تری پپتاید مبدل گردیده و در انجام زنجیر آن بازهم گروه COOH - موجود می‌باشد که آن نیز به نوبه خود با گروه NH_2 - آمینواسید دیگری تعامل نموده و در نتیجه پپتیدها به پروتین‌ها تبدیل می‌گردد. اگر مالیکول کمتر از 35 آمینواسید داشته باشد، بازهم به نام پپتاید یاد شده و اگر بیشتر از آن باشد، به نام

پروتین یاد می‌گردد. بعضی از پروتین‌ها به تعداد 26 هزار امینواسید را دارا اند که کتله مالیکولی آنها در حدود 40000 g/mol است. درحقیقت پروتین‌ها مکرومالیکول‌ها بوده و ساختمان اولیه یک پروتین با شناخت امینواسیدهای تشکیل دهنده آن ونظمی که آنها را به یکدیگر ارتباط داده یکدیگر اند، مشخص می‌گردد؛ بطور مثال: تشکیل یک ترای پپتاید را که متشکل از سه امینواسید: الاین، سیرین و سیستین است، در نظر گرفته که به شش روش این سه مرکب باهم ترکیب می‌گردند:


| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ala | Ser | Cys | Ala | Cys | Ser |
| Ser | Cys | Ala | Ser | Ala | Cys |
| Cys | Ala | Ser | Cys | Ser | Ala |

این سه پروتین ساختمان به طور مکمل متفاوت را از همدیگر دارا اند. (با وجودی که مواد اولیه آنها باهم یکسان می‌باشند) و خواص فیزیکی و کیمیاوی مختلف را دارا می‌باشند، با در نظر داشت این نمونه ساده میتوان گفت که با 20 امینواسید فعال بیالوژیکی طبیعت توانسته اند تا تعداد غیر قابل شمارش پروتین‌ها را تشکیل دهد که تعداد تقریبی آن به 10^{12} نوع پروتین در عالم حیوانات و نباتات تخمین گردیده است.



شکل (11 - 12) پروتین

تعامل ذیل تشکیل دای پپتایدهای الاین و کلاسین را مشخص می‌سازد.




۱۲-۳: دی اکسی رایبوز نوکلیک اسید (D.N.A) و رایبوز نوکلیک اسید (R.N.A)


پیچیده ترین مالیکول های عضوی «دای اکسی رایبوز نوکلیک اسید (D.N.A)» است و در هسته تمام حشرات اجسام حیه موجود است که برای کنترل تولید پروتئین های مختلف و انتقال اطلاعات جینی (وراثت) از یک نسل به نسل دیگر ایفای وظیفه می نماید. مالیکول D.N.A انسان ها بسیار بزرگ بوده و طول آن بعد از خروج از هسته به 2 متر بالغ می گردد.

مالیکول رایبوز نوکلیک اسید (R.N.A) مشابه به مالیکول D.N.A بوده؛ اما نسبت به آن کوچک می باشد این مالیکول اطلاعات جمع آوری شده ارثی را که توسط D.N.A صورت گرفته است، به خارج از هسته انتقال می دهد.

طریقه خوب برای شناخت ساختمان D.N.A عبارت از مطالعه ساختمان مواد اولیه آن است. D.N.A نوع پولیمیری است که در آن واحدهای تکراری از مالیکول های تغییر یافته قند رایبوز به ساختمان فورانوز شامل است. تغییر ساختمان رایبوز که فورانوز گفته شده است، عبارت از حذف اتم آکسیجن مرتبط به کاربن (2) است، در این صورت رایبوز به مالیکول دی اکسی رایبوز تبدیل می گردد که فورمول آن قرار ذیل است:





مونومیر در D.N.A دی اکسی رایبوز می باشد. در کاربن نمبر (1) آن القلی های نوع نایتروجن دار متصل گردیده که رابطه کوولینت را برقرار می نماید (در این نوع القلی ها نایتروجن دوالکترن آزاد خود را از دست می دهد). این مرکبات قلوی عبارت اند از:





طوری که دیده می شود مقدار القلی ها ۵ نوع بوده. چهارنوع آن در D.N.A موجود بوده و عبارت از

I، G، A و Cy بوده که به کاربن (1) دی اکسی رابوونوکلک اسید رابطه دارند.




بعد از صورت گرفتن تعامل فوق، تعامل فاسفوریک اسید با دی اکسی رابوونوکل صورت گرفته که اسکلیت مالیکول DNA را تشکیل می دهد:

در فورمول ذیل قسمتی از زنجیر پولی نوکلئیک اسید مالیکول DNA ارائه شده است که در آن رابطه هرفاسفیت ایستر متصل به کاربن ۳ و ۵ به شکل منظم تکرار گردیده است:



رابطه های درونی.....





* پولیمیرها مرکباتی اند که مالیکول‌های آنها از اتصال چندین مالیکول‌های کوچک تشکیل گردیده اند، مالیکول‌های کوچکی که پولیمیرها را تشکیل می‌دهند، به نام مونومیرها (Monomers) یاد می‌شوند.

* کاربوهایدریت‌ها مرکبات مهم حیاتی بوده که در حیات روزمره مادر عرصه‌های مختلف به کار می‌روند.

* کاربوهایدریت‌ها را بنام هایدریت‌های کاربن نیز یاد می‌نمایند، چون فورمول بسیط آنها $C_n(H_2O)_n$ و یا $C_nH_{2n}O_n$ است؛ بنابراین به شکل کاربن آبدار به ملاحظه می‌رسند.

* گلوکوز دارای گروپ وظیفوی الکولی و الیدیهای دی‌بوته و زنجیری نسبتاً بلند و قابلیت انعطاف را دارا است.

* کاربوهایدریت‌ها به دودسته تقسیم شده اند که عبارت از ساده و مغلق می‌باشند. قندهای ساده به نام (Simple sugars) یا مونوسکرایدها (Monosacharidos) یاد می‌شوند.

* مونوسکرایدها نوع کاربوهایدریت‌های اند که هایدرولیز نه گردیده و تعداد اتوم‌های کاربن در مالیکول آنها 3 الی 9 اتم می‌باشد.

* از تراکم و اتحاد دو مالیکول مونوسکرایدها و دی‌هایدریشن آنها مالیکول دای‌سکراید حاصل می‌گردد که در بین دو مونو سکراید یک پل آکسیجینی برقرار می‌باشد. فورمول عمومی دای‌سکراید ها $C_{12}H_{22}O_{11}$ است.

* پولی سکرایدها از اتحاد واحدهای گلوکو پیرانوز با همدیگر در نتیجه دی‌هایدریشن (Dehydration) آنها تشکیل می‌گردد، این مرکبات شامل نشایسته و سلولوز است.

* پروتین‌ها نوعی از پولیمیرهای طبیعی بوده که تقریباً 15 فیصد بدن انسان‌ها را تشکیل داده و وظایف متعددی را در بدن انجام می‌دهند.

* اگر یک و یا چندین اتوم‌هایدروجن کاربن‌های مالیکول کاربوکسیلیک اسیدها به NH_2 - (امین) تعویض گردد. امینواسیدهای مربوط آنها حاصل می‌گردد.

* نسبت موجودیت گروپ NH_2 - و $COOH$ - در ترکیب امینو اسیدها، این مرکبات خاصیت امفوتریک را دارا بوده؛ یعنی هم خواص تیزابی و هم خواص قلوئی را دارا می‌باشند

* در ساختمان پروتین‌ها بیش از بیست نوع امینواسید شامل بوده و نوعی از پولیمیرهای مغلق می‌باشند.

* اگر مالیکول پولیمیر کمتر از 35 امینواسید داشته باشد، بازهم بنام پپتاید یاد شده و اگر بیشتر از آن باشد، بنام پروتین یاد می‌گردد.

* پیچیده‌ترین مالیکول‌های عضوی «دای اکسی رایبوزنو کلیک اسید» (D.N.A) است و در هسته تمام سلول‌های اجسام حیه موجود است که برای کنترل تولید پروتین‌های مختلف و انتقال اطلاعات جینیستی (وراثت) از یک نسل به نسل دیگر ایفای وظیفه می‌دارد.


* مالیکول رایبوزنو کلیک اسید (R.N.A) مشابه به مالیکول D.N.A بوده؛ اما نسبت به آن کوچک می‌باشد این مالیکول اطلاعات جمع آوری شده ارثی را که توسط D.N.A صورت گرفته است، به خارج از هسته انتقال می‌دهد.

تمرین فصل دوازدهم


- 1 - کدام مواد را در خانه خود می‌بینید که کاربوهایدریت‌ها در آن شامل باشند؟ تعداد آن‌ها را نام ببرید.
- 2 - کدام کاربوهایدریت‌ها در حیات انسانها مهم بوده؟ آن‌ها را نام ببرید.
- 3 - کدام کاربوهایدریت‌ها را در محیط ماحول خود می‌بینید؟ آن‌ها را نام ببرید.
- 4 - معادله فوتوسنتیز را به درستی تحریر و مواد اولیه آن را نام ببرید.
- 5 - به اساس کدام گروپ‌های وظیفوی کاربوهایدریت‌ها از هم فرق می‌دارند؟ در مورد معلومات ارائه نمایید.
- 6 - کدام اکسیدایز کننده‌ها را می‌توان برای اکسیدیشن کاربوهایدریت‌ها به کاربوکسلیک اسیدها به کاربرد؟ در مورد معلومات دهید.
- 7 - فورمول‌های عمومی امینو اسیدها و پروتین‌ها را تحریر و در مورد توضیحات دهید.
- 8 - فرق بین امینو اسید و پروتین چیست؟ در مورد معلومات دهید.
- 9 - چند امینو اسید مهم را که در اورگانیزم موجودات حیه موجود می‌باشند، نام ببرید.
- 10 - شکل امفی آیون الانین را تحریر دارید.

سوالات چهار جوابه

- 1 - کاربوهایدریت‌ها مرکبات ---- اند که دارای گروپ الدیهایدی یا کیتونی می‌باشند.
- الف - ایستر ب - ایتر ج - پولی ایستر د - پولی هایدروکسی
- 2 - کدام یکی از فورمول‌های ذیل کاربوهایدریت‌ها را افاده می‌کند :



- الف - تنها III ب - تمام‌ها II ج - تنها I د - III و II
- 3 - تعامل گلوکوز در موجودیت خمیر مایه قرارذیل است:



چقدر ایتایل الکول از 90 گرام گلوکوز 60% به دست خواهد آمد؟

الف - 13.8 ب - 27.6 ج - 23 د - 32.2

4 - در فورمول مونوسکرایدها کدام گروپ‌ها موجود است؟

الف - الیهایدی ب - کیتونی ج - هایدروکسیل د - همه درست است.

5 - مالیکول رایبوزنوکلیک اسید (R.N.A) مشابه به مالیکول --- بوده؛ اما نسبت به آن کوچک می‌باشد

الف - D.N.A ب - ATP ج - الف و ب هر دو د - هیچکدام

6 - نام مرکب $\text{CH}_3 - \underset{\text{NH}_2}{\text{CH}} - \text{COOH}$ عبارت است از:

الف - Alanine ب - الانین ج - الف و ب هر دو د - هیچکدام

7 - پروتین‌ها واحد ساختمانی مشخص را دارا اند که عبارت از --- می‌باشند:

الف - امایدها ب - اولیگواسیدها ج - امینواسیدها د - امونیا

8 - به تعداد ----- امینواسید فعال بیالوژیکی طبیعت توانسته اند تا تعداد غیر قابل شمارش پروتین‌ها را تشکیل دهد.

الف - 100 ب - 20 ج - 16 د - 10^{12}

9 - تعداد تقریبی پروتین‌های تشکیل شده درعالم حیوانات و نباتات از امینواسیدها به ----- بالغ می‌گردد:

الف - 10^{12} ب - 1110 ج - 20000 د - 400000

10 - تعداد اتوم‌های کاربن در مالیکول مونوسکرایدها --- الی --- اتوم می‌باشند:

الف - 20 الی 30 ب - 20 الی 40 ج - 3 الی 9 د - 10 الی 20

11 - گروپ COOH - یک دای پیتاید با گروپ NH_2 - امینواسیدهای جدید تعامل نموده به --- مبدل می‌گردد:

الف - ترای پیتاید ب - پیتاید ج - امینواسید د - هیچ کدام

12 - نسبت موجودیت گروپ NH_2 و COOH - در ترکیب امینو اسیدها، این مرکبات خاصیت --- را دارا اند:

الف - دوگانه ب - تیزابی وقلوی ج - امفوتریک د - تمام جواب‌ها درست است.

فصل سیزدهم


پولیمیرهای مصنوعی




در فصل دوازدهم در مورد پولیمیرها معلومات ارائه گردید، دانسته شد که پولیمیرها به دودسته تقسیم گردیده اند که عبارت از پولیمیرهای طبیعی و مصنوعی می باشند. راجع به پولیمیرهای طبیعی در فصل قبلی معلومات ارائه گردید؛ اما در مورد پولیمیرهای مصنوعی معلومات ارائه نشده است، در این فصل مطالعه می نماییم که پولیمیرهای مصنوعی چیست و چگونه می توان پولیمیرها را به طور مصنوعی به دست آورد؟ پولیمیرهای مصنوعی مهم کدامها اند؟ از پولیمیرهای مصنوعی در کدام عرصه ها می توان استفاده کرد؟ در این فصل راجع به پولیمیرهای متراکم شده و جمعی معلومات به دست آورده و از کاربرد آنها در امور حیاتی معلومات حاصل خواهیم کرد.

۱۳-۱: پولیمیرهای جمعی مصنوعی

اگر واحدهای پولیمیرها (مونومیرها) باهم یک جا گردد، پولیمیرهای حاصل شده که نوع پولیمیرهای جمعی میباشند. جدول (1-13) پولیمیرهای جمعی را با مونومیرهای آنها و مورد استعمال شان نشان می دهند. پولیمیرها موادی اند که از مونومیرها ساخته شده اند و در ترکیب مالیکولی مونومیرها اتمهای عناصر متشکله رابطه دو گانه را دارا اند که این رابطه دو گانه در اثر عملیه پولیمرایزیشن (Polymerization) به رابطه یگانه تبدیل می گردد:




جدول (1-13) بعضی از مثالهای پولیمیرهای جمعی و مونومیرهای آنها

| نام و فورمول مونومیر | فورمول پولی میر | نام پولیمیر | کاربرد |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ Ethylene | $-(\text{CH}_2 - \text{CH}_2)_n -$ | پولی ایتلین | پایپ، بوتل های پلاستیکی |
| $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$ propylene | $-\left[\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \right]_n -$ | پولی پروپلین | فرشها، بوتل های پلاستیکی |
| $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ Vinyl chloride | $-\left[\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} \\ \\ \text{Cl} \end{array} \right]_n -$ | پولی وینایل کلوراید | پایپ، سیرامک، فرش اطاق، لباس |
| $\text{CH}_2 = \begin{array}{c} \text{CH} \\ \\ \text{CN} \end{array}$ Acrylntryl | $-\left[\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH} \\ \\ \text{CH} \end{array} \right]_n -$ | پولی اکریل نایتیل (PAN) | قالین و دستگاہ بافنده گی |
| $\text{CF}_2 = \text{CF}_2$ | $-(\text{CF}_2 - \text{CF}_2)_n -$ | پولی تترا فلورو میتیلین | پوشش ناسوز |
| $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$ Methyl metha agrilat | $-(\text{CH}_2 - \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3)_n -$ | پولی میتایل میتا اگریلت | سامان بتری و وسایل خانه |
| $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$ Butadiene $\text{CH}_2 = \text{CH}$  Styrene | $-(\text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{C}_6\text{H}_5)_n -$ | پولی بیوتاداین و پولی ستیارتین (SBR) | عایق حرارتی، سامان بازیچه رابر مصنوعی |


۱۳-۱-۱: پولی ایتلین

اگر مالیکول‌های ایتلین به حرارت $250C^{\circ}$ ، فشار $1000-3000at$ و موجودیت پراکسیدهای عضوی پولیمرایزیشن گردد، پولی ایتلین (Polyethylene) حاصل می‌گردد. میخانیکیت تعامل آن



طوری است که پراکساید عضوی $(R-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-O-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-R)$ را حرارت داده و در نتیجه به دو رادیکال $2R^{\bullet}$ که به $2R^{\bullet}$ نشان داده می‌شود، تبدیل می‌گردد:




رادیکال‌های مذکور با مالیکول ایتلین تعامل کرده، در نتیجه را دیکال جدید قرار ذیل حاصل می‌گردد:




رادیکال‌های حاصل شده قرار فوق در مراحل بعدی با مالیکول دیگر ایتلین تعامل نموده و این عملیه ادامه پیدا می‌کند:




در این صورت زنجیر دراز گروپ‌های متلین حاصل شده و بالاخره عملیه پولی مرایزیشن در نتیجه ترکیب دو زنجیر با رادیکال‌ها قرار ذیل پولی ایتلین را تشکیل می‌دهد:





خلاصه پولی مرایزیشن پولی میر مونومیر ایتلین را قرار ذیل تحریر می‌نمایند:



در این فورمول قیمت n بسیار بزرگ بوده که به صدها بالغ می‌گردد. پولی ایتلین نوع پولی میر هومولوگ (Homo polymer) بوده که از عین مونومیر ساخته شده است. هومو پولی میرهای دیگر عبارت از پولی وینایل کلوراید، پولی تترافلوراید و پولی ستیارین بوده که به اساس تعاملات رادیکالی تشکیل می‌گردد، فورمول‌های عمومی آن‌ها قرار ذیل است:



Polystyrene



اشکال مختلف پولی ایتلین و پولیمیرهای اتصالی

در شکل ذیل اشکال مختلف پولی ایتلین نشان داده شده است که از جمله پولی ایتلین دارندهٔ کثافت بلند (Hight-density poly ethylene) بوده که به HDPE افاده می‌شود، این پولی میر دارای زنجیر دراز بوده و کثافت بلند را دارا است؛ ازاین سبب مالیکول‌های آن بالای یکدیگر به شکل منطبق قرار داشته و بسته می‌باشد. این پولیمیر را در ساختن قطی‌های پلاستیکی شیر و جوس به کار می‌برند؛ زیرا این پولی میر (HDPE) مستحکم است. نوع دیگر پولی ایتلین به نام (Low-density polyethylene) LDPE دارندهٔ کثافت پائین یاد شده و دارای زنجیرانشعابی اند که کثافت آن نسبت به کثافت HDPE کمتر است. این پولیمیر در ساختن خریطه‌های پلاستیکی به کار می‌رود.




شکل (13 - 1) ظروف متشکل از پولی ایتلین‌های دارندهٔ کثافت‌های مختلف

یک نوع دیگر پولی ایتلین نیز موجود است که به نام (Cross-linked poly ethylene) و به CPE افاده می‌شود، این پولی ایتلین طوری تشکیل می‌گردد که از دو مالیکول همجوار یک، یک از اتوم‌های درون تجرید گردیده؛ در این صورت این دو مالیکول باهم متحد شده و پولی میر حاصله را به نام پولی میر مرتبط شده یاد می‌نمایند که نسبت به پولی میر HDPE مستحکم تر بوده واز آن اشیای محکم و با مقاومت را می‌سازند.

۱۳-۱-۲: رابر

یکی از پولیمیرهای مهم طبیعی عبارت از رابر بوده که از تعامل رادیکالی مونو میر ایزوپرین (Isoprene) حاصل می‌گردد. دو نوع پولیمیر ایزوپرین موجود بوده که مربوط به ایزومیری‌های آن است و آن عبارت از سیس و ترانس (cis and trans) می‌باشد که قرار ذیل حاصل می‌گردد:




در عملیه پولی میرایزیشن هردو ایزومیری (cis and trans) به شکل مخلوط حاصل می گردد. رابر طبیعی نوعی از پولی میر سیس ایزومیری بوده که از شیرۀ درخت هیوا حاصل می گردد. رابر طبیعی ماده لزوج و چسبنده بوده و قابلیت ارجاعی آن کم است؛ بنابر همین علت در فابریکه ها از آن چندان استفاده نمی کنند.



شکل (13 - 2) درخت هیوا منبع رابر طبیعی


زمانیکه رابر طبیعی با سلفر تعامل داده شود، در این صورت کیفیت آن بلند رفته، رابر سخت و دوام آن بیشتر می گردد که این تعامل را به نام (Vulcanization) یاد می کنند :



اولین بار عالم امریکایی به نام چارلس گودایر (Charles Goodyear) در سال 1839 عملیه Vulcanization را بالای رابر طبیعی انجام داد که رابر چسبنده و شکننده طبیعی رابه رابر سخت و مقاوم تبدیل کرد. خواص رابر به دست آمده مربوط به مقدار سلفر علاوه شده در ایزوپرین بوده، در صورتیکه سلفر علاوه شده 1% الی 5% باشند، رابر حاصل از آن نرم بوده که برای ساختن

دست کش‌ها، تیوب‌های داخل تایر و دیگر موارد به کار می‌رود. اگر مقدار سلفر 5% الی 30% بوده باشد، مقاومت رابر آن بیشتر بوده و از آن در ساختن تایرهای موترها استفاده می‌گردد.



در سال 1920 عالم آلمانی به نام کارل زاگلر (Karl ziegler) اولین بار رابر مصنوعی را به اساس پولی مرایزیشن بیوتاداین پترولیم به دست آورد، رابر حاصل شده را به Bu Na افاده کرد که از بیوتاداین و Na از سودیم نمایندگی می‌کند که به حیث کتلست در این تعامل به کار رفته است:



1,3-butadiene


polybutadiene

با استحصال پولیمیر بیوتاداین صنعت موتر سازی پیشرفت زیادی کرد که تایرها و دیگر سامان آلات داخلی و خارجی موترها از این رابر ساخته می‌شود. رابر مصنوعی دیگر عبارت از پولی ستیارین - بیوتاداین (Styrene-butadiene) است که به (SBR) افاده شده و یک کو پولیمیر می‌باشد. این رابر از دو مونومیر مختلف تشکیل گردیده است:



شکل (13 - 3) پولی ستیارین - بیوتاداین (PolyStyrene-butadiene)

نیوپرین نوع دیگر رابر مصنوعی است که به عوض رابر طبیعی از آن استفاده می‌گردد. این رابر از پولی مرایزیشن 2-chlorobutadiene حاصل شده و این مونومیر مشابه به ایزوپرین بوده؛ اما بقیه میتایل ایزوپرین در کلوروپرین به کلورین تعویض گردیده است. فورمول آن قرار ذیل است:




Isoprene

2-chlorobutadiene

موجودیت کلورین در این مونومیر باعث تزايد مقاومت آن در مقابل روغنیات و محلول‌های عضوی


گردیده است، پولی مرایزیشن آن قرار ذیل است:



شکل (13 - 4) رابر مصنوعی در تایر موترها


۱۳-۱-۳: پولی ستیارین

اگر یک اتم‌های دوجن ایتلین با حلقه بنزین تعویض گردد، مونومیر ستیارین (Styrene) حاصل می‌گردد که فورمول آن قرار ذیل است:



(Styrene)

از پولی مرایزیشن ستیارین پولی ستیارین حاصل می‌گردد که قرار ذیل ارائه می‌گردد:



Styrene

Poly styrene

پلاستیک‌ها از پولی ستیارین ساخته شده و ظروف پلاستیک و دیگر مواد ضروری منازل از این پولی میر نیز ساخته می‌شود.



شکل (13-5) ظروف تشکیل شده از پلی ستیارین


۱۳-۲: پلی میرهای متراکم شده (Condensation Polymers)

پولیمیرهای که پیش از این در فوق مطالعه گردید، نوعی از پلی میرهای جمعی بوده که در آنها تمام قسمت‌های مونومیرها بدون کمی شامل اند؛ اما در پلی میرهای متراکم شده قسمتی از مونومیر سهیم نبوده، تجرید می گردد، این قسمت تجرید شده به طور معمول آب می باشد که در اثر عملیۀ کاندنزیشن تولید می گردد.

پولی میر متراکم شده نوعی از پلی میری است که به واسطۀ تعاملات ترکیبی تشکیل می گردند. مونومیرهای این نوع پولیمیرها دارای دوگروپ وظیفوی بوده که هر مونومیر از طریق همچو گروپ‌ها با دومونومیر دیگر رابطه بر قرار می کنند. پلی میرهای متراکم شده نوعی از کوپولی میرها اند (کوپولی میرها نوعی از پلی میرهای اند که از دو یا چندین مونومیرهای مختلف تشکیل شده اند).

۱۳-۲-۱: پلی ایستر

پولی ایسترهای؛ از قبیل دگرون (Dacron) نوع پلی میرهای متراکم شده است که از تراکم ایتلین گلایکول و فتالیک اسید قرار معادلۀ ذیل حاصل شده اند:



گروپ هایدروکسیل ایتلین گلایکول با گروپ‌های کاربوکسیل پارافتالیک اسید تعامل نموده، زنجیرهای طویل را با روابط ایستری تشکیل می دهند.

پولی ایتلین فتالیک در عرصه‌های مختلف مورد استعمال قرار می گیرد، در ساختن تایر، قلم‌ها، بوتل‌ها به کارفته وهم در نخ‌های لباس‌های که به اتو کردن ضرورت ندارند، استعمال می گردد. اشکال ذیل نخ‌های مذکور را نشان می دهند:



شکل (13-6) نخ‌های پلی ایسترها

اگر همچو پولیمیرها به شکل فلم تهیه گردد، به نام میلر (Mylar) یاد شده که در ساختن تیپ، ویدیو و غیره به کار میرود. از پولی ایسترها در ساختن الیاف، فلم‌ها و بوتل‌های پلاستیکی نیز استفاده می‌گردد.


۱۳-۲-۲: پولی‌امایدها

پولی‌امایدها نوع پولی میرهای متراکم شده بوده که در مالیکول آن‌ها رابطه‌ی امیدی $(-\text{N}-\overset{\text{H}}{\underset{|}{\text{C}}}-\overset{\text{O}}{\parallel}-\text{C}-)$ موجود است، مثال خوب این نوع پولی میرها عبارت از 6,6-نیلون است که از مونومیرهای ادیپیک اسید و هگزان دای امین حاصل می‌گردد. گروپ کاربوکسیل ادیپیک اسید با گروپ امین هگزان دای امین تعامل کرده، در نتیجه مالیکول‌های آب تجرید و پولی میر آن‌ها حاصل می‌گردد:



Hexadamine

Adipic acid



Nylon - 6,6

پولی میر حاصل شده دارای دو مونو میر مختلف بوده و یک کوپولی میر است؛ چون هر مونومیر دارای شش، شش اتوم کاربن است؛ بنابر همین علت به نام نیلون 6,6 یاد گردیده است. پولی میر مذکور در سال 1935 توسط عالمی به نام Dr. Wallace carothers به دست آمده که مورد استعمال زیاد دارد. از پولی‌امایدها از جمله نیلون در ساختن تکه‌های لباس استفاده به عمل می‌آید. اگر برای پولی‌امایدها تشعشع داده شود، سخت و متراکم (Cross-linking) گردیده و به ماده‌ی فوق العاده سخت تبدیل می‌گردد که از آن در ساختن واسکت‌های ضد مرمی استفاده می‌نمایند.




شکل (13 - 7) نیلون - 6,6 (6,6 - Nylon)

۱۳-۳: ساینس، تکنالوجی و اجتماع

پولی میرهای مصنوعی مواد آینده و امروز بوده، این مواد در عصر کنونی مورد استعمال زیاد داشته و در آینده هم انواع مختلف پولیمیرها سنتیز و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در عصر امروزی پلاستیک‌های مهم را سنتیز نموده اند که مقاوم، هادی برق و سبک بوده و مقاومت آن‌ها به اندازه فولاد هم ساین آن‌ها است. گرچه پلاستیک‌ها بعضی مشکلات را به بار آورده است؛ اما این مشکلات چندان جدی و زیان آور نمی‌باشند. در طبابت امروزی بعضی اعضای بدن انسان‌ها را که اعضای اصلی شان وظایف خود را انجام داده نتوانسته و از کار افتیده باشند، از اعضای مصنوعی که از پولیمیرها ساخته می‌شود، استفاده به عمل می‌آورند. در آینده ممکن استخوان‌های مصنوعی را به وجود خواهند آورد که سبب نموی استخوان‌های اصلی و طبیعی و به شکل پیوند در آن‌ها به کار برده خواهد شد، همچنان قلب، شش و جگر مصنوعی

نیز از پولیمرهای مصنوعی ساخته خواهد شد. وال‌های مصنوعی قلب از پولیمرهای مصنوعی ساخته شده است. اعضای مختلف بدن انسانها از قبیل گوش‌ها، دستها، پاها و دیگر اعضای بدن انسانها در این اواخر از پولیمرهای مصنوعی ساخته شده اند. دفع مواد اجنبی در بدن که به شکل پیوند موجود است، مشکل بزرگی برای انجیران و دیزاینران در این عرصه بوده؛ زیرا جسم انسان مواد اجنبی را در داخل سیستم نپذیرفته و آن‌ها را دفع می‌نمایند که اعضای مصنوعی هم از این نوع مواد بوده و اعضای طبیعی آن‌ها را به حیث متهاجم دانسته و دفع می‌نمایند، موادی برای ساختن اعضای مصنوعی بدن مناسب است که سبب فعال ساختن حالت دفاعی این سیستم‌ها نشده و با آن‌ها توافق حاصل نمایند. یکی از مشکلات جدی اعضای دارنده پیوندهای مصنوعی آن است که قسمت پیوند شده سبب لخته شدن خون گردیده و جریان عادی خون را مختل می‌سازند، سرعت جریان خون در قسمت پیوند دیزاین شده مصنوعی بسیار مهم بوده، سرعت غیر نورمال خون در این قسمت باعث لخته شدن خون می‌گردد. مشکل جدی قسمت پیوند شده مصنوعی و قسمت اصلی اعضای بدن همانا برقراری روابط بین انساج طبیعی و قسمت تعویض شده مصنوعی است. موادی که به حیث غذا داخل بدن می‌گردد، سبب نموی انساج رشتوی قسمتی از انساج طبیعی می‌گردد که نزدیک به قسمت پیوند شده مصنوعی قرار دارند. این قسمت سخت و شکننده شده و سبب بروز درد، آماس و تخریب انساج طبیعی می‌گردد. پولیمر مصنوعی که زیاد تر در طبابت به کار میرود، عبارت از رابر سلیکان به نام (Silastic) بوده که فورمول این پولیمر قرار ذیل است:



Polydimethylsilotane

غشاهای که از Polydimethylsilotane ساخته شده اند، به حیث پوست مصنوعی برای علاج قربانیان سوخته‌گی‌ها به کار برده می‌شود. رنگ‌های مصنوعی خون از پولی ایستر دگرون یا تیفلان (Teflon) ساخته شده است، در این مورد در مبحث پولی میرهای مصنوعی معلومات ارائه شده است. از پلاستیک‌های وینایل (پولی ایتلین) در ساختن پایپ‌های آب، پوشاندن دیوارها، دروازه و چوکات کلکین‌ها، عایق حرارت و پوشش مواد وسامان آلات برقی استفاده به عمل می‌آید. از پولی میرهای مصنوعی در داخل طیاره استفاده به عمل آمده و در بال طیاره‌ها نیز از پولی میرهای مصنوعی کم وزن ترکیبی به نام کمپوزیت (Composite) استفاده می‌گردد. در عصر حاضر از پولی میرهای مصنوعی پرزه جات عراده جات ساخته شده و ممکن در آینده نزدیک اسکلیت موترها از پلاستیک مقاوم مواد کمپوزیت ساخته شوند. ممکن بتری‌های سبک عراده جات در آینده از پلاستیک‌های هادی برق ساخته شوند.

امکان آن موجود است که عده از پولی میرهای بسیار قابل تعجب در جریان قرن 21 سنتیز گردند، در نتیجه عملیه فوتوسنتیز (photosynthesis) مواد غذایی و آکسیجن مورد ضرورت ما به دست می‌آید که در این مواد انرژی آفتاب ذخیره شده و از آن در تعاملات کیمیاوی حیاتی روزمره استفاده

به عمل می‌آید، در این اواخر تلاش به عمل آمده تا پولی میرهای را دیزاین کنند که انرژی آفتاب را به طور مستقیم به انرژی کیمیاوی مفید تبدیل کرده بتوانند. قابل یادآوری است که: اکثر پولیمیرهای مصنوعی از پترولیم و گاز طبیعی به دست می‌آیند که ممکن تا اخیر قرن 21 تمام ذخایر آنها به مصرف برسد، علما کوشش می‌نمایند تا بدیل آن را تدارک نموده و زمینه استفاده آنها را آماده سازند.

۱۳-۴: آلوده‌گی محیط زیست در اثر استعمال پولیمیرهای مصنوعی

پولی میرها از جمله پلاستیک‌ها سبب آلوده‌گی محیط زیست گردیده است. پلاستیک‌ها 20 فیصد حجم زباله‌های جامد را در امریکا تشکیل می‌دهد و به صورت عموم 9 فیصد حجم پلاستیک‌ها زباله‌های جامد را در ممالک پیشرفته تشکیل می‌دهند که مشکل جدی را ایجاد نموده است؛ زیرا این زباله در زمین دفن گردیده و موقعیت زیاد را اشغال و سبب کمبود جای در زمین می‌گردد. پلاستیک‌ها مواد مقاوم بوده که اکثر اوقات بدون تجزیه باقی می‌مانند.

شکل (13 - 9) ریختن پلاستیک‌ها در ابحار و ضرر آنها به حیوانات بحری

شکل (13 - 8) انبار پلاستیک‌ها



به صورت عموم پلاستیک‌ها دونوع اند که یک نوع آنها توسط بکتریها تجزیه شده و به نام (Biodegradable) یاد می‌شوند، این پلاستیک‌ها از پولی میرهای نشایسته ساخته شده اند. نوع دوم پلاستیک‌ها توسط بکتریها تجزیه نگردیده و به نام (Nonbiodegradable) یاد می‌شوند. این نوع پلاستیک‌ها مشکلات جدی را در محیط زیست به بار آورده است. این‌ها از بین نرفته، پارک‌ها، پیاده روها، شهرها، دریاها و حتی ابحار را مسدود می‌سازند که در ابحار مشکل حیاتی را به بار می‌آورند و برای همیشه باقی می‌مانند، مثال آنها را می‌توان پولی ایتلین، پولی اکریلیت، پولی ستیارین، تفلان و پولی بیوتاداین‌ها ارائه کرد.

برای رفع مشکل ناشی از پولیمیرهای مصنوعی آنها را دوباره دوران داده و بار دیگر مورد استفاده قرار می‌دهند، از آن پلاستیک می‌سازند. طریقه دیگر حل مشکل ناشی از پلاستیک‌ها طوری است که آنها را حریق می‌نمایند و از آنها تولید انرژی نموده، از جانب دیگر سوختاندن پلاستیک‌ها و رابر مشکلات جدی را به میان می‌آورند که مواد زهری، گازهای کاربن دای اکساید (CO_2) و کاربن مونو اکساید (CO)، سلفر دای اکساید (SO_2) و هایدروجن کلوراید (HCl) تولید شده که باعث آلوده‌گی هوا می‌گردند.

یگانه شیوه رفع این مشکل طوری است که باید از نوع پلاستیک‌ها استفاده به عمل آید تا توسط بکتریها تجزیه شده بتوانند.

تجارت پلاستیک‌ها

تجارت زباله‌های پلاستیک‌ها از نظر حفاظت محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است، در ضمن پلاستیک‌ها مواد ساخته شده از نفت بوده که نفت دوباره ساخته نخواهد شد؛ بنابراین این تجارت و تجدید ساختمان آن‌ها برای بقای نفت کمک می‌نماید.

روش‌های زیادی برای تجارت و به کار بردن مجدد پلاستیک‌ها موجود است که یکی از این روش‌ها رشته، رشته ساختن و مخلوط نمودن انواع مختلف آن‌ها است؛ در این روش پلاستیک را بعد از شستن دوباره خشک نموده و با مواد دیگر مخلوط می‌نمایند، و از آن اوراق پلاستیک را به دست می‌آورند. بوتل‌های پلاستیک مشروبات غیر الکولی را بعد از شستن و پاک کردن رشته، رشته نموده و از آن در ساختن ظروف پلاستیک استفاده می‌نمایند، همچنان از این نوع مخلوط پلاستیک‌های مرکبات مختلف بعد از رشته، رشته کردن چوکی‌ها، میزها، گلدان‌ها، سطل‌ها و غیره سامان آلات را می‌سازند.

فکر کنید



1- در موقع خرید نوشابه‌ها برای نوشیدن فامیل تان کدام نوع بوتل‌های نوشابه‌های ذیل را انتخاب خواهید کرد؟ (الف و یا ب)

شکل (13 - 10) بوتل‌های نوشابه‌ها به کتله‌های مختلف

2- اگر پلاستیک‌ها را به طریقه‌های ذیل از بین ببریم، کدام مشکلات ذیل را در قبال خواهد داشت؟





الف - سوختاندن ب - دفن کردن در زیر خاک

3- یک فابریکه ساخت بوتل‌های نوشابه، کتله بوتل‌های یک لیتره نوشابه‌ها را از 68 گرم به 51 گرم کاهش می‌دهد، به نظر شما این عمل کارکنان فابریکه چه مزایایی را برای کارخانه نوشابه سازی، مشتری و سرانجام به منابع کیمیاوی و محیط زیست دارد؟

آلوده‌گی‌های هوا و باران‌های تیزابی

مواد سوختی معدنی از قبیل نفت، زغال سنگ و غیره منبع آلوده‌گی هوا می‌باشند. از سوختاندن پولیمیرهای مختلف مصنوعی و طبیعی گازات مختلف در اتموسفر هوا آزاد شده که سبب آلوده‌گی هوا می‌گردد، بعضی از این گازات آزاد شده با قطرات باران مخلوط شده، سبب ریزش باران‌های تیزابی می‌گردند، این گازات عبارت از SO_2 و اکساید‌های نایتروجن (NO_x) می‌باشند، این گازات سنگین تر از هوا بوده و در زمین ترسب می‌نمایند. این گازات زیاد تر در فابریکه‌های تولیدی که دود کش‌های بلند دارند، تولید شده که در موقع ریزش باران با قطرات باران حل شده و سبب تشکیل تیزاب‌های مختلف می‌شوند، تیزاب‌های تشکیل شده تخریباتی را در روی زمین سبب شده نباتات و حیوانات را متضرر می‌سازد؛ به طور مثال: کاربن دای اکساید و اکساید‌های سلفر و نایتروجن قرار

معادلات ذیل اسیدها را با آب باران تشکیل می دهند:



تیزاب‌های تشکیل شده داخل آب گردیده و در دریاها و جوی بارها و ابحار سرازیر شده، حیوانات و نباتات آبی را متضرر می سازند و حتی سبب مرگ آن‌ها می گردد. در شکل زیر دیده می شود که ریزش باران‌های اسید بالای خاک‌های زراعتی با مواد معدنی آن‌ها تأثیر انداخته و آن‌ها را به نمک‌ها تبدیل می نمایند که در آب منحل بوده و با آب در اعماق زمین فرو رفته و مواد ضروری نباتات را کم ساخته، از بین می روند. در آب‌های اسیدی گردهای آهک را علاوه می نمایند، در این صورت تیزاب‌ها خنثی شده و pH مناسبی را حاصل می دارند.



شکل (11 - 13) دریای اسیدی در اسکاندیناویا و خنثی نمودن اسیدهای آن توسط گرد آهک

فکر کنید



سطح تولید SO_2 در جهان تغییرات چشم گیری داشته ، جدول ذیل تغییرات سطح تولیدی SO_2 را در سه براعظم نشان می دهد، به نظر شما این مقادارها برای کشور عزیز ما چه هشدارهایی خواهد داشت؟ و هم با در نظر داشت مقدار SO_2 پیشبینی شده سال 2010 کدام راه را غرض کاهش آن پیشنهاد می کنید؟

جدول (2 - 13) سطح تولید SO_2 در سه برعظم جهان به میلیون تن

| سال | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2010 |
|--------|------|------|------|------|------|
| اروپا | 59 | 49 | 31 | 26 | 18 |
| امریکا | 24 | 20 | 16 | 15 | 14 |
| آسیا | 15 | 34 | 40 | 53 | 79 |

کنترل آلوده گی‌ها

راه‌های درست استحصال انرژی به عوض سوختاندن مواد غرض استحصال؛ به طور مثال: استفاده از انرژی آفتاب، کاهش سوختاندن مواد تشکیل کننده SO_2 ، تهیه مصارف و غیره راه‌های کنترل آلوده گی اند.



* اگر واحدهای پولیمرها (مونومیرها) باهم یک جا گردد، پولیمرهای حاصل می‌گردد که نوع پولیمرهای جمعی می‌باشند.

* مونومیر موادی اند که در ترکیب مالیکولی شان اتم‌های عناصر متشکله رابطه دوگانه را دارا بوده و این رابطه دوگانه در اثر عملیه پولیمرایزیشن (Polymerization) به رابطه یگانه تبدیل می‌گردد:

* اگر مالیکول‌های ایتلین به حرارت 250°C ، فشار $1000-3000\text{at}$ و موجودیت پراکسیدهای عضوی پولیمرایزیشن گردد، پولی ایتلین (Polyethylene) $(\text{CH}_2 - \text{CH}_2)_n$ حاصل می‌گردد.

در این فورمول قیمت n بسیار بزرگ بوده که به صدها بالغ می‌گردد.

* یکی از پولیمرهای مهم طبیعی عبارت از رابر بوده که از تعامل رادیکالی مونو میرایزوپرین (Isoprene) حاصل می‌گردد.

* دو نوع پولیمر ایزوپرین موجود بوده که مربوط به ایزومیری‌های آن است و آن عبارت از سیس و ترانس (cis and trans) می‌باشد

* در پولی میرهای متراکم شده قسمتی از مونومیر سهیم نبوده، تجرید می‌گردد، این قسمت تجرید شده به طور معمول آب می‌باشد که در اثر عملیه کاندنزیشن تولید می‌گردد.

* پولی ایسترها؛ از قبیل دگرون (Dacron) نوع پولی میرهای متراکم شده است که از تراکم ایتلین گلایکول و فتالیک اسید حاصل شده اند.

* پولی امایدها نوع پولی میرهای متراکم شده بوده که در مالیکول آن‌ها رابطه امایدی $(\text{H}-\text{N}-\text{C}=\text{O})$ موجود است، مثال خوب این نوع پولی میرها عبارت از نیلون - 6,6 است

* در طبابت امروزی بعضی اعضای بدن انسانها را که اعضای اصلی شان وظایف خود را انجام داده نتوانسته و از کار افتیده باشند، از اعضای مصنوعی که از پولیمرها ساخته می‌شود، استفاده به عمل می‌آورند.

* از پولی میرهای مصنوعی در داخل طیاره استفاده به عمل آمده و ممکن در بال طیاره‌ها نیز از پولی میرهای مصنوعی کم وزن ترکیبی به نام کمپوزیت (Composite) استفاده گردد.

* امکان آن موجود است که عده از پولی میرهای بسیار قابل تعجب در جریان قرن 21 سنتیز گردند، در نتیجه عملیه فوتوسنتیز (photosynthesis) مواد غذایی و آکسیجن مورد ضرورت ما به دست می‌آید که در این مواد انرژی آفتاب ذخیره شده و از آن در تعاملات کیمیاوی حیاتی روزمره استفاده به عمل می‌آید، در این اواخر تلاش به عمل آمده تا پولی میرهای را دیزاین کنند که انرژی آفتاب را به طور مستقیم به انرژی کیمیاوی مفید تبدیل کرده بتوانند.

تمرین فصل سیزدهم

سؤالات چهار جوابه

1 - اگر واحدهای پولیمرها (----) باهم یک جا گردد، پولیمرهای حاصل می‌گردد که نوع پولیمرهای ---- می‌باشند.

الف - مونومیر، جمعی ب - دای میر، جمعی ج - مونومیرها، متراکمی د - هیچکدام

2 - پولیمیرها موادی اند که از --- ساخته شده اند.

الف- دایمیرها ب - ترای میرها ج - مونومیرها د- تترامیرها

3 - فورمول پولی ایتلین عبارت است از:

الف - $(CH_2 - CH_2)_n$ - ب $CH_2 = CH_2$ - ج $CH_2 = CH - CH_3$ - د- هیچکدام

4 - پولی ایتلین دارندهٔ کثافت بلند (High-density poly ethylene) به ---- افاده می شود.

الف - LDPE ب - CPE ج - الف وب هر دو د- HDPE

5 - رابر طبیعی از تعامل رادیکالی مونو میر --- حاصل می گردد.

الف- ایزوپرین ب - Isoprene ج - الف وب هر دو د- مونومیر ایتلین

6 - تعامل سلفر را با رابر طبیعی به نام ---- یاد می کنند :

الف - ایزومرایزیشن ب - Vulcanisation ج- جمعی د- پولی میرایزیشن

7 - نیوپرین نوع دیگر رابر مصنوعی است که از پولی میرایزیشن ----- حاصل می شود.

الف - 2-chlorobuta diene ب - کلوروپیوتا دای ین ج - 2 - کلوروپیوتا دای ین

د - الف وج هر دو

8 - ظروف پلاسکو و دیگر مواد ضروری منازل از --- ساخته شده است.

الف - پولی ایتلین ب - پلاستیک ها ج - پولی ستیارین د - پولی امایدها

9 - پولی میر متراکم شده نوعی از پولی میری است که به واسطهٔ تعاملات ---- تشکیل می گردند.

الف - ترکیبی ب- جمعی ج- احتراقی د - تجریدی

10 - در پولی امایدها و مالیکول آن ها رابطهٔ (---) موجود است.



الف - رابطهٔ امایدی ب - ج - الف وب هر دو د- هیچکدام

11 - در پولی میرهای متراکم شده قسمتی از ---- سهیم نبوده، تجرید می گردد.

الف مالیکول ب- اتوم ج- مرکب د - مونومیر

12 - پولیمیر مصنوعی که زیاد تر در طبابت به کار میرود، به نام ---- است.

الف - Silastic ب - رابر سلیکان ج - الف وب هر دو د - هیچکدام

13 - رنگ های مصنوعی خون از ---- ساخته شده است:

الف - پولی ایستر دگرون ب - تیفلان ج - Teflon د- تمامی جوابات درست است.

14 - در بال طیاره ها از پولی میرهای مصنوعی کم وزن ترکیبی به نام --- استفاده می شود:

الف - کمپوزیت ب - (Composite) ج - الف وب هر دو د - هیچکدام

15 - کدام پولی میرهای ذیل در ساختن تیپ، ویدیو و غیره به کار میرود؟

الف - میلر ب - Mylar ج - نیلون 6,6 د - الف وب

16 - دکرون (Dacron) نوع پولی میرهای متراکم شده است که از تراکم --- حاصل شده اند

الف - ایتلین گلایکول ب - فتالیک اسید ج- الف وب هر دو د - ایتلین

سؤالات تشریحی

- 1- عملیه پولیمرایزیشن (Polymerization) را توضیح داده و تبدیل رابطه دو گانه رابه یگانه تشریح نمایید.
- 2- دو نوع پولیمیر ایزوپرین موجود را که مربوط به ایزومیری های آن است، توضیح دهید.
- 3- از پولی مرایزیشن ستیارین کدام پولیمیر حاصل می گردد؟ در مورد معلومات ارائه بدارید.
- 4- دکرون (Dacron) کدام نوع پولی میر است و از تراکم کدام مونومیرها حاصل می گردد معادله پولیمرایزیشن آن را تحریر دارید.
- 5- در مورد Polydimethylsilotane و مورد استعمال آن معلومات لازم ارائه بدارید.
- 6- در مورد پولی میرهای مصنوعی ورول آنها در مواد صنعتی آینده و در عصر کنونی معلومات ارایه کنید.
- 7- پولی ایسترهای؛ از قبیل دکرون (Dacron) کدام نوع پولی میر است؟ در مورد معلومات دهید.
- 8- فرق بین رابر طبیعی و مصنوعی را با ارایه مثال توضیح دهید.
- 9- اشکال مختلف پولی ایتلین ها را توضیح داده و مورد استعمال آنها را با مثال ارائه نمایید.
- 10- کدام پولیمیرها باعث آلوده گی های بیشتر محیط زیست می گردد؟ در مورد معلومات ارایه بدارید.

مآخذ:

- 1- K. Peter, C.Vollhardt, Organic Chemistry, Fourth Edition ,2003, US
- 2- Ovorak, Schmutu.a. von der Chemier 2, 1996 by E.DORNER GmbH, 1010 wien, Austria.
- 3- Pribas, Hagenauer, Markl, Zadrazil Chemie,aktuell , 1. Auflage, 2006, Austria.
- 4- Dr. Franz Neufingerl, Otto Urban, Dr. Martina viehhauser, Chemie 2
- 5- Franz Neufingerl, Chemie istuberall 4, 2006 westermann wien,im Verlag E. DORNER GmbH, Austria.
- 6- ZANBAK YAYINLARI, Hydrocarbons, 2006, Chemistry series.
- 7- ZANBAK YAYINLARI, Oxygen and Nitrogen Containing, organic Compounds,2005 , chemistry series.
- 8- KOYZ and TREICHEL, Chemistry and Chemical Reactivity, fourth Edition, 1999, USA.
- 9- Williams S.Seese, G. William Daub, Basic Chemistry, Fifth Edition, 1988, USA.
- 10- HOLT, RINEHART and WINSTON, MODERN Chmistry, 2002, USA.
- 11- Raymond Chang, General Chemistry, Third Edition, 2003, USA.
- 12- David E. Goldberg, Fundamentals of Chemistry, Ghird Edition, 2001, USA.
- 13- Steven S. Zumdahl, Chemistry, Third Edition, 1993, USA.

۱۴- شیمی (۲) و آزمایشگاه، منصور عابدینی و دیگران، وزارت آموزش و پرورش، سال دوم دبیرستان، ۱۳۸۵ تهران.

۱۵- عزیز، عبدالمحمد، کیمیای عمومی، پوهنتون کابل، سال ۱۳۸۷.